

**AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 10543/2018/01-12**

*Anexa 1*

**NR. 10544/2018/01-12**

**NR. 10545/2018/01-12**

**NR. 10546/2018/01-12**

**Prospect: Informații pentru utilizator**

**Atorvastatin Terapie 10 mg comprimate filmate**

**Atorvastatin Terapie 20 mg comprimate filmate**

**Atorvastatin Terapie 40 mg comprimate filmate**

**Atorvastatin Terapie 80 mg comprimate filmate**

Atorvastatină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament**

**deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

–

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

–

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

–

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane.

Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.

–

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect**

1.

Ce este Atorvastatin Terapie și pentru ce se utilizează

2.

Ce trebuie să știți înainte să luați Atorvastatin Terapie

3.

Cum să luați Atorvastatin Terapie

4.

Reacții adverse posibile

5.

Cum se păstrează Atorvastatin Terapie

6.

Conținutul ambalajului și alte informații

**1.**

### **Ce este Atorvastatin Terapia și pentru ce se utilizează**

Atorvastatin Terapia face parte din grupa medicamentelor cunoscute sub denumirea de statine, care acționează prin reglarea lipidelor (grăsimilor) din organism.

Atorvastatin Terapia este utilizat pentru scăderea concentrației de colesterol și trigliceride din sânge, atunci când regimul alimentar și schimbarea modului de viață au eșuat. Dacă aveți un risc crescut de boală cardiacă, Atorvastatin Terapia poate fi utilizat pentru a reduce acest risc, chiar dacă valoarea colesterolului dumneavoastră este normală. În timpul tratamentului trebuie continuată o dietă standard de reducere a colesterolului.

**2.**

### **Ce trebuie să știți înainte să luați Atorvastatin Terapia**

#### **Nu luați Atorvastatin Terapia**

- dacă sunteți alergic la atorvastatin sau la orice medicamente similare utilizate pentru scăderea lipidelor din sânge sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- dacă aveți sau ați avut vreodată boli de ficat.
- dacă ați avut valori anormale inexplicabile ale testelor sanguine pentru funcția ficatului.
- dacă utilizați combinația de glecaprevir/pibrentasvir pentru tratamentul hepatitei cu virus C.
- dacă sunteți femeie aflată la vârsta fertilă și nu utilizați o metodă de contracepție eficace.

2

- dacă sunteți gravidă sau încercați să rămâneți gravidă.
- dacă alăptați.

#### **Atenționări și precauții**

Înainte să luați Atorvastatin Terapia, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Dacă luați sau ați luat în ultimele 7 zile un medicament numit acid fusidic, (un medicament pentru infecție bacteriană) oral sau prin injectare. Combinația de acid fusidic și Atorvastatin Terapia poate duce la probleme musculare grave (rabdomioliză).

Următoarele constituie motive pentru care Atorvastatin Terapia este posibil să nu fi indicat pentru dumneavoastră:

- dacă ați avut un accident cerebral vascular cu sângerări la nivelul creierului sau dacă aveți mici punji de lichid la nivelul creierului din cauza unor accidente cerebrale vasculare precedente.
- dacă aveți probleme ale rinichilor
- dacă aveți glanda tiroidă mai puțin activă (hipotiroidism)
- dacă ați avut dureri musculare repetate sau inexplicabile sau antecedente personale sau familiale de tulburări musculare
- dacă ați avut tulburări musculare în timpul tratamentului cu alte medicamente care scad colesterolul (de exemplu, alte statine sau fibrati)

- dacă consumați regulat cantități mari de alcool etilic
- dacă aveți antecedente de boală a ficatului
- dacă aveți vârsta peste 70 de ani.

### **Înainte să luați Atorvastatin Terapia, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului**

- dacă aveți insuficiență respiratorie severă.

Dacă oricare dintre cele de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră, medicul dumneavoastră vă va face analize ale sângelui înainte și posibil în timpul tratamentului cu Atorvastatin Terapia, pentru a prevedea riscul de a prezenta reacții adverse musculare. Riscul de apariție a reacțiilor adverse musculare, de exemplu, rabdomioliza, este cunoscut a fi crescut atunci când anumite medicamente sunt luate în același timp (vezi punctul 2 „Atorvastatin Terapia împreună cu alte medicamente”).

De asemenea, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți o slăbiciune musculară permanentă. Pot fi necesare analize de sânge suplimentare pentru diagnosticarea acesteia și utilizarea altor medicamente pentru a trata această slăbiciune.

În timp ce vi se administrează acest medicament, medicul dumneavoastră vă va monitoriza strict dacă aveți diabet zaharat sau dacă prezentați un risc de apariție a diabetului zaharat. Este posibil să prezentați un risc de apariție a diabetului zaharat dacă aveți valori crescute ale zahărului și lipidelor în sânge, aveți greutate corporală în exces și aveți valori crescute ale tensiunii arteriale.

### **Atorvastatin Terapia împreună cu alte medicamente**

Există

anumite medicamente care pot modifica efectul Atorvastatin Terapia sau efectele lor pot fi modificate de către Atorvastatin Terapia. Acest tip de interacțiune poate face ca unul dintre medicamente sau ambele medicamente să fie mai puțin eficiente. Alternativ, poate crește riscul sau severitatea reacțiilor adverse, incluzând afectarea musculară importantă denumită rabdomioliză, descrisă la punctul 4 „Reacții adverse posibile”:

–

Medicamente utilizate pentru a schimba modul în care funcționează sistemul imunitar, de exemplu, ciclosporina

–

Anumite antibiotice sau medicamente antifungice, de exemplu, eritromicină, claritromicină,

telitromicină, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampicină, acid fusidic.

– Alte medicamente care reglează valorile lipidelor, de exemplu, gemfibrozil, alți fibrati, colestipol.

3

– Anumite blocante ale canalelor de calciu, utilizate pentru tratamentul anginei pectorale sau a tensiunii arteriale mari, de exemplu, amlodipină, diltiazem; medicamente care vă reglează ritmul bătăilor inimii, de exemplu, digoxină, verapamil, amiodaronă.

– Medicamente utilizate în tratamentul infecției cu HIV, de exemplu, ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, combinații de tipranavir/ritonavir etc.

– Anumite medicamente utilizate pentru tratamentul hepatitei cu virus C, de exemplu telaprevir, boceprevir și combinația de elbasvir/grazoprevir.

– Alte medicamente cunoscute a interacționa cu Atorvastatin Terapie, incluzând ezetimibă (care reduce colesterolul), warfarină (care reduce coagularea sângelui), contraceptivele orale, s tiripentol (un anticonvulsivant pentru tratamentul epilepsiei), cimetidină (utilizat pentru arsuri în capul pieptului și ulcere peptice), fenazonă (un calmant al durerii), colchicină (utilizată în tratamentul gutei) și antiacide (medicamente pentru indigestie, care conțin aluminiu sau magneziu).

– Medicamente eliberate fără prescripție medicală: sunătoare.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

**- Dacă trebuie să luați acid fusidic oral pentru a trata o infecție bacteriană, va trebui să opriți temporar utilizarea acestui medicament. Medicul dumneavoastră vă va spune când este sigur pentru a reîncepe Atorvastatin Terapie.**

**Utilizarea Atorvastatin Terapie cu acid fusidic poate duce rareori la slăbiciune musculară, sensibilitate sau durere (rabdmioliză). Vezi mai multe informații cu privire la rabdmioliză în secțiunea 4.**

### **Atorvastatin Terapie împreună cu alimente, băuturi și alcool etilic**

Pentru instrucțiuni privind utilizarea Atorvastatin Terapie, vezi punctul.

3. Vă rugăm să luați în considerare următoarele:

#### *Sucul de grepfrut*

Nu consumați mai mult de unul sau două pahare mici de suc de grepfrut pe zi, deoarece cantitățile mari de suc de grepfrut pot modifica efectele Atorvastatin Terapie.

#### *Alcool etilic*

Evitați să consumați prea mult alcool etilic în timp ce luați acest medicament. Pentru detalii, vezi punctul 2 „Atenționări și precauții“.

### **Sarcina și alăptarea**

Nu luați Atorvastatin Terapie dacă sunteți gravidă sau dacă vreți să rămâneți gravidă.

Nu luați Atorvastatin Terapie dacă vă aflați în perioada fertilă, decât dacă utilizați metode de contracepție eficiente.

Nu luați Atorvastatin Terapie dacă alăptați.

Până în prezent, nu s-a dovedit siguranța utilizării Atorvastatin Terapie în timpul sarcinii și

alăptării.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

În mod normal, acest medicament nu vă afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuși, nu conduceți vehicule dacă acest medicament vă afectează capacitatea de a conduce.

Nu utilizați niciun fel de unelte sau utilaje dacă abilitatea de a le folosi vă este afectată de către acest medicament.

### **Atorvastatin Terapia conține lactoză**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Atorvastatin Terapia conține sodiu, mai puțin de 1 mmol (23 mg) pe comprimat, adică practic nu conține sodiu.

## **3.**

### **Cum să luați Atorvastatin Terapia**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Înainte de începerea tratamentului, medicul vă va recomanda o dietă cu conținut scăzut în colesterol, pe care trebuie să o mențineți și în timpul tratamentului cu Atorvastatin Terapia.

Doza recomandată de început pentru Atorvastatin Terapia este de 10 mg o dată pe zi

la

aduți,  
adolescenți și copii cu vârsta de 10 ani sau peste.

Această doză poate fi crescută de către medicul dumneavoastră, dacă este cazul, până când se ajunge la doza care vă este necesară. Medicul dumneavoastră va modifica doza la intervale de 4 săptămâni sau mai mult.

Doza maximă de Atorvastatin Terapia este de 80 mg o dată pe zi pentru adulți și de 20 mg o dată pe zi la copii.

Comprimatele de Atorvastatin Terapia trebuie înghițite întregi cu apă, în orice moment al zilei, cu sau fără alimente. Cu toate acestea, încercați să luați comprimatele în același moment al zilei.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

**Durata tratamentului cu Atorvastatin Terapia este determinată de către medicul dumneavoastră.**

Va rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră dacă aveți impresia că efectul Atorvastatin Terapia este prea puternic sau prea slab.

**Dacă luați mai mult Atorvastatin Terapia decât ar trebui**

Dacă luați în mod accidental mai multe comprimate de Atorvastatin Terapia (mai mult decât doza zilnică obișnuită), adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de urgențe al celui mai apropiat spital.

**Dacă uitați să luați Atorvastatin Terapia**

Dacă uitați să luați o doză, luați următoarea doză programată, la momentul corect. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

**Dacă încetați să luați Atorvastatin Terapia**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament sau dacă doriți să întrerupeți tratamentul, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4.**

##### **Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Dacă prezentați oricare dintre următoarele reacții adverse grave sau simptome, încetați să luați comprimatele și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la departamentul de urgențe al celui mai apropiat spital.**

**Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):**

–Reacții alergice grave care determină umflarea feței, limbii și gâtului și care pot determina dificultăți mari la respirație

– O afecțiune gravă însoțită de descuamarea și umflarea pielii, formarea de vezicule la nivelul pielii, gurii, ochilor, organelor genitale și febră. Erupție trecătoare pe piele sub formă de pete roz-roșii, în mod special la nivelul palmelor și mâinilor sau tălpilor picioarelor, pete care se pot transforma în vezicule.

– Slăbiciune, sensibilitate, durere sau ruptură musculară sau modificări de culoare în roșu-maroniu ale urinei și, în mod special, dacă în același timp aveți o stare de rău sau aveți febră. Acestea pot să apară ca urmare a unei distrugerii musculare anormale. Distrugerea musculară anormală nu este întotdeauna reversibilă și poate continua chiar și după ce tratamentul cu atorvastatină a fost oprit și vă poate pune viața în pericol și poate determina probleme ale rinichilor.

### **Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)**

:

–

Dacă prezentați tulburări legate de sângerare sau vânătăi neobișnuite sau neașteptate. Acestea pot fi sugestive pentru o tulburare a ficatului. Trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră cât mai repede posibil.

–

Sindrom de boală asemănătoare lupusului (incluzând erupții cutanate, tulburări articulare și efecte asupra celulelor sanguine).

### **Alte reacții adverse posibile în cazul administrării Atorvastatin Terapie**

#### **Reacțiile adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) includ**

:

- 

inflamație a căilor nazale, durere în gât, sângerare nazală

- 

reacții alergice

- 

creștere a valorilor concentrațiilor zahărului din sânge (dacă aveți diabet zaharat, trebuie să continuați urmărirea atentă a valorilor concentrațiilor de zahăr din sânge), creștere a concentrației creatin kinazei în sânge.

- 

durere de cap

-

- greață, constipație, flatulență, indigestie, diaree
- durere articulară, durere musculară și durere de spate
- testele de sânge pot să arate funcționare anormală a ficatului

**Reacțiile adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) includ:**

- anorexie (pierdere a poftei de mâncare), creștere în greutate, scădere a valorilor concentrațiilor de zahăr din sânge (dacă aveți diabet zaharat, trebuie să continuați urmărirea atentă a valorilor concentrațiilor de zahăr din sânge)
- coșmaruri, insomnie
- amețeli, amorțeli sau furnicături la nivelul degetelor de la mâini sau picioare, reducere a sensibilității la atingere sau la durere, modificări ale gustului, pierdere a memoriei
- vedere încețoșată
- țiuțuri în urechi și/sau cap
- vărsături, eructații, durere la nivelul abdomenului superior și inferior, pancreatită (inflamație a pancreasului care determină durere la nivelul stomacului)
- hepatită (inflamație a ficatului)
- erupție trecătoare pe piele, erupție sau mâncărime la nivelul pielii, urticarie, cădere în exces a părului
- dureri la nivelul gâtului, oboseală musculară
- oboseală, senzație de rău, slăbiciune, durere în piept, umflare în special la nivelul gleznelor (edem), temperatură crescută
- prezența de celule albe în urină, detectată prin analize ale urinei.

**Reacțiile adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane) includ:**

- tulburări de vedere
- sângerare sau vânătăi neașteptate
- colestază (îngălbenire a pielii sau a albului ochilor)
- rupturi ale tendoanelor

6

**Reacțiile adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane) includ:**

- o reacție alergică – simptomele pot include respirație șuierătoare bruscă, durere sau apăsare în piept, umflare a pleoapelor, feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului, dificultate la respirație, colaps
- pierdere a auzului
- ginecomastie (creștere de volum a sânilor la bărbați )

**Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):**

- slăbiciune musculară permanentă.

**Reacții adverse posibile, raportate la unele statine (medicamente de același tip):**

- Tulburări sexuale;
- Depresie;
- Probleme de respirație, incluzând tuse persistentă și/sau scurtare a respirației sau febră.
- Diabet zaharat. Acesta este mai probabil dacă aveți valori crescute ale zahărului și lipidelor în



sânge, greutate corporală în exces și valori crescute ale tensiunii arteriale.  
Medicul dumneavoastră vă va monitoriza pe parcursul administrării acestui medicament.

**Raportarea reacțiilor adverse:**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta

reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate

pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

**5.**

**Cum se păstrează Atorvastatin Terapie**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25

°

C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

**6.**

**Conținutul ambalajului și alte informații**

**Ce conține Atorvastatin Terapie**

Substanța activă este atorvastatină calcică trihidrat.

*10 mg*

Fiecare comprimat filmat conține atorvastatină 10 mg.

Celelalte componente sunt:

Nucleu: celuloză microcristalină lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, hidrogen carbonat de sodiu, carbonat de sodiu anhidru, hidroxipropilceluloză, stearat de magneziu, butilhidroxianisol, butilhidroxitoluen

Film: Opadry alb YS-1-7040 (hipromeloză, macrogol 8000, dioxid de titan, talc).

*20 mg*

Fiecare comprimat filmat conține atorvastatină 20 mg.

Celelalte componente sunt:

Nucleu: celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, hidrogen carbonat de sodiu, carbonat de sodiu anhidru, hidroxipropilceluloză, stearat de magneziu, butilhidroxianisol, butilhidroxitoluen

Film: Opadry alb YS-1-7040 (hipromeloză, macrogol 8000, dioxid de titan, talc).

*40 mg*

Fiecare comprimat filmat conține atorvastatină 40 mg.

Celelalte componente sunt:

Nucleu: celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, hidrogen carbonat de sodiu, carbonat de sodiu anhidru, hidroxipropilceluloză, stearat de magneziu, butilhidroxianisol, butilhidroxitoluen

Film: Opadry alb YS-1-7040 (hipromeloză, macrogol 8000, dioxid de titan, talc).

*80 mg*

Fiecare comprimat filmat conține atorvastatină 80 mg.

Celelalte componente sunt:

Nucleu: celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, hidrogen carbonat de sodiu, carbonat de sodiu anhidru, hidroxipropilceluloză, stearat de magneziu, butilhidroxianisol, butilhidroxitoluen

Film: Opadry alb YS-1-7040 (hipromeloză, macrogol 8000, dioxid de titan, talc).

### **Cum arată Atorvastatin Terapie 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg comprimate filmate și conținutul ambalajului**

*Atorvastatin Terapie 10 mg:*

Comprimate filmate de formă ovală, de culoare albă până la aproape albă, cu dimensiuni de aproximativ 6,1 mm în grosime și aproximativ 8,6 mm în lungime, inscripționate cu „A30” pe una din fețe și netede pe cealaltă față.

*Atorvastatin Terapie 20 mg:*

Comprimate filmate de formă ovală, de culoare albă până la aproape albă, cu dimensiuni de aproximativ 6,6 mm în grosime și aproximativ 12,1 mm în lungime, inscripționate cu „A31” pe una din fețe și netede pe cealaltă față.

*Atorvastatin Terapie 40 mg:*

Comprimate filmate de formă ovală, de culoare albă până la aproape albă, cu dimensiuni de aproximativ 8,1 mm în grosime și aproximativ 16,9 mm în lungime, inscripționate cu „A32” pe una

din fețe și netede pe cealaltă față.

*Atorvastatin Terapie 80 mg:*

Comprimate filmate de formă ovală, de culoare albă până la aproape albă, cu dimensiuni de aproximativ 10,8 mm în grosime și aproximativ 21,7 mm în lungime, inscripționate cu „A33” pe una din fețe și netede pe cealaltă față.

Atorvastatin

**Terapie**

este furnizat în ambalaje de:

Blister OPA-Al-PVC/Al.

Ambalaje cu câte 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții**

**Deținătorul autorizației de punere pe piață**

S.C. Terapie S.A.  
Str. Fabricii Nr. 124, Cod 400632,  
Cluj-Napoca, Județul Cluj  
România

**Fabricanții**

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.  
Polarisavenue 87, Hoofddorp 2132 JH  
Olanda

S.C. Terapie S.A.  
Str. Fabricii, Nr. 124 Cluj-Napoca 400632  
România

**Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European (SEE) sub următoarele denumiri comerciale:**

Bulgaria:

ATORVISTAT K 10/20/40/80 mg филмирани таблетки  
Spania:

ATORVASTATINA SUN 10-20-40-80 mg COMPRIMIDOS  
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG

Finlanda:

Atorvastatin Orion 10/20/40/80 mg tabletti, kalvopäällysteinen  
Franța:

ATORVASTATINE SUN 10/20/40/80 mg comprimé pelliculé  
Irlanda:

Atorvastatin 10/20/40/80 mg film-coated tablets  
Lituania:

Atorvastatin SUN 10/20/40/80 mg plèvele dengtos tabletès  
Letonia:

Atorvastatin SUN 10/20/40/80 mg apvalkotās tabletes  
Polonia:

Storvas CRT  
România:

Atorvastatin Terapia 10/20/40/80 mg comprimate filmate  
Marea Britanie:  
Atorvastatin 10/20/40/80 mg Film-coated Tablets

**Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2020.**