

HYLO GEL®

Hialuronat de sodiu 2 mg/ml

Pentru lubrifierea terapeutică intensivă a suprafeței oculare, în cazuri mai severe și persistente de senzație de uscăciune oculară, precum și după intervenții chirurgicale oftalmologice.

Soluție sterilă fără conservanți și fără fosfați.

Ce este HYLO GEL®?

HYLO GEL® este o soluție sterilă, fără fosfați și conservanți pentru utilizare oculară.

Compoziție:

1 ml de HYLO GEL® conține 2 mg hialuronat de sodiu, acid citric anhidru, citrat de sodiu și apă pentru injecții.

La ce este folosit HYLO GEL®?

Pentru lubrifierea terapeutică intensivă a suprafeței oculare, în cazuri mai severe și persistente de senzație de uscăciune oculară, inclusiv după intervenții chirurgicale oftalmologice.

Când se folosește HYLO GEL®?

HYLO GEL® este indicat pentru tratamentul bolii de ochi uscat.

HYLO GEL® conține sarea de sodiu a acidului hialuronic, o substanță naturală ce este găsită în ochi, dar și în alte părți ale corpului. Proprietatea sa unică este că formează un film hidratant și lubrifiant, stabil și de lungă durată, la suprafața oculară, fiind greu de îndepărtat. Proprietățile sale bioadезive protejează corneea și conjunctiva, iar împreună cu lacrimile fiziologice asigură o mișcare ușoară a pleoapei pe suprafața ochiului. HYLO GEL® conține o cantitate mai mare de hialuronat de sodiu, fapt ce crește vâscozitatea soluției și astfel ochiul beneficiază de un film intensiv hidratant, odihnitor și de lungă durată. Simptomele persistente sau mai severe sunt ameliorate și ochiul este protejat împotriva viitoarelor iritații.

Datorită intervențiilor chirurgicale oftalmologice sau a vătămarilor oculare, secreția fiziologică lacrimală poate fi redusă. Este necesară o hidratare suficientă și continuă pentru regenerarea țesutului ocular superficial. Prin utilizarea soluției HYLO GEL® corneea și conjunctiva beneficiază de o hidratare și lubrifiere crescută, astfel încât procesul fiziologic de vindecare să fie optim.

Fiind fără conservanți, HYLO GEL® este în general foarte ușor de tolerat. În plus, HYLO GEL® nu conține fosfați, pentru a evita posibile complicații, precum depozite insolubile la nivelul corneean.

Cum ar trebui aplicat HYLO GEL®?

Vă rugăm să nu folosiți HYLO GEL® dacă orice parte a ambalajului protector de pe cutia de carton a fost deteriorată înainte primei utilizări (☹).



Pasul 1:

Înlăturați capacul înainte de utilizare. Pentru a face asta, țineți capacul de deasupra flaconului. Cu cealaltă mână, trageți de flacon printr-o mișcare de rotație. Înaintea primei aplicări, poziționați flaconul HYLO GEL® cu vârful îndreptat în jos și apăsați baza flaconului în mod repetat, până la căderea primei picături din vârf. Acum flaconul este pregătit pentru a fi utilizat.



Pasul 2:

Țineți flaconul întors și poziționați degetul mare la baza picurătorului și celelalte degete la baza flaconului.




Pasul 3:

Susțineți mâna ce ține flaconul COMOD® cu cealaltă mână, așa cum vedeți în imagine.



Pasul 4:

Când aplicați picăturile de ochi, vă rugăm să evitați orice contact între vârful flaconului și ochi sau piele. Cu capul lăsat ușor pe spate, trageți ușor în jos pleoapa inferioară. Apăsați baza flaconului. Acest lucru va activa mecanismul pentru eliberarea unei picături. Datorită sistemului special COMOD® cu valvă, dimensiunea și viteza fiecărei picături rămâne constantă, indiferent de presiunea aplicată bazei flaconului. Închideți ușor ochiul pentru a permite fluidului să se distribuie în mod egal pe suprafața ochiului.



Pasul 5:

Puneți imediat capacul la loc după folosire. Asigurați-vă că vârful picurătorului este uscat.

Vă rugăm să contactați producătorul în cazul oricărei întrebări legate de utilizarea corectă a dispozitivului medical.

Un flacon care conține 10 ml de soluție corespunde la aproximativ 300 de picături. Din motive tehnice, o cantitate minoră rămâne întotdeauna în flacon.

HYLO GEL® este adecvat pentru tratamente de lungă durată și poate fi utilizat de către adulți și copii, fără limită de vârstă.

Fiecare flacon de HYLO GEL® ar trebui să fie folosit de aceeași persoană (19).

Ce altceva mai trebuie să știți dumneavoastră?

Dacă folosiți alte picături pentru ochi, ar trebui să păstrați un interval de 30 minute între aplicări. Și HYLO GEL® ar trebui să fie utilizat întotdeauna ultimul. Unguentele oftalmologice ar trebui aplicate după folosirea HYLO GEL®.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău după mai multe zile de utilizare, consultați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Datorită lipsei conservanților, soluția HYLO GEL® este bine tolerată, chiar și în cazul utilizării pe perioade mai lungi de timp. În cazuri foarte izolate au fost raportate reacții adverse, precum hipersensibilitate, senzații de arsură sau lacrimat excesiv, durere, senzație de corp străin sau alte iritații locale temporare, care au dispărut după întreruperea utilizării soluției HYLO GEL®.

Vă rugăm să rețineți că vederea poate fi încheșată temporar, datorită vâscozității picăturilor lubrifiante. În cazuri foarte rare, acest lucru poate cauza durere de cap temporară, la pacienții sensibili.

HYLO GEL® ameliorează simptomele în cazuri mai severe sau persistente de uscăciune a ochiului. HYLO GEL® poate fi utilizat în timpul purtării lentilelor de contact, consultând medicul dumneavoastră oftalmolog. Însă, în aceste cazuri pot apărea pete pe lentilele de contact, care vor dispărea după care clipiți de câteva ori.

După introducerea lentilelor de contact, este recomandat să așteptați aproximativ 30 de minute înaintea aplicării picăturilor de ochi. Astfel, evitați reacții de intoleranță, care pot apărea din cauza interacțiunii dintre produsele de îngrijire a lentilelor și HYLO GEL®.

Conform dovezilor disponibile, HYLO GEL® poate fi folosit de către copii, femei însărcinate sau cele care alăptează.

În cazul în care un incident serios a avut loc în timpul utilizării acestui dispozitiv medical sau ca rezultat al utilizării acestuia, vă rugăm să raportați producătorului (19).

Cât de des și pe ce perioadă de timp puteți folosi HYLO GEL®?

În general, instilați o picătură de HYLO GEL®, de trei ori pe zi, în fiecare ochi. Dacă este necesar, se poate folosi și mai frecvent. Dacă folosiți HYLO GEL® mai des (ex: mai mult de 10 ori pe zi) sau când neplăcerile persistă, vă rugăm să consultați medicul oftalmolog sau farmacistul dumneavoastră.

Când nu trebuie să folosiți HYLO GEL®?

Nu utilizați HYLO GEL® dacă aveți hipersensibilitate la unul din ingredientele acestuia.

Ce trebuie să știți despre depozitarea HYLO GEL®?

A nu se păstra la mai mult de 25 °C (25 °C).

HYLO GEL® poate fi folosit timp de 6 luni de la desigilare.

A nu se utiliza după data de expirare (19).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Aruncați acest dispozitiv medical conform legislației naționale referitoare la deșeurile menajere. Această măsură va ajuta la protecția mediului.

Sunt disponibile următoarele variante de ambalaj:

Picături lubrifiante pentru ochi de 10 ml

Data revizuirii prospectului:

2022-06

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Germania

AMD Nobel Pharmaceutical SRL
Str. Poet Barbu Mumuleanu Nr 8
Sector 2, București, România
031 104 0016 sau 0720 277 538
office@amd-nobel.ro

CE 0197 MD STERILE A

Simbol:	Explicație:
	Producător
	Distribuit
MD	Dispozitiv medical
CE	Marcaj CE
STERILE A	Sterilizat, utilizând proceduri tehnice aseptice.
	Nu utilizați dacă ambalajul extern este deteriorat.
LOT	Numărul lotului
	Data de expirare (YYYY-MM)
	Citiți instrucțiunile de utilizare
	Nu depozitați la temperaturi peste 25°C.
	Utilizare multiplă pentru un singur pacient.