

**CLORAMINĂ T-SIN 500 mg - comprimate  
biocid / dezinfectant****Compoziție:**

Un comprimat conține: 500 mg tosylchloramide sodium, nr. CAS 127-65-1, nr. CE 204-854-7 și excipienți pentru un comprimat.

**Proprietăți:**

Cloramină T - Sin 500 mg comprimate este un dezinfectant cu spectru larg de acțiune asupra microorganismelor patogene, având proprietăți bactericide și fungicide.

**Eficacitate:**

Activitate	Specie	Standard	Concentrație	Temp de acțiune
Bactericidă	Staphylococcus aureus	EN 1276:2009/AC:2010	1%	20 minute
	Pseudomonas aeruginosa		10%	15 minute
	Escherichia coli	EN 13697:2015	1%	30 minute
	Enterococcus hirae		1%	30 minute
Fungicidă	Aspergillus brasiliensis	EN 13697:2015	1%	30 minute
	Candida albicans	EN 1650:2008+A1:2013	1%	20 minute

**Domenii și aria de utilizare:**

Domeniu de utilizare: produse alimentare și hrană pentru animale.

Aria de aplicare: dezinfecția echipamentelor, suprafețelor aferente producției, transportului (autovehicule), depozitării sau consumului de alimente, furaje și băuturi.

**Indicații de utilizare:**

Comprimatele de Cloramină T - Sin 500 mg se dizolvă în apă comună, la temperatura camerei. Soluția obținută se aplică pe suprafețele de interes apoi se lasă să acționeze pe durata recomandată, după care se clătește cu apă.

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/doza de aplicare	Temp de acțiune
Dezinfecția instalațiilor de spălare	20 - 22 cpr/l apă	6h
Dezinfecția obiectelor din sticlă, porțelan, plastic	10 - 20 cpr/l apă	60 minute
Dezinfecția dispensarelor veterinare, adăposturilor pentru animale, încăperilor destinate internării animalelor	40 - 60 cpr/l apă	6h

NOTĂ: Dozele prezentate sunt orientative. În condiții concrete dezinfecția este influențată de gradul de contaminare organică, temperatură, pH, materialul care trebuie dezinfectat și geometria lui.

**Categoria de utilizatori:**

Industriali, profesionali și populație.

**Atenționări și precauții:**

Nociv în caz de înghițire.  
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.  
În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.  
Atenție! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.  
**ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI:** clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  
**ÎN CAZ DE INHALARE:** transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.

**Mențiuni speciale:**

Citiți instrucțiunile atașate înainte de folosire.  
Produsul se aplică numai pe suprafețe curate și bine clătite, fără urme de detergent.

**Păstrare:**

A se păstra sub 25°C, în recipientul închis etanș, ferit de căldură, lumină și umiditate.

**Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu:**

Nu există.

**Prezentare:**

Cutie cu flacon conținând 100 comprimate.  
Cutie cu flacon conținând 50 comprimate.  
Cutie cu flacon conținând 30 comprimate.

**Producător S.C. SINTOFARM S.A.**

Str. Ziduri Între Vii, nr. 22, sector 2, București, tel. 021 252 17 15.

