

HYALO4 START

Hialuronat de sodiu 0,2% și colagenază

Unguent

Descrierea produsului

HYALO4 START este un unguent fluid pentru utilizare topică, ce conține hialuronat de sodiu obținut prin fermentație bacteriană, ca principal component, și colagenază de origine bacteriană, obținută din tulpină nepatogenică de *Vibrio alginolyticus*, ca substanță medicamentoasă incorporată. HYALO4 START permite debridarea plăgii datorită proprietăților hidratante ale acidului hialuronic care favorizează procesele fiziologice reparatorii și protejează țesutul viabil nou format. Procesul de cicatrizare a leziunilor se produce mai rapid într-un mediu umed. Colagenaza bacteriană ajută la procesul de debridare.

Compoziție

Compusul principal: hialuronat de sodiu 0,2%

Alte componente: colagenază (minim 2,0 nkat/g unguent*), parafină lichidă ușoară, vaselină albă.

**1 katal (simbol: kat) este unitatea de măsură în sistem internațional (SI) pentru activitatea catalitică.*

[Nomenclatorul Comitetului Uniunii Internaționale de Biochimie (NC-IUB (1979).]

Indicații

Tratamentul local al ulcerelor cronice (cum sunt: escarele, ulcerile vasculare ale gambei, piciorul diabetic). În mod specific, este destinat să asigure un mediu umed optim și debridarea necesare proceselor naturale de vindecare.

Doze și mod de administrare

Leziunile trebuie curățate și dezinfectate înainte de aplicare. Pentru succesul tratamentului, trebuie asigurat un nivel suficient de umiditate în aria leziunii. Leziunile uscate trebuie umezite cu ser fiziologic (0,9% NaCl) sau cu soluții bine tolerate de țesuturi, așa cum este soluția de glucoză. Escarele dure trebuie înmuiate prin aplicarea unor pansamente umede. Se aplică un strat de circa 2 mm grosime de HYALO4 START pe suprafața leziunii, o dată pe zi sau în funcție de recomandarea medicului. Se acoperă zona tratată cu un pansament steril pentru a se asigura un contact adecvat.

Sarcina și alăptarea

HYALO4 Start poate fi utilizat în timpul sarcinii și al alăptării, dacă este recomandat de medic.

Contraindicații

Pacienții cu alergii cunoscute la compușii produsului nu trebuie să utilizeze HYALO4 START.

Atenționări și precauții speciale privind utilizarea

Se recomandă a nu se utiliza produsul pentru o perioadă mai lungă de 30 zile.

În cazul unei complicații de tip infecțios, adresați-vă medicului.

A nu se utiliza tetraciclina în administrare locală împreună cu HYALO4 START.

A nu se utiliza produsul concomitent cu săpunuri/detergenți, dezinfectanți care conțin săruri cuaternare de amoniu, argint sau alte metale grele, care pot reduce activitatea produsului.

Întrebați medicul despre produsele pe care le puteți utiliza.

A nu se utiliza pe suprafețe expuse de cartilaj sau tendoane.

Evitați contactul cu ochii sau cu mucoasele.

În caz de ingestie sau inhalare accidentală, adresați-vă imediat medicului.

Evitați contactul direct dintre recipient și plagă.

După fiecare aplicare, închideți recipientul cu capacul său.

A nu se utiliza în cazul deteriorării ambalajului.

După deschiderea tubului, produsul poate fi utilizat timp de 36 luni.

A nu se utiliza produsul după data expirării înscrisă pe ambalaj. Data expirării se aplică produselor depozitate în mod corespunzător.

După utilizare, aruncați produsul în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

Efecte adverse

Pot apărea efecte adverse locale, cum ar fi durerea, senzația de mâncărime, senzația de arsură și eritem (roșeață). Nu pot fi excluse efecte adverse de tip sistemic la pacienții cu alergii cunoscute la compoziții produsului.

Depozitare

A se depozita la temperaturi care să nu depășească 30°C. A nu se congela.

Ambalare

Tub de 30 g

Producător

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme (PD) Italia

Data ultimei revizuri a instrucțiunilor de utilizare:

Martie 2016

CE 0373