

Dentosept®

0,91 g / ml
concentrat pentru soluție
bucofaringiană

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Dentosept și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dentosept
3. Cum să utilizați Dentosept
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Dentosept
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Dentosept și pentru ce se utilizează

Dentosept conține un extract alcoolic compus din flori de mușețel, scoarță de stejar, frunze de salvie, herba de arnică,

rizomi de obligeană, herba de izmă bună și herba de cimbru. Medicament tradițional pe bază de plante utilizat la pacienți de peste 6 ani ca și antiinflamator, antibacterian, antiseptic și astringent în:

- inflamații ale mucoasei orale și gâtului,
- gingivită și stomatită (incluzând și glosita),
- tendință la sângerări gingivale.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dentosept Nu utilizați Dentosept

-dacă sunteți alergic la substanțele active, alergii la Arnica, Mușețel sau alte plante din familia *Asteraceae* (fosta *Compositae*); alergii la Cimbru, Salvie, Mentă/ Izmă bună sau alte plante din familia *Lamiaceae* (fosta *Labiatae*); alergii la scoarța de Stejar, rizomi de Obligeană sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați **Dentosept** adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

O doză de medicament (10 ml) conține până la 5,67 g de etanol (alcool etilic). Medicamentul este destinat exclusiv uzului extern. Etanolul trebuie să fie luat în considerare dacă medicamentul se folosește la femei însărcinate, care alăptează sau la copii.

Copii și adolescenți

Medicamentul poate fi utilizat la copiii peste 6 ani și la adolescenți până la 18 ani numai cu recomandarea medicului.

Folosirea la copii sub 6 ani nu s-a stabilit din cauza lipsei de date adecvate.

Dentosept împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu au fost realizate studii referitoare la interacțiuni.

Dentosept împreună cu alimente, băuturi și alcool

Date indisponibile.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Din cauza lipsei de date suficiente, nu este recomandată utilizarea Dentosept pe perioada sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Imediat după utilizare, alcoolul poate fi detectat în respirație folosind un instrument de măsurare a alcoolemiei. Dacă medicamentul este folosit în concordanță cu recomandările, produsul nu ar trebui să afecteze abilitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Dentosept

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze:

Adulți: utilizați o soluție 15% preparată în modul următor: măsurați 10 ml de medicament (până la marcapul inferior al paharului dozator) și completați cu apă până la plin (până la marcapul superior al paharului dozator). Cu această soluție clătiți gura și gâtul.

PlantExtrakt®
natura sănătății tale

Copii peste 6 ani și adolescenții: după consultarea medicului, utilizați o soluție de aproximativ 4 %, preparată în modul următor: măsurați 10 ml de medicament (până la marcăjul inferior al paharului dozator) și completați cu apă într-un flacon de sticlă (aproximativ 250 ml). Cu această soluție clătiți gura și gâtul.

Copii sub 6 ani: nu se folosește.

Mod de administrare
Utilizare bucofaringiană.

Medicamentul este folosit pentru a clăti gura și/sau gâtul după o diluare prealabilă cu apă.
Clătiți de până la 3 ori pe zi.

Trebuie să discutați cu un medic dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău după 7 zile de tratament.
Medicamentul poate fi folosit pentru eliminarea simptomelor.

Dacă utilizați mai mult Dentosept decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Dentosept

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Pot să apară reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile

reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478
e-mail: adr@anm.ro
Website: www.anm.ro
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Dentosept

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.
Pentru medicamentul ambalat pentru comercializare: nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.
Pentru medicamentul în uz/ după prima deschidere: a se păstra la temperaturi sub 25°C.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Dentosept
Un ml concentrat pentru soluții bucofaringiene conține 0,91 g de lichid cu combinație fixă de extracte(0.65:1) din: flori de mușețel (*Matricaria recutita L.*), scoarță de stejar (*Quercus spp.*), frunze de salvie (*Salvia officinalis L.*), herba de arnică (*Arnica spp.*), rizomi de obligeană (*Acorus calamus L.*), herba de izmă bună (*Mentha piperita L.*), herba

de cimbru (*Thymus spp.*) (2/2/2/1/1/1/1); solvent de extracție: etanol 70% (V/V).
Conținut de etanol: 60–70% (V/V).

Cum arată Dentosept și conținutul ambalajului

Lichid de culoare brună, cu miros caracteristic componentelor; poate prezenta un sediment în timpul conservării.
Cutie cu un flacon din sticlă brună, clasa hidrolitică III, închis (prin înfiletare) cu capac din polietilenă de înaltă densitate, de culoare albă, care este prevăzut cu un limitator anti-curgere din polietilenă de joasă densitate, transparent; recipientul este însoțit de o măsură dozatoare din polipropilenă, prevăzută cu diviziune pentru 10 mL; conține 100 mL soluție.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul Phytopharm Kleka S.A.
Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polonia
Tel.: +48 61 28 68 000

Distributor/reprezentant pentru România

PlantExtrakt®
natura sănătății tale

407059 - Rădaia nr. 46, jud. Cluj, România
Tel: + 40 264 260 688
Email: contact@plantextrakt.ro

Acest prospect a fost revizuit în mai 2025.