



EDENORM

free

RO | Descriere

EDENORM free este o soluție sterilă hipertonică cu 5% clorură de sodiu pentru uz oftalmologic, fără conservanți, utilizată pentru tratarea edemului ocular.

Sticla **EDENORM free** este prevăzută cu un picurător OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) care, prin filtrul său cu aer pluristratificat și prin sistemul cu valve de sigilare a vârfului, asigură sterilitatea produsului care se menține fără conservanți.

Indicații

EDENORM free este recomandat pentru tratamentul edemului ocular.

Dozare și mod de administrare

Se aplică 1-2 picături în sacul conjunctival de 4 ori pe zi sau conform sfatului medicului.


După aplicare, închideți ochiul timp de 1 până la 2 minute, fără să clipiți.

Contraindicații

Hipersensibilitate cunoscută la componentele produsului sau la alte substanțe care au structură chimică asemănătoare.

Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de prima utilizare îndepărtați inelul de plastic ce sigilează capacul, trăgând de partea laterală (1).
- Îndepărtați capacul (2).
- Întoarceți sticluța în dreptul ochiului și strângeți-o între degetul arătător și degetul mare, pe părțile sale laterale, până când picăturile încep să curgă (3). Pe măsură ce sticluța se golește va fi nevoie de o apăsare mai puternică (4).
- Închideți sticluța la loc cu capacul (5).



Precauții și atenționări

- Acest produs este doar pentru uz oftalmologic extern.
- Pentru eliminarea riscului de contaminare a soluției, asigurați-vă că picurătorul nu intră în contact cu ochiul sau cu alte obiecte.
- Pentru a se evita rănirea suprafeței ochiului, nu atingeți ochiul cu picurătorul în timpul instilației.
- Pe măsură ce sticla se golește, va fi nevoie de mai multă forță pentru picurare.
- După utilizare, închideți bine sticla.
- Dacă se utilizează împreună cu alte medicamente topice de uz oftalmologic, consultați medicul.
- Nu utilizați produsul dacă sticla DOS este deteriorată.
- A nu se lăsa produsul la vederea și îndemâna copiilor

Efecte secundare

Nu s-au evidențiat efecte nedorite după aplicarea produsului. În caz de reacții adverse, opriți utilizarea produsului și consultați un medic. După aplicarea produsului, poate apărea o ușoară senzație de arsură la nivelul ochiului și disconfort vizual temporar.

Ingrediente

Componentul principal: clorură de sodiu 5%

Alte componente: hidroxietilceluloză, polivinilpirolidonă, copolimer polioxietilen-polioxipropilenic, polietilenglicol, acid boric, tetraborat disodic decahidratat, apă pentru preparate injectabile.

Condiții de păstrare

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

A nu se folosi produsul după data de expirare indicată pe etichetă. După prima deschidere, produsul poate fi utilizat până la data de expirare indicată pe ambalaj.

A nu se arunca în mediul înconjurător.

Data ultimei revizuiți a prospectului: Iunie 2020

 **Fidia farmaceutici S.p.A.**
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) - Italy
Tel. +39 049 8232111
www.fidiapharma.com

 0373



Atenție



Codul lotului



Consultați instrucțiunile de utilizare



Limita superioară de temperatură



Data limită de utilizare



Producător



Sterilizat cu tehnici de prelucrare aseptică



A nu se arunca în mediul înconjurător



A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat

33001624/A