

Prospect: Informații pentru utilizator

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg Glicerol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce sunt **SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg** și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați **SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg**
3. Cum să utilizați **SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg**
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce sunt SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg și pentru ce se utilizează

Substanța activă a **SUPOZITOARELOR CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI** este glicerolul (glicerina), un poliol cu proprietăți de umectare, datorate numărului mare de grupări hidroxil, care leagă și rețin apa.

SUPOZITOARELE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI sunt medicamente laxative, destinate exclusiv adulților, care pot fi folosite pentru tratarea constipației, pentru ușurarea defecației după intervenții chirurgicale sau înaintea examenului endoscopic al rectului.

Supozitoarele cu glicerină stimulează secreția la nivelul mucoasei rectale și simultan declanșează mecanismul defecației.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg

Nu utilizați SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg

- dacă sunteți alergic la glicerol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați **SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI** adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- dacă pacientul suferă de diverse afecțiuni la nivelul intestinului gros sau a rectului (obstrucție intestinală, crize hemoroidale, fisuri anale, rectocolite hemoragice). Adresați-vă medicului sau farmacistului dacă aveți nelămuriri.

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg sunt indicate doar pentru administrare rectală.

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg sunt doar un adjuvant al tratamentului igienico-dietetic. Pentru normalizarea scaunelor, suplimentați alimentația cu fibre și lichide și efectuați activități fizice.

Nu utilizați Supozitoarele cu glicerină timp îndelungat. Utilizarea pe termen lung sau utilizarea excesivă poate produce diaree. Tratamentul medicamentos al constipației este un adjuvant al tratamentului igienico-dietetic. Se indică suplimentarea alimentației cu fibre și lichide, precum și efectuarea de activități fizice.

Supozitoarele se pot introduce în prealabil în apă rece, pentru a facilita administrarea.

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu sunt cunoscute interacțiuni ale supozitoarelor cu glicerină cu alte medicamente.

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu sunt cunoscute interacțiuni ale supozitoarelor cu glicerină cu alimente sau băuturi.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există studii controlate privind efectele administrării supozitoarelor cu glicerină la femeile însărcinate.

Supozitoarele cu glicerină pot fi utilizate în timpul sarcinii și alăptării, atunci când este absolut necesar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Supozitoarele cu glicerină nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Supozitoarele cu glicerină se administrează intrarectal, după îndepărtarea ambalajului.

Doza uzuală, în constipație, este de un supozitor la nevoie.

În cazul pregătirii examenului endoscopic al rectului se administrează un supozitor cu 5-30 de minute înainte de intervenție.

Durata tratamentului

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 10 zile fără avizul medicului. În cazul în care simptomele nu se ameliorează după 10 zile de tratament, pacienții trebuie să se adreseze medicului.

Dacă utilizați mai mult SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg decât trebuie

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj, după administrarea intrarectală a supozitoarelor cu glicerină.

Dacă uitați să utilizați SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg

Puteți întrerupe tratamentul în orice moment, fără ca acest lucru să vă afecteze.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Clasificarea frecvenței acestor reacții adverse este definită astfel:

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

În dozele recomandate, după administrare intrarectală, supozitoarele cu glicerină sunt bine tolerate.

Tulburări gastrointestinale:

Frecvența necunoscută: crampe abdominale, iritație locală, senzație de arsură la nivel anal.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg

- Substanța activă este glicerolul. Fiecare supozitor conține 2100 mg glicerol.
- Celelalte componente sunt: acid stearic, carbonat de sodiu, apă purificată.

Cum arată SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU ADULȚI 2100 mg și conținutul ambalajului

Supozitoare în formă de torpilă, cu suprafața netedă, onctuoasă, omogenă în secțiune.

Cutie cu 2 blistere din PVC/PE a câte 5 supozitoare

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

Str. Industriilor, nr. 16, Sector 3, 032895, București, România

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2026.