

Prospect: Informații pentru utilizator**STREPSILS MIERE ȘI LĂMÂIE pastile**

Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, înainte de a începe să utilizați acest medicament, **deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări .
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau recomandări farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Strepsils Miere și Lămâie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Strepsils Miere și Lămâie
3. Cum să luați Strepsils Miere și Lămâie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils Miere și Lămâie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Strepsils Miere și Lămâie și pentru ce se utilizează

Strepsils Miere și Lămâie aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice

Strepsils Miere și Lămâie se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Miere și Lămâie**Nu luați Strepsils Miere și Lămâie**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol și alcool 2,4 diclorbenzilic sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.

Atenționări și precauții

- dacă aveți diabet zaharat - vezi pct. Informații importante privind unele componente ale Strepsils Miere și Lămâie

Strepsils Miere și Lămâie împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Utilizarea Strepsils Miere și Lămâie împreună cu alimente, băuturi și alcool

Strepsils Miere și Lămâie nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi ci între mese.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Strepsils Miere și Lămâie nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Strepsils Miere și Lămâie conține glucoză și zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Strepsil Miere și Lămâie conține 1441 mg zahăr și 976,2 mg glucoză/pastilă. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

3. Cum să luați Strepsils Miere și Lămâie

Luati întotdeauna Strepsils Miere și Lămâie exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Reacțiile adverse pot fi minimize prin utilizarea celei mai mici doze eficace necesare pentru a controla simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă (vezi pct. 4.4).

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile deoarece pot apare dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

Adulții

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Miere și Lămâie la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore.

Populația pediatrică

Copii cu vârsta peste 6 ani: doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

Copii cu vârsta sub 6 ani

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

Vâstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

Mod de administrare

Pentru administrare bucofaringiană.

Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Miere și Lămâie va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

Dacă ați luat mai mult Strepsils Miere și Lămâie decât trebuie

Poate apare disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatic – pentru aceasta adresați –vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

Dacă ați uitat să luați Strepsils Miere și Lămâie

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Strepsils Miere și Lămâie

Înteruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Strepsils Miere și Lămâie poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții de hipersensibilitate, greață, senzație de disconfort la nivelul gurii, diaree, erupții pe piele.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Strepsils Miere și Lămâie

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Strepsils Miere și Lămâie după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Strepsils Miere și Lămâie

- Substanțele active sunt amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzolic 1,2 mg pentru o pastilă.
- Celelalte componente sunt: acid tartric, ulei de lămâie, ulei de mentă, galben de chinolină (E 104), miere, zahăr, glucoză.

Cum arată Strepsils Miere și Lămâie și conținutul ambalajului

Strepsils Miere și Lămâie se prezintă sub formă rotundă, de pastile de culoare galbenă, cu miros predominant de miere și lămâie și logo S ștanțat.

Este disponibil în

Cutie cu 1 blister din Al/PVC-PVDC cu 12 pastile

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile

Cutie metalică din staniu cu 1 blister din Al/PVC-PVDC cu 12 pastile

Cutie cu 3 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11

Sectorul 1, București, România

Fabricantul

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

Reckitt Benckiser România SRL

Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97

Corpul A, Etaj 5, Sector 1, București, România

Tel: +4021 529 67 00

office-romania@rb.com

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2022.