

**Prospect: Informații pentru utilizator**  
**Drill 3 mg + 0,2 mg pastile**  
Digluconat de clorhexidină/clorhidrat de tetracaină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Drill și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Drill
3. Cum să utilizați Drill
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Drill
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Drill și pentru ce se utilizează**

Drill conține un antiseptic local cu acțiune antimicrobiană și un anestezic local care reduce durerea. Drill se recomandă în inflamația mucoasei oro-faringiene fără febră (ușoară durere în gât), a aftelor (ulcerații la nivelul gurii) sau în cazul altor leziuni de la nivelul mucoasei bucale.

Drill este indicat pentru adulți și copiii cu vârstă peste 6 ani.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Drill**

**Nu utilizați Drill**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la digluconat de clorhexidină, clorhidrat de tetracaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
- la copiii cu vârstă sub 6 ani.

**Atenționări și precauții**

Nu se recomandă utilizarea de lungă durată (mai mult de 5 zile) a Drill, deoarece:

- poate afecta flora microbiană obișnuită de la nivelul gurii și gâtului.

Efectul anestezic al Drill la nivelul gâtului și limbii poate provoca un fals pasaj (tuse cu senzația de „sufocare”).

- utilizați cu precauție Drill la copiii cu vârstă între 6 și 12 ani;
- nu utilizați Drill înainte de a mâncă sau a bea ceva.

Durere în gât: Dacă aveți febră, spută gălbui sau disconfort la înghițirea alimentelor, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Ulcere la nivelul gurii, ulcerații mici la nivelul gurii: Dacă aveți febră sau leziuni extinse trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră.

Colorarea în maroniu a limbii. Acest lucru este inofensiv și dispare atunci când tratamentul este oprit. Colorarea în maroniu a dinților și a lucrărilor dentare. Această colorare nu este permanentă și poate fi ușor prevenită prin perierea și curățarea periodică a dinților.

#### **Drill împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală sau remedii naturiste.

Nu utilizați în același timp mai multe medicamente care conțin un antiseptic.

#### **Fertilitatea, sarcina și alăptarea**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu se recomandă utilizarea Drill dacă credeți că sunteți gravidă, dacă sunteți gravidă sau dacă alăptăți.

#### **Drill împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Pastilele trebuie utilizate între mese, fără alimente sau băuturi, la un interval de timp cât mai mare de următorul consum de alimente sau lichide, tetracaina fiind un anestezic ușor care ar putea induce sufocare.

#### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu se cunosc sau sunt neglijabile efectele asupra conducerii vehiculelor și folosirii utilajelor.

#### **Drill conține 1555 mg zahăr și 870 mg glucoză/pastilă.**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Drill conține roșu coșenila A (E 124). Poate provoca reacții alergice.

### **3. Cum să utilizați Drill**

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### *Adulți și copii cu vîrstă peste 15 ani*

Doza recomandată este de o pastilă de 4 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 2 ore.

#### *Copii cu vîrstă cuprinsă între 6 și 15 ani*

Doza recomandată este de o pastilă de 2-3 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 4 ore.

#### *Copii cu vîrstă sub 6 ani*

Nu utilizați la copiii cu vîrstă sub 6 ani.

Pastilele se sug, fără a se mesteca.

Durata tratamentului

Dacă simptomele persistă mai mult de 5 zile, adresați-vă medicului.

#### **Dacă utilizați mai mult Drill decât trebuie**

Dacă dumneavoastră sau un copil luați accidental mai mult Drill decât trebuie:

- o cantitate mică nu ar trebui să aibă nici un efect secundar.
- în cazul unei cantități mari (de exemplu, mai multe pastile) trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră.

Efectele adverse ale clorhexidinei sunt puțin probabile, dar ar putea apărea simptome de disconfort digestiv, senzație de arsură în gură și gât, ușoară necordonare a mișcărilor sau tulburări hepatice.

Tetracaina poate avea ca efect advers amorteala limbii și o posibilă senzație de sufocare. Pot să apară tulburări ale sistemului nervos (nervoziitate, tulburări de vedere, convulsii), tulburări cardiovasculare (hipotensiune arterială, bradicardie, aritmie ventriculară) și methemoglobinemie (boală de sânge, în care se produce o cantitate anormală de methemoglobină - o formă de hemoglobină).

#### **Dacă uitați să utilizați Drill**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții pot să apară cu o frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- Reacții alergice: dacă aveți o erupție, umflarea gurii sau feței, aveți dificultăți în respirație opriți utilizarea acestui medicament și consultați medicul imediat. Foarte rar, aceste efecte pot fi simptome ale unei reacții alergice severe.
- Colorarea în maroniu a limbii: acest lucru nu este periculos și dispără atunci când tratamentul este oprit.
- Colorarea în maroniu a dinților și lucrărilor dentare: această colorare nu este permanentă și poate fi ușor prevenită prin perierea și curățarea periodică a dinților.
- Pasaj fals (tuse în timpul mesei, cu senzația că alimentele "merg în jos pe un drum greșit"): acest lucru este cauzat de tetracaină (un anestezic ușor), care ar putea induce sufocare. Dacă se întâmplă acest lucru, înterupeți tratamentul.

#### **Raportarea reacțiiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Drill**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Drill**

- Substanțele active sunt: digluconatul de clorhexidină și clorhidratul de tetracaină. O pastilă conține digluconat de clorhexidină 3 mg și clorhidrat de tetracaină 0,2 mg.

- Celealte componente sunt: acid ascorbic, glicirizinat de amoniu, aromă naturală de mac roșu, aromă de pulmoral LE 1444, rosu de coșenilă A (E 124), zahăr, glucoză sub formă de soluție 80%.

#### **Cum arată Drill și conținutul ambalajului**

Drill se prezintă sub formă de pastile rotunde, de culoare roșie, cu gust caracteristic de bitter.

#### **Ambalaj**

Cutie cu 2 blistere a către 12 pastile

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

##### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Pierre Fabre Medicament  
45 Place Abel Gance, 92 100 Boulogne, Cedex  
Franța  
Tel: +40213017474  
Fax: +40213017475

##### **Fabricantul**

Pierre Fabre Medicament Production  
Site Diététique et Pharmacie  
Zone Industrielle de la Coudette  
32290 Aignan  
Franța

{Sigla:  
Pierre Fabre  
Consumer Health Care  
UNE DIVISION PIERRE FABRE MÉDICAMENT}

**Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2016**