

Prospect: Informații pentru utilizator
Drill fără zahăr 3 mg + 0,2 mg pastile
Digluconat de clorhexidină/clorhidrat de tetracaină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Drill fără zahăr și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Drill fără zahăr
3. Cum să utilizați Drill fără zahăr
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Drill fără zahăr
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Drill fără zahăr și pentru ce se utilizează

Drill fără zahăr conține un antiseptic local cu acțiune antimicrobiană și un anestezic local care reduce durerea. Drill fără zahăr se recomandă în inflamația mucoasei oro-faringiene (ușoară durere în gât) fără febră, a aftelor (ulcerațiilor la nivelul gurii) sau în cazul altor leziuni de la nivelul mucoasei bucale.

Drill fără zahăr este indicat pentru adulți și copiii cu vârsta peste 6 ani.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Drill fără zahăr

Nu utilizați Drill fără zahăr

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la digluconat de clorhexidină, clorhidrat de tetracaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- dacă suferiți de o boală ereditară numită fenilcetonurie (vă rugăm să consultați finalul punctului 2).
- la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Nu se recomandă utilizarea de lungă durată (mai mult de 5 zile) a Drill fără zahăr, deoarece:

- poate afecta flora microbiană obișnuită de la nivelul gurii și gâtului;

Efectul anestezic al Drill fără zahăr la nivelul gâtului și limbii poate provoca un fals pasaj (tuse cu senzația de „sufocare”).

- utilizați cu precauție Drill fără zahăr la copii cu vârsta între 6 și 12 ani;
- nu utilizați Drill fără zahăr înainte de a mânca sau a bea ceva.

Durere în gât: Dacă aveți febră, spută gălbuie sau disconfort la înghițirea alimentelor, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Ulcere la nivelul gurii, ulceratii mici la nivelul gurii: Dacă aveți febră sau leziuni extinse trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră.

Colorarea în maroniu a limbii. Acest lucru este inofensiv și dispare atunci când tratamentul este oprit. Colorarea în maroniu a dinților și a lucrărilor dentare. Această colorare nu este permanentă și poate fi ușor prevenită prin perierea și curățarea periodică a dinților.

Drill fără zahăr împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală sau remedii naturiste.

Nu utilizați în același timp mai multe medicamente care conțin un antiseptic.

Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu se recomandă utilizarea Drill fără zahăr dacă credeți că sunteți gravidă, dacă sunteți gravidă sau dacă alăptați.

Drill fără zahăr împreună cu alimente, băuturi și alcool

Pastilele trebuie utilizate între mese, fără alimente sau băuturi, la un interval de timp cât mai mare de următorul consum de alimente sau lichide, tetracaina fiind un anesteziec ușor care ar putea induce sufocare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu se cunosc sau sunt negliabile efectele asupra conducerii vehiculelor și folosirii utilajelor.

Drill fără zahăr conține aspartam (E 951). Este sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător pentru persoanele cu fenilcetonurie.

Drill fără zahăr conține izomaltitol (E 953). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

3. Cum să utilizați Drill fără zahăr

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii cu vârsta peste 15 ani

Doza recomandată este de o pastilă de 4 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 2 ore.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani

Doza recomandată este de o pastilă de 2-3 ori pe zi; intervalul dintre administrări trebuie să fie de minim 4 ore.

Copii cu vârsta sub 6 ani

Nu utilizați la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Pastilele se sug, fără a se mesteca.

Durata tratamentului

Dacă simptomele persistă mai mult de 5 zile, adresați-vă medicului.

Dacă utilizați mai mult Drill fără zahăr decât trebuie

Dacă dumneavoastră sau un copil luați accidental mai mult Drill fără zahăr decât trebuie:

- o cantitate mică nu ar trebui să aibă nici un efect secundar.
- în cazul unei cantități mari (de exemplu, mai multe pastile) trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră.

Efectele adverse ale clorhexidinei sunt puțin probabile, dar ar putea apărea simptome de disconfort digestiv, senzație de arsură în gură și gât, ușoară necoordonare a mișcărilor sau tulburări hepatice. Tetracaina poate avea ca efect advers amorțeala limbii și o posibilă senzație de sufocare. Pot să apară tulburări ale sistemului nervos (nervozitate, tulburări de vedere, convulsii), tulburări cardiovasculare (hipotensiune arterială, bradicardie, aritmie ventriculară) și methemoglobinemie (boală de sânge, în care se produce o cantitate anormală de methemoglobină - o formă de hemoglobină).

Dacă uitați să utilizați Drill fără zahăr

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții pot să apară cu o frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- Reacții alergice: dacă aveți o erupție, umflarea gurii sau feței, aveți dificultăți în respirație opriți utilizarea acestui medicament și consultați medicul imediat. Foarte rar, aceste efecte pot fi simptome ale unei reacții alergice severe.
- Colorarea în maroniu a limbii: acest lucru nu este periculos și dispare atunci când tratamentul este oprit.
- Colorarea în maroniu a dinților și lucrărilor dentare: această colorare nu este permanentă și poate fi ușor prevenită prin perierea și curățarea periodică a dinților.
- Pasaj fals (tuse în timpul mesei, cu senzația că alimentele "merg în jos pe un drum greșit"): acest lucru este cauzat de tetracaină (un anestezic ușor), care ar putea induce sufocare. Dacă se întâmplă acest lucru, întrerupeți tratamentul.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Drill fără zahăr

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Drill fără zahăr

- Substanțele active sunt: digluconatul de clorhexidină și clorhidratul de tetracaină. O pastilă conține digluconat de clorhexidină 3 mg și clorhidrat de tetracaină 0,2 mg.
- Celelalte componente sunt: acid ascorbic, glicirizinat de amoniu, aromă naturală de mac roșu, aromă de pulmoral LE 1444, aspartam (E 951), izomalt (E 953).

Cum arată Drill fără zahăr și conținutul ambalajului

Drill fără zahăr se prezintă sub formă de pastile rotunde, translucide cu aromă și gust caracteristic de bitter.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere a câte 12 pastile.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Pierre Fabre Medicament
45 Place Abel Gance, 92 100 Boulogne, Cedex
Franța
Tel: +40213017474
Fax: +40213017475

Fabricantul

Pierre Fabre Medicament Production
Site Diététique et Pharmacie
Zone Industrielle de la Coudette
32290 Aignan
Franța

{Sigla:
Pierre Fabre
Consumer Health Care
UNE DIVISION PIERRE FABRE MÉDICAMENT}

Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2016.