

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**XYLO-NASAL 1 mg/ml picături nazale, soluție**
Clorhidrat de xilometazolină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați Xylo-nasal 1 mg/ml cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 7 zile.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Xylo-nasal și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Xylo-nasal
3. Cum să utilizați Xylo-nasal
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Xylo-nasal
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE XYLO-NASAL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Xylo-nasal este o soluție nazală ce conține substanța activă clorhidrat de xilometazolină. Xylo-nasal acționează prin constricția vaselor de sânge de la nivelul nasului.

Xylo-nasal vă ajută să respirați mai ușor și eliberează rapid nasul înfundat datorită răcelii, rinitelor alergice și sinuzitei.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie Xylo-nasal și dacă aveți o infecție în ureche, pentru că Xylo-nasal administrat la nivelul nasului decongestionează nasul și gâtul.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie Xylo-nasal și în vederea efectuării unei examinări a nasului.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI XYLO-NASAL**Nu utilizați Xylo-nasal**

- dacă sunteți alergic la clorhidrat de xilometazolină sau la oricare dintre celelalte componente ale Xylo-nasal enumerate în prospect la punctul 6.
- dacă aveți mucoasa nasului uscată și fără secreții (rinita sicca);
- dacă aveți presiune crescută la nivelul ochiului (glaucom);
- la copii cu vârsta sub 6 ani;
- dacă vi s-a efectuat recent o operație prin nas la nivelul creierului (îndepărtarea glandei hipofize).

Aveți grijă deosebită când utilizați Xylo-nasal

Înainte de tratamentul cu Xylo-nasal trebuie să-i spuneți medicului dumneavoastră, dacă aveți:

- dacă aveți afecțiuni ale inimii sau circulației (inclusiv tensiune arterială crescută);
- glanda tiroidă nu funcționează normal (hipertiroidism);
- presiune crescută la nivelul ochiului (glaucom cu unghi închis);
- creșterea peste normal a concentrației de glucoză în sânge (diabet zaharat);
- o tumoră a glandelor suprarenale, care determină creșterea tensiunii arteriale (feocromocitom).

Discutați cu medicul dumneavoastră, înainte să vă administrați Xylo-nasal, dacă ați avut o reacție exagerată la administrarea de substanțe din aceeași clasă, care s-a manifestat prin insomnie, amețeli, tremor, palpitații sau creșterea tensiunii arteriale.

Dacă utilizați Xylo-nasal perioade mai lungi de timp sau doze mari, poate determina reparația sau agravarea înfundării nasului.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu începeți utilizarea Xylo-nasal și spuneți medicului dumneavoastră dacă luați tratament cu următoarele medicamente:

- medicamente pentru depresie, efedrină, medicamente ce conțin cofeină sau băuturi energizante pe bază de cofeină și guarana, medicamente pentru controlul greutății, oxitocină, medicație pentru tiroidă, deoarece administrarea acestora împreună cu Xylo-nasal poate produce creșterea tensiunii arteriale;
- alte medicamente care pot interacționa cu Xylo-nasal (medicamente care susțin respirația, medicamente blocante adrenergice, medicamente vasodilatatoare, medicamentele mielosupresoare, ergotamină, metisergidă).

Folosirea Xylo-nasal împreună cu alimente și băuturi

Administrarea concomitentă cu cofeină sau băuturi energizante poate determina creșterea tensiunii arteriale.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu utilizați Xylo-nasal în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Xylo-nasal nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Xylo-nasal

Xylo-nasal conține: clorură de benalconiu. Clorura de benalconiu este iritantă și poate provoca reacții adverse la nivelul pielii.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI XYLO-NASAL

Doza

Adulți, vârstnici, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani

Doza uzuală este de 2 picături în fiecare nară, de cel mult 4 ori pe zi.

Durata tratamentului este de maxim 7 zile. Dacă starea dumneavoastră nu s-a îmbunătățit sau s-a agravat, trebuie să vă prezentați la medic.

Înainte să utilizați din nou Xylo-nasal este necesară o pauză de cel puțin 5 zile între perioadele de tratament. Utilizarea prelungită sau excesivă poate determina reparația sau agravarea înfundării nasului.

Instrucțiuni de utilizare a Xylo-nasal

- Suflați nasul.
- Spălați-vă pe mâini.
- Deșurubați capacul flaconului.
- Lăsați capul pe spate, cu fața în sus, într-o poziție confortabilă.
- Aduceți aproape de nas vârful flaconului, fără a atinge nările, sau alte zone apropiate.
- Administrați picăturile în fiecare nară și mențineți capul lăsat pe spate pentru a permite împrăștierea acestora în nas.
- Puneți înapoi capacul flaconului, imediat după utilizare.

Dacă ați utilizat mai mult Xylo-nasal decât trebuie

Dacă ați utilizat accidental o doză mai mare decât cea recomandată trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră sau să mergeți la cel mai apropiat spital.

Dacă ați uitat să utilizați Xylo-nasal

Xylo-nasal se utilizează la nevoie. Dacă ați uitat să vă puneți picăturile nazale și este necesar acest lucru, administrați-le imediat ce vă aduceți aminte. Nu vă administrați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Xylo-nasal poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse mai puțin frecvente (acestea pot afecta 1 până la 10 pacienți din 1000):

- senzație de arsură locală, uscăciune sau iritație a mucoasei nazale;
- greață, durere de cap.

Reacții adverse foarte rare (apar la mai puțin de 1 utilizator din 10000):

- vedere neclară trecătoare, amețeli, insomnie, agitație;
- palpitații, bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială crescută;
- dificultăți de respirație și angioedem manifestat prin respirație șuierătoare, umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului, mâncărimi intense sau erupții severe pe piele.

În tratamentul de lungă durată sau cu doze mari, poate apărea senzația de arsură nazală sau de uscăciune a mucoasei, precum și reparația sau agravarea înfundării nasului.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ XYLO-NASAL

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați Xylo-nasal după data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Xylo-nasal

- Substanța activă este clorhidratul de xilometazolină. Un mililitru picături nazale soluție conține 1 mg clorhidrat de xilometazolină.
- Celelalte componente sunt: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, hidrogenofosfat de sodiu dodecahidrat, edetat disodic dihidrat, clorură de sodiu, clorură de benzalconiu, apă purificată.

Cum arată Xylo-nasal și conținutul ambalajului

Xylo-nasal se prezintă sub formă de picături nazale, soluție limpede, incoloră.

Cutie cu un flacon picurător din PEJD, de culoare albă, conținând 10 ml picături nazale, soluție.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. Rompharm Company S.A.,

Str. Eroilor, nr.1A. Otopeni, Jud Ilfov, România

Acest prospect a fost aprobat în Martie 2012