

Prospect: Informații pentru utilizator**Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg comprimate filmate**
perindopril tosilat/indapamidă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse adresati-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg
3. Cum să luați Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg și pentru ce se utilizează**Ce este Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg?**

Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg este o combinație a două substanțe active, perindopril și indapamidă. Este un medicament antihipertensiv și este utilizat în tratamentul tensiunii arteriale mari (hipertensiune arterială).

Pentru ce se utilizează Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg?

Perindoprilul aparține unei clase de medicamente numite inhibitori ai ECA. Aceștia acționează prin lărgirea vaselor de sânge, fapt care face mai ușoară pomparea săngelui de către inimă în vase. Indapamida este un diuretic. Diureticile măresc cantitatea de urină produsă de către rinichi. Cu toate acestea, indapamida este diferită de alte diuretice, deoarece determină o ușoară creștere a cantității de urină produsă. Fiecare dintre cele două substanțe active reduce tensiunea arterială și acționează împreună pentru controlul tensiunii arteriale.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg**Nu luați Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg**

- dacă sunteți alergic la perindopril sau la orice alt inhibitor ai ECA, la indapamidă sau la orice altă sulfonamidă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6),
- dacă ați prezentat simptome, cum sunt respirație ţuierătoare, umflare a feței sau a limbii, mâncărimi intense sau erupții trecătoare severe pe piele, asociate cu terapia anterioară cu inhibitori ai ECA sau dacă dumneavoastră sau un membru al familiei a prezentat aceste simptome în orice alte circumstanțe (situație numită angioedem),
- dacă aveți o boală severă a ficatului sau aveți o afecțiune numită encefalopatie hepatică (boală degenerativă a creierului),

- dacă aveți o afecțiune severă a rinichilor sau efectuați ședințe de dializă,
- dacă aveți valori mari sau mici ale potasiului în sânge,
- dacă sunteți suspectat că aveți insuficiență cardiacă decompensată, nefratată (retenție severă de apă, dificultate la respirație),
- dacă sunteți gravidă de mai mult de 3 luni (De asemenea, este mai bine să evitați să luați Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg la începutul sarcinii - vezi pct. „Sarcina, alăptarea și fertilitatea”),
- dacă alăptăți,
- dacă aveți diabet zaharat sau funcția rinichilor afectată și urmați tratament cu un medicament pentru scăderea tensiunii arteriale care conține aliskiren,
- dacă ați luat sau luați în prezent sacubitril/valsartan, un medicament utilizat pentru tratarea unui tip de insuficiență cardiacă (cronică) de lungă durată la adulți, deoarece riscul de angioedem (umflare rapidă sub piele într-o zonă cum ar fi gâtul) este crescut.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă luați oricare dintre următoarele medicamente, riscul de apariție a angioedemului poate fi crescut:
 - racecadotril, un medicament utilizat pentru tratamentul diareei;
 - medicamente utilizate pentru a preveni respingerea transplantului de organ și pentru cancer (de exemplu: temsirolimus, sirolimus și everolimus, temsirolimus);
 - vidagliptin, un medicament utilizat pentru tratamentul diabetului zaharat.
- dacă aveți stenoză aortică (îngustare a vasului de sânge principal care pleacă din inimă) sau cardiomiopatie hipertrofică (boală a mușchiului inimii) sau stenoză a arterei renale (îngustare a arterei care irigă cu sânge rinichiul),
- dacă aveți orice alte probleme ale inimii sau rinichilor,
- dacă aveți probleme ale ficatului,
- dacă aveți o boală de colagen (o afecțiune a pielii), cum este lupus eritematos sistemic sau sclerodermie,
- dacă aveți ateroscleroză (îngroșare a arterelor),
- dacă aveți hiperparatiroidism (hiperactivitate a glandei paratiroide),
- dacă aveți gută,
- dacă aveți diabet zaharat,
- dacă urmați un regim alimentar cu restricție de sare sau utilizați substituenți de sare care conțin potasiu,
- dacă luați litiu sau diuretice care economisesc potasiu (spironolactonă, triamteren), trebuie să evitați utilizarea concomitentă de Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg (vezi pct. “Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg împreună cu alte medicamente”),
- dacă luați oricare dintre următoarele medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale mari:
 - un blocant al receptorilor angiotensinei II (BRA) (cunoscuți și sub denumirea de „sartani” – de exemplu, valsartan, telmisartan, irbesartan), mai ales dacă aveți probleme ale rinichilor asociate diabetului zaharat.
 - aliskiren.
- dacă aveți o scădere a vederii sau durere oculară. Acestea pot fi simptome ale acumulării de lichid în stratul vascular al ochiului (efuziune coroidiană) sau o creștere a presiunii la nivelul ochiului, care poate apărea în decurs de câteva ore până la săptămâni de la administrarea Perindopril Tosilat/Indapamidă Teva. Aceasta poate conduce la afectarea permanentă a vederii, dacă nu este tratată. Dacă ați avut antecedente de alergie la penicilină sau sulfonamidă, aveți un risc mai mare de a dezvolta această reacție.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă verifice funcția rinichilor, tensiunea arterială și valorile electrolitilor (de exemplu, potasiu) din sânge, la intervale regulate de timp.

Vezi și informațiile de la pct. „Nu luați Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg”.

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că sunteți (sau intenționați să rămâneți) gravidă. Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg nu este recomandat la începutul sarcinii și nu trebuie utilizat dacă aveți peste 3 luni de sarcină, deoarece, dacă este utilizat în acest stadiu al sarcinii, vă poate afecta grav copilul (vezi pct. „Sarcina, alăptarea și fertilitatea”).

Dacă luați Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg, trebuie, de asemenea, să îl informați pe medicul dumneavoastră sau personalul medical:

- dacă urmează să vi se efectueze anestezie și/sau o intervenție chirurgicală,
- dacă de curând ați prezentat diaree sau vărsături, sau sunteți deshidratat,
- dacă urmează să efectuați ședințe de dializă sau afereză de LDL (care constă în îndepărțarea colesterolului din sânge de către un aparat),
- dacă urmează să efectuați un tratament de desensibilizare pentru a reduce efectele alergiei la întepătuarea de albină sau viespe,
- dacă urmează să efectuați o investigație medicală care necesită injectarea unei substanțe de contrast iodat (o substanță care permite vizualizarea cu raze X a organelor, cum sunt rinichii sau stomacul).

Sportivii trebuie atenționați că Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg conține o substanță activă (indapamida) care poate determina pozitivarea reacției la testul antidoping.

Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg nu trebuie administrat la copii și adolescenți.

Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Trebuie să evitați utilizarea Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg împreună cu:

- litiu (utilizat în tratamentul depresiei),
- suplimentele de potasiu (inclusiv înlocuitorii de sare), diuretice care economisesc potasiul și alte medicamente care pot crește cantitatea de potasiu din sânge (de exemplu: trimetoprim și cotrimoxazol pentru infectiile cauzate de bacterii, ciclosporină, un medicament imunosupresor utilizat pentru a preveni respingerea transplantului de organe; și heparină, un medicament folosit pentru a subția sângele pentru a preveni formarea de cheaguri).

Tratamentul cu Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg poate fi influențat de alte medicamente. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă modifice doza și/sau să ia alte măsuri de precauție. Acestea includ:

- alte medicamente pentru tratamentul tensiunii arteriale mari,
- este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să vă modifice doza și/sau să ia alte măsuri de precauție: Dacă luați un blocant al receptorilor angiotensinei II (BRA) sau aliskiren (vezi și informațiile de la punctele „Nu luați Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg” și „Atenționări și precauții”),
- medicamente administrate cel mai frecvent pentru tratamentul diareei (racecadotril) sau pentru a evita respingerea organelor transplantate (sirolimus, everolimus, temsirolimus și alte medicamente care aparțin clasei numite inhibitori ai mTOR). Vezi pct. ‘Atenționări și precauții’.
- procainamidă (pentru tratamentul bătailor neregulate ale inimii),
- allopurinol (pentru tratamentul gutei),
- terfenadină sau astemizol (antihistaminice pentru “febra fânului” sau alte alergii),
- corticosteroizi utilizati pentru tratamentul diferitelor afecțiuni, inclusiv astmul bronșic sever și poliartrita reumatoidă,
- imunosupresoare utilizate pentru tratamentul afecțiunilor autoimune sau după operațiile de transplant pentru a preveni respingerea organului transplantat (de exemplu: ciclosporina),
- medicamente utilizate în tratamentul cancerului,
- eritromicină administrată injectabil (un antibiotic),
- halofantrină (utilizată pentru tratamentul unor anumite tipuri de malarie),
- pentamidină (utilizată pentru tratamentul pneumoniei),
- aur administrat injectabil (utilizat pentru tratamentul poliartritei reumatoide),

- vincamină (utilizată pentru tratamentul simptomatic al afecțiunilor cognitive la vârstnici, inclusiv tulburările de memorie),
- bepridil (utilizat pentru tratamentul anginei pectorale),
- sultopridă (pentru tratamentul psihozelor),
- medicamente utilizate pentru tulburări ale ritmului bătailor inimii (de exemplu: chinidina, hidrochinidina, disopiramida, amiodarona, sotalolul),
- digoxină sau alte glicozide cardiace (pentru tratamentul afecțiunilor inimii),
- baclofen (pentru tratamentul rigidității musculare care apare în afecțiuni cum este scleroza multiplă),
- medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat, cum sunt insulina sau metforminul, calciu, inclusiv suplimente care conțin calciu,
- laxative stimulante (de exemplu: senna),
- medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (de exemplu: ibuprofen) sau doze mari de salicilați (de exemplu: acid acetilsalicilic),
- amfotericină B administrată injectabil (pentru tratamentul infecțiilor fungice severe),
- medicamente pentru tratamentul afecțiunilor mintale cum sunt depresia, anxietatea, schizofrenia (de exemplu: antidepresive triciclice, neuroleptice),
- tetracosactidă (pentru tratamentul bolii Crohn).

Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg împreună cu alimente și băuturi

Este de preferat să luați Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg înainte de masă.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Trebuie să-i spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că sunteți (sau intenționați să rămâneți) gravidă.

Sarcina

În mod obișnuit, medicul dumneavoastră vă va sfătuī să opriți utilizarea Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg înainte de a rămâne gravidă sau imediat după ce aflați că sunteți gravidă și vă va recomanda să luați alt medicament în loc de Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg.

Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg nu este recomandat la începutul sarcinii și nu trebuie utilizat dacă aveți peste 3 luni de sarcină, deoarece, dacă este administrat după luna a treia de sarcină, vă poate afecta grav copilul.

Alăptarea

Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă alăptați sau urmează să începeți să alăptați.

Nu trebuie să luați Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg dacă alăptați.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

Fertilitatea

Nu se cunosc efectele perindoprilului sau indapamidei asupra fertilității la om.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg nu modifică vigilența, dar la anumiți pacienți pot să apară diferite reacții adverse cum sunt amețelile sau slăbiciunea, determinate de scăderea tensiunii arteriale. Dacă acest lucru este valabil în cazul dumneavoastră, capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje poate fi afectată.

Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Perindopril Tosilat/Indapamidă Teva 2,5 mg/0,625 mg conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per comprimat filmat, adică practic "nu conține sodiu".

3. Cum să luați Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. Doza uzuală este de un comprimat o dată pe zi. Medicul dumneavoastră poate decide să modifice modul de administrare a dozelor dacă aveți insuficiență renală. Luați comprimatul preferabil dimineață și înaintea mesei. Înghițiți comprimatul cu un pahar cu apă.

Comprimatul poate fi divizat în doze egale.

Dacă luați mai mult Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg decât trebuie

Dacă ați luat prea multe comprimate, adresați-vă imediat departamentului de urgență al celui mai apropiat spital sau spuneți medicului dumneavoastră. Cea mai frecventă reacție în caz de supradozaj este tensiunea arterială mică care poate determina amețeli sau leșin. Dacă apar acestea, poate fi utilă așezarea pacientului în poziție întins pe spate cu picioarele ridicate.

Dacă uitați să luați Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg

Este important să luați medicamentul zilnic, deoarece tratamentul regulat este mai eficace. Cu toate acestea, dacă uitați să luați o doză de Perindopril Tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg, luați doza următoare la momentul obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg

Deoarece tratamentul pentru tensiunea arterială mare este, de obicei, pe toată durata vieții, trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a întrerupe acest medicament.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Întrerupeți imediat administrarea medicamentului și spuneți imediat medicului dumneavoastră, dacă observați apariția oricărei dintre următoarele reacții adverse:

- umflare a feței, buzelor, limbii sau gâtului, dificultăți la respirație,
- amețeli severe sau leșin,
- bătăi neobișnuit de rapide sau neregulate ale inimii.

În ordinea descrescătoare a frecvenței, reacțiile adverse pot include:

- Reacții adverse frecvente: (pot afecta până la 1 din 10 persoane)
durere de cap, amețeli, senzație de învărtire, crampe și înțepături, tulburări de vedere, tinitus (senzație de zgomote în urechi), senzație de confuzie din cauza tensiunii arteriale mici, tuse, scurtare a respirației, tulburări gastro-intestinale (greață, vârsături, dureri abdominale, tulburări ale gustului, uscăciune a gurii, dispepsie sau digestie dificilă, diaree, constipație), reacții alergice (cum sunt erupții trecătoare pe piele, mâncărini), crampe musculare, senzație de oboselă,
- Reacții adverse mai puțin frecvente: (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)
schimbări ale stării de dispoziție, tulburări ale somnului, bronhospasm (senzație de apăsare în piept, respirație ţuierătoare și scurtată), angioedem (cu simptome cum sunt respirație ţuierătoare, umflare a feței sau limbii), urticarie, purpură (puncte roșii pe piele), probleme ale rinichilor, impotență, transpirații,
- Reacții adverse rare: (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- agravare a psoriazisului,
- Reacții adverse foarte rare: (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane) confuzie, tulburări cardiovasculare (bătăi neregulate ale inimii, angină pectorală, infarct miocardic), pneumonie eozinofilică (o formă rară de pneumonie), rinită (nas înfundat sau cu secreții abundente), reacție alergică în intestinul subțire (angioedem intestinal), manifestări severe pe piele cum este eritemul polimorf. Dacă aveți lupus eritematos sistemic (o boală de colagen), acesta se poate agrava. Au fost raportate, de asemenea, cazuri de reacții de fotosensibilitate (modificări ale aspectului pielii) după expunerea la soare sau la radiații UVA artificiale. Insuficiență renală acută
- Reacții adverse cu frecvență necunoscută: (care nu poate fi estimată din datele disponibile) scădere a vederii sau durere oculară din cauza presiunii crescute (semne posibile ale acumulării de lichid în stratul vascular al ochiului (efuziune coroidiană) sau glaucom acut cu unghi încis), leșin, modificări ale culorii pielii, amorteală și durere la nivelul degetelor de la mâini sau de la picioare (fenomen Raynaud), bătăi neregulate ale inimii, care pot pune viața în pericol (torsada vârfurilor), aspect anormal al electrocardiogramei, valori serice crescute ale enzimelor hepatiche.

Pot apărea tulburări la nivelul săngelui, rinichilor, ficatului sau pancreasului și modificări ale parametrilor de laborator (analize de sânge). Medicul dumneavoastră vă poate recomanda efectuarea de analize ale săngelui pentru a vă urmări starea.

În caz de insuficiență hepatică (afecțiuni ale ficatului), există posibilitatea instalării encefalopatiei hepatice (boală degenerativă la nivelul creierului).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare ale cărui detaliu sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. <http://www.anm.ro/>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe etichetă, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

După deschidere, a se utiliza în termen de 100 de zile.

Păstrați flaconul bine încis, pentru a fi protejat de umiditate.

Acest medicament nu necesită condiții de temperatură speciale pentru păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Perindopriltosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg

- Substanțele active sunt perindopril tosilat și indapamidă. Fiecare comprimat filmat conține perindopril tosilat 5 mg (corespunzând la perindopril 3,408 mg) și indapamidă 1,25 mg.
- Celelalte componente sunt lactoză monohidrat, amidon de porumb, hidrogenocarbonat de sodiu, amidon (de porumb) pregelatinizat, povidonă, stearat de magneziu, alcool polivinilic parțial hidrolizat, dioxid de titan E 171, macrogol/PEG 3350 și talc.

Cum arată Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg și conținutul ambalajului

Perindopril tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg sunt comprimate filmate în formă de capsulă, biconvexe, de culoare albă, marcate cu "P", "I" și o linie mediană pe o față și netede pe cealaltă față. Comprimatul poate fi divizat în doze egale.

Comprimatele sunt disponibile în flacoane cu 30, 60, 90, 90 (3x30) sau 100 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărurile de ambalaj să fie comercializate.

Definitorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Definitorul autorizației de punere pe piață

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Str. Domnița Ruxandra nr.12, parter, sector 2, București, 020562

România

Telefon: 021 230 65 24

Fabricantul

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungaria

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Marea Britanie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Olanda

Teva Operations Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow

Polonia

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

BG Zaprinel plus

EE Perindopril/Indapamida Teva

FR Perindopril /Indapamide Teva 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé

HU Perindopril-tozilát/Indapamid Teva 5 mg/1,25 mg filmtabletta

IE Indapamide/Perindopril tosilate Teva 5 mg/1,625 mg Film-coated tablets

IT Perindopril e Indapamide Teva Teva 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film

LT Perindopril/Indapamide Teva 5mg/1,25mg plévele dengtos tabletės

LV Perindopril/Indapamide Teva 5mg/1,25mg apvalkotās tabletes

NL Perindopril tosilaat/Indapamide Teva 5 mg/1,25 mg, filmomhulde tabletten

PL Indix Combi

RO Perindopril Tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1,25 mg comprimate filmate

SI Perivol Combo 5 mg/1,25 mg filmsko obložene tablete

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2021.