

**PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR****ACEVIREX 50 mg/g cremă**

Aciclovir

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**În acest prospect găsiți:**

1. Ce este Acevirex cremă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Acevirex cremă
3. Cum să utilizați Acevirex cremă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Acevirex cremă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Acevirex cremă și pentru ce se utilizează**

Acevirex cremă conține o substanță activă numită aciclovir.

Acevirex cremă este folosit pentru a trata ulcerările herpetice, herpesul genital și alte infecții ale pielii determinate de virusul herpes simplex. Nu se va administra în ochi, în interiorul gurii sau al vaginului.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Acevirex cremă****Nu utilizați Acevirex cremă dacă:**

- sunteți alergic (hipersensibil) la aciclovir, valaciclovir sau la oricare dintre celelalte componente ale Acevirex cremă

Dacă nu sunteți sigur, întrebați medicul sau farmacistul înainte să utilizați Acevirex cremă.

**Atenționări și precauții**

- dacă sunteți gravidă, încercați să deveniți gravidă sau alăptați?

Dacă răspunsul este da la oricare dintre aceste întrebări (sau nu sunteți sigură de răspuns) și nu le-ați discutat niciodată cu un medic, informați medicul sau farmacistul înainte de a folosi medicamentul.

Aveți afecțiuni care vă pot slăbi sistemul imunitar de exemplu o infecție cu virusul HIV, un transplant de măduvă osoasă sau urmați un tratament pentru cancer? În acest caz, o infecție a pielii poate fi mai serioasă pentru dumneavoastră decât pentru alte persoane.

Informați medicul dumneavoastră de fiecare dată când apar ulcerările herpetice. Nu vă tratați singur cu Acevirex cremă decât dacă medicul vă recomandă aceasta.

### **Acevirex cremă împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală, deși nu au fost identificate interacțiuni clinice semnificative, cu alte medicamente.

### **Utilizarea Acevirex cremă cu alimente și băuturi**

Efectul Acevirex cremă nu este influențat de aportul de alimente și băuturi.

### **Sarcina și alăptarea**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu există informații privind efectul dăunător al dozelor terapeutice de aciclovir asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

## **3. Cum să utilizați Acevirex cremă**

Utilizați întotdeauna Acevirex cremă exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Spălați-vă de fiecare dată mâinile înainte și după ce folosiți crema.

Acevirex cremă acționează cel mai bine atunci când este folosit de la primele semne ale bolii. Dacă aceasta este prima infecție cu virus herpes simplex, folosiți imediat crema. Dacă apar umflături herpetice în mod regulat, începeți să folosiți crema imediat ce simțiți apariția uneia. Acestea se manifestă prin senzații de înțepături, mâncărime sau dureri ascuțite.

Aplicați un strat subțire de cremă pe aria afectată la fiecare patru ore în timpul zilei. Aceasta înseamnă de aproximativ 5 ori pe zi. Totuși, folosiți de fiecare dată crema așa cum medicul v-a sfătuit să o faceți. Dacă tot nu sunteți sigur cum să folosiți crema, cereți sfatul medicului sau farmacistului.

Folosiți Acevirex cremă pentru o perioadă de 5 zile. Dacă ulcerațiile nu s-au vindecat complet după cinci zile, folosiți cu atenție crema pentru încă cinci zile. Dacă ulcerațiile nu s-au vindecat după zece zile, opriți folosirea cremei și informați medicul.

Nu folosiți Acevirex cremă în interiorul gurii sau al vaginului. Poate irita aceste zone. Totuși, Acevirex cremă nu este toxic dacă este înghițit.

Nu folosiți crema pentru administrare la nivel ocular. Dacă ajunge totuși cremă, la nivelul ochilor dumneavoastră spălați cu multă apă rece. Dacă apar ulcerații, informați medicul.

Nu amestecați Acevirex cremă cu alte loțiuni sau creme pentru piele.

### **Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Acevirex cremă**

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Acevirex cremă**

Dacă ați omis o doză de cremă, aplicați imediat ce vă aduceți aminte. Apoi, continuați ca mai înainte.

### **Dacă încetați să utilizați Acevirex cremă**

Trebuie să utilizați Acevirex cremă atâta timp cât vă recomandă medicul. Adresați-vă mai întâi medicului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, Acevirex cremă poate determina reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele persoane pot fi alergice/sensibile la Acevirex cremă. Au existat cazuri rare de reacții alergice incluzând umflături în special ale buzelor, feței și/sau pleoapelor; înroșirea tegumentelor sau umflături dureroase ale pielii. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, informați imediat medicul dumneavoastră și nu mai folosiți crema până când medicul sau farmacistul nu vă spune să o faceți. Acevirex cremă poate determina înțepături sau senzație ușoară de arsuri atunci când îl aplicați pentru prima dată. Anumite persoane își pot simți pielea uscată sau prea moale, pot avea senzații de înțepături ușoare sau pot observa înroșirea acesteia. Dacă oricare dintre aceste efecte adverse vă supără, informați medicul.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **5. Cum se păstrează Acevirex cremă**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se păstra la frigider.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Acevirex cremă după data de expirare înscrisă pe ambalaj după exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Acevirex cremă**

- Substanța activă este aciclovir 50 mg/g.

- Celelalte componente sunt: propilenglicol, vaselină albă, alcool cetostearilic, parafină lichidă, Arlacel 165 (glicerol monostearat și macrogol stearat), poloxamer 407, dimeticonă 20, laurilsulfat de sodiu, apă purificată

##### **Cum arată Acevirex cremă și conținutul ambalajului**

Acevirex cremă se prezintă sub formă de cremă de culoare albă până la aproape albă, fină și omogenă, fără semne de separare a fazelor.

Cutie cu un tub din Al a 5 g cremă

Cutie cu un tub din Al a 10 g cremă

##### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED

12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda

##### **Fabricanți**

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Marea Britanie

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polonia

**Acest prospect a fost aprobat în Martie, 2019.**