

smectaGo®

caramel cacao

Suspensie gata de utilizare, în plicuri, ce conține diosmectită

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest produs, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest prospect este conceput pentru a vă ajuta să utilizați corect acest produs. Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

Ce găsiți în acest prospect

- 1. Ce este Smecta Go® și pentru ce se utilizează**
- 2. Ce trebuie să știți înainte să luați Smecta Go®**
- 3. Cum să luați Smecta Go®**
- 4. Reacții adverse posibile la Smecta Go®**
- 5. Cum se păstrează Smecta Go®**
- 6. Conținutul ambalajului și alte informații**

1. Ce este Smecta Go® și pentru ce se utilizează

Smecta Go® este un dispozitiv medical, o suspensie gata de utilizare, disponibilă într-un plic unidoză, pentru administrare pe cale orală.

Smecta Go® este indicat în:

- Tratamentul diareei acute la **adulți și copii cu vârsta peste 8 ani**. La copii, tratamentul diareei acute trebuie însoțit de administrarea de soluții de rehidratare orală pentru a evita deshidratarea.
- Tratamentul diareei cronice sau al durerii abdominale la **adulți**.

Substanța activă din Smecta Go® este diosmectita. Diosmectita este o argilă naturală ce ajută la stoparea și tratarea diareei și la calmarea durerilor abdominale. S-a demonstrat că aceasta, în mod rapid:

- Leagă toxinele și germeii (bacteriile și virusurile) și ajută la eliminarea acestora din organism

- Protejează tractul intestinal și ajută la întărirea calității mucoasei intestinale și la remedierea leziunilor intestinale datorită proprietăților sale protectoare naturale.

Diosmectita asigură o ușurare eficientă și o reducere a simptomelor asociate diareei așa cum a fost demonstrat în cadrul studiilor clinice.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Smecta Go®

Nu luați Smecta Go®:

- Dacă sunteți alergic la diosmectită sau la oricare dintre celelalte componente (vezi pct. 6 **Conținutul ambalajului și alte informații**).
- Dacă este vorba despre un copil cu vârsta sub 8 ani și cu diaree acută.
- Dacă este vorba despre un copil cu diaree cronică sau dureri abdominale.

Atenționări și precauții speciale privind acest dispozitiv medical

Nu încercați să tratați singur simptomele și adresați-vă imediat medicului în următoarele cazuri:

- Dacă diareea este însoțită de temperatură ridicată, frisoane sau vărsături repetate
- Dacă prezentați semne de deshidratare (dacă vă este foarte sete, aveți limba uscată, sunteți obosit sau pierderea apetitului este de durată)
- Dacă scaunele conțin sânge sau mucus
- Dacă diareea este însoțită de pierdere bruscă în greutate
- Dacă diareea apare în timpul sau după tratamentul cu antibiotice
- Dacă aveți deficiențe imunitare cunoscute sau urmați în prezent un tratament care suprimă sistemul imunitar al organismului (tratament imunosupresor sau tratament contra cancerului)
- Dacă v-ați întors recent dintr-o călătorie într-o țară tropicală.

Opriți tratamentul anti-diareic și adresați-vă medicului dumneavoastră în următoarele cazuri:

- Dacă simptomele pe care le aveți nu se ameliorează sau chiar se agravează după durata recomandată a tratamentului (vezi pct. 3 **Cum să luați Smecta Go®**)
- Dacă diareea revine frecvent sau dacă prezentați alternativ episoade de diaree și de constipație.

Aveți grijă deosebită cu Smecta Go®

- Smecta Go® trebuie utilizat cu prudență de către pacienții cu antecedente de constipație severă
- Smecta Go® conține cantități mici de etanol (alcool), sub 100 mg per doza zilnică.

Atenționări pentru pacienții cu diaree acută

- La copii, Smecta Go® **trebuie utilizat în asociere cu soluții de rehidratare orală (SRO) pentru înlocuirea lichidelor pierdute datorită diareei și pentru prevenirea deshidratării.**

La copii, alimentația trebuie menținută cât timp diareea persistă. Sunt recomandate mese frecvente, în cantități mici, cu alimente mixte (de ex. orez, ouă, carne, anumite fructe și legume coapte). În cazul în care copilul dumneavoastră prezintă modificări de comportament, dacă simptomele diareei nu se ameliorează sau dacă se agravează sau dacă are vărsături frecvente sau persistente, adresați-vă medicului dumneavoastră.

- La adulți cu diaree acută, Smecta Go® este un tratament suplimentar pe lângă rehidratarea cu apă, pentru înlocuirea lichidelor pierdute datorită diareei. Alimentația trebuie menținută cât timp diareea persistă. Se recomandă mese ușoare, în cantități mici, fără grăsimi, alimente grase, grele, picante sau stimulante sau sucuri de fructe.

Tratamentul diareei la pacienți vârstnici sau slăbiți necesită o atenție specială, deoarece poate conduce la o pierdere semnificativă de lichide (deshidratare), ceea ce poate avea consecințe grave.

Atenționări privind diareea cronică și durerile abdominale

Nu este recomandată utilizarea prelungită sau repetată a Smecta Go®. În caz de diaree cronică sau dureri abdominale, dacă simptomele persistă mai mult de două săptămâni, adresați-vă medicului dumneavoastră pentru a putea investiga cauzele de fond înainte de continuarea tratamentului.

Smecta Go® împreună cu alte medicamente

Nu luați Smecta Go® împreună cu alte produse medicamentoase orale pentru a evita reducerea eficacității celui alt tratament. Se recomandă un interval de 2 ore între administrarea de alte produse medicamentoase și Smecta Go®.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte produse medicamentoase sau dispozitive medicale, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Smecta Go® nu este recomandat în timpul sarcinii sau alăptării. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că sunteți gravidă sau plănuiți să aveți un copil, consultați medicul sau farmacistul pentru recomandări înainte de a lua Smecta Go®.

3. Cum să luați Smecta Go®

Mod de administrare:

Acest dispozitiv medical se administrează pe cale orală și este gata de utilizare. Conținutul plicului poate fi înghițit direct.

Omogenizați plicul înainte de a-l deschide.

După deschidere, fiecare plic trebuie utilizat o singură dată.

Recomandări privind dozajul

• Diaree acută

Vârsta	Doza
Copii (între 8 - 15 ani inclusiv)	2 plicuri pentru început, urmate de câte 1 plic după fiecare scaun moale, până la 4 plicuri pe zi Trebuie luată și o soluție de rehidratare orală (SRO) pentru înlocuirea lichidelor pierdute datorită diareei și pentru prevenirea deshidratării.
Adulți și copii cu vârsta peste 15 ani	2 plicuri pentru început, urmate de câte 1 plic după fiecare scaun moale, până la 6 plicuri pe zi
Cât timp să luați Smecta Go® în caz de diaree acută	Puteți utiliza Smecta Go® timp de până la 3 zile . Dacă diareea durează mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră.

• Diaree cronică și dureri abdominale:

Vârsta	Doza
Adulți (exclusiv)	Până la 3 plicuri pe zi (1 dimineața, 1 la prânz și 1 seara), după caz.
Cât timp să luați Smecta Go® în caz de diaree cronică sau dureri abdominale	Puteți să utilizați acest dispozitiv medical timp de până la 2 săptămâni fără aviz medical. Nu este recomandată utilizarea prelungită sau repetată a Smecta Go®.

Dacă uitați să luați Smecta Go®

Dacă uitați să luați o doză, luați-o după următorul scaun moale (tranzit intestinal). Nu depășiți doza zilnică recomandată.

4. Reacții adverse posibile

Reacția adversă cel mai frecvent raportată în timpul tratamentului este **constipația**. În caz de constipație, tratamentul trebuie întrerupt și dacă este necesar se va relua la o doză zilnică mai mică. Alte reacții adverse mai puțin frecvente includ erupții pe piele, urticarie, prurit (mâncărimi) și angioedem (inflamarea pielii, buzelor, gâtului și limbii).

Dacă observați orice reacții adverse nemenționate în acest prospect, sau dacă oricare dintre reacțiile adverse persistă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Dacă manifestați orice reacție adversă gravă, aceasta trebuie raportată producătorului MAYOLY PHARMA FRANȚA și autorității naționale competente.

5. Cum se păstrează Smecta Go®

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Smecta Go® nu trebuie utilizat după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Acest dispozitiv medical nu necesită condiții speciale de păstrare.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Substanța activă din Smecta Go® este Diosmectita 3g per plic. Celelalte componente sunt: aromă de caramel cacao*, gumă xantan,



benzoat de sodiu, acid clorhidric, sorbat de potasiu, sucraloză, apă purificată.

*Compoziția aromei de caramel cacao: amestec de arome naturale și sintetice, colorant caramel E 150d, sirop de zahăr caramelizat, propilen glicol E1520, apă, alcool etilic, cafeină.



Fabricant:

MAYOLY PHARMA FRANCE

3 Place Renault

92500 Rueil-Malmaison

Franța

Ultima revizie a textului: Septembrie 2024

