

Gerovital H³ 100 mg comprimate filmate

Clorhidrat de procaină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Gerovital H³ și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Gerovital H³
3. Cum să luați Gerovital H³
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Gerovital H³
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Gerovital H³ și pentru ce se utilizează

Gerovital H³ este un medicament care conține o substanță numită clorhidrat de procaină. Acest medicament este utilizat pentru prevenirea fenomenelor de îmbătrânire.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Gerovital H³**Nu luați Gerovital H³**

- dacă sunteți alergic la clorhidrat de procaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- scăderea tensiunii arteriale (hipotensiune arterială severă);
- tratament concomitent cu sulfamide (cu excepția celor antidiabetice) și cu acetilcolinesterazice: neostigmină, ezerină (fizostigmină) și piridostigmină, deficit de colinesterază;
- epilepsie necontrolată prin administrarea tratamentului;
- tulburări de conducere ale impulsurilor la nivelul inimii (bloc atrioventricular de grad II sau III fără stimulator cardiac);

Atenționări și precauții

Înainte să luați Gerovital H³, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă aveți sensibilitate crescută la clorhidratul de procaină;
- dacă aveți tensiune arterială scăzută în poziție verticală (hipotensiune arterială ortostatică);
- dacă aveți unele afecțiuni tumorale (cancer);
- dacă aveți probleme cu inima precum intervalul QT prelungit, care poate determina bătăi neregulate ale inimii (tulburări de ritm ventriculare severe).

Gerovital H³ împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

În special, spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți deja în tratament cu:

- medicamente din categoria sulfamidelor (cu excepția medicamentelor antidiabetice);

- medicamente acetilcolinesterazice precum neostigmina, ezerina (fizostigmina) și piridostigmina.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu sunt disponibile informații suficiente privind administrarea medicamentului în timpul sarcinii și alăptării. Din aceste motive, nu se recomandă utilizarea medicamentului în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Gerovital H³ nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuși, există riscul de apariție a amețelilor după administrarea injectabilă.

Gerovital H³ conține metabisulfid de potasiu. Poate provoca rar reacții de hipersensibilitate grave și bronhospasm.

3. Cum să luați Gerovital H³

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Între seriile de tratament injectabil, pentru care doza recomandată este de 5 ml (o fiolă) soluție injectabilă Gerovital H³ intramuscular pe zi, de 3 ori pe săptămână, 4 săptămâni se va adăuga tratament pe cale orală: câte 2 comprimate filmate Gerovital H³ pe zi, 12 zile. Tratamentul se repetă de 5 – 6 ori pe an.

În unele cazuri, în funcție de intensitatea și localizarea procesului degenerativ, tratamentul poate fi administrat numai pe cale orală: câte 3 comprimate filmate pe zi, timp de 21 zile, în 6 – 8 serii de tratament pe an.

Dacă utilizați mai mult Gerovital H³ decât trebuie

Dacă utilizați, în mod accidental, mai mult din Gerovital H³ decât doza recomandată, trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră sau să mergeți la departamentul de urgență al celui mai apropiat spital. Amintiți-vă să luați cu dumneavoastră cutia și orice fiolă sau comprimat filmat rămas în cutie.

Dacă uitați să utilizați Gerovital H³

Dacă uitați să utilizați o doză de Gerovital H³, administrați-o imediat ce vă amintiți, cu excepția cazului când este aproape timpul pentru următoarea doză.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Gerovital H³

Nu întrerupeți tratamentul cu Gerovital H³ fără să cereți sfatul medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați una dintre următoarele manifestări, opriți administrarea Gerovital H³ și luați legătura cu medicul dumneavoastră :

- mâncărimea pielii,
- erupții cutanate extinse,

- bătăi rapide ale inimii însoțite de senzație de lipsă de aer sau leșin.

Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea Gerovital H³:

- amețeli,
- stare de slăbiciune,
- leșin,
- palpitații.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Gerovital H³

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Gerovital H³

Substanța activă este clorhidratul de procaină. Un comprimat filmat conține clorhidrat de procaină 100 mg.

Celelalte componente sunt: *nucleu*: acid benzoic, metabisulfid de potasiu, fosfat disodic dodecahidrat, amidon de porumb, manitol, gelatina, talc, stearat de magneziu. *Strat de filmare*: copolimer metacrilic tip C, macrogol 4000, hidrogenocarbonat de sodiu, talc, alcool polivinilic, dioxid de titan(E171).

Cum arată Gerovital H³ și conținutul ambalajului

Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare albă.

Cutie cu 2 blistere din folie de aluminiu și folie laminată din PVC/Aclar opacă fiecare a câte 12 comprimate filmate

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

SC Zentiva SA,
Bd. Theodor Pallady, nr. 50,
Sector 3, București, România

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost aprobat în Noiembrie 2013.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>