

PIAFEN
Comprimate**Compoziție**

Un comprimat conține metamizol sodic 500 mg, clorhidrat de pitofenonă 5 mg, bromometilat de fempipramidă 0,1 mg și excipienți: celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat, stearat de magneziu.

Grupa farmacoterapeutică: anticolinergice sintetice în combinație cu analgezice, combinații

Indicații terapeutice

Tratamentul durerilor moderate (cefalee, dureri dentare, colici biliare și renale, cistalgii, dismenoree, dureri postoperatorii și posttraumatice).

Contraindicații

Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului, la alți pirazoli (noraminopirină sau amidopirină), sau la antiinflamatoare nesteroidiene.

Agranulocitoză.

Deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază.

Porfirie hepatică.

Glaucom cu unghi închis, adenom de prostată, stenoză pilorică.

Alăptare.

Copii.

Precauții

Dacă în timpul tratamentului cu *Piafen* apare febră nejustificată și/sau angină și/sau ulcerații bucale, tratamentul trebuie întrerupt imediat și efectuată hemoleucograma. Depistarea agranulocitozei impune spitalizarea.

Interacțiuni

Asocierea cu clorpromazina poate produce hipotermie uneori intensă, având ca efect reducerea eficacității produsului.

În timpul tratamentului cu cefalosporine, concentrația plasmatică a acestora poate să scadă.

Atenționări speciale

În timpul tratamentului se recomandă evitarea consumului de băuturi alcoolice.

Datorită acțiunii de tip atropinic a fempipramidei, se recomandă prudență în cazul administrării la pacienți cu insuficiență hepatică, insuficiență renală, insuficiență coronariană, tulburări de ritm, hipertiroidie, bronșită cronică, ileus paralytic, megacolon, infarct miocardic acut.

Sarcina și alăptarea

Nu se recomandă utilizarea produsului în timpul sarcinii. În timpul alăptării produsul este contraindicat deoarece metamizolul se excretă în laptele matern.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Prin reacțiile adverse pe care le determină, produsul poate influența capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Aceste reacții pot fi amplificate de consumul de băuturi alcoolice.

Doze si mod de administrare

Adulți: doza recomandată este de 1-2 comprimate *Piafen* de 1-3 ori pe zi.

Reactii adverse

- agranulocitoză, șoc
- urticarie, erupții maculopapuloase, sindrom Lyell, sindrom Stevens-Johnson;
- insuficiență renală acută sau nefropatie interstițială;
- anemie, trombopenie;
- crize de astm bronșic, mai ales la pacienții sensibili la acid acetilsalicilic;
- colorație roșie a urinei, care se poate datora unui metabolit (acid rubazoic);
- uscăciunea gurii și a ochilor, tulburări de acomodare, tahicardie, palpitații, constipație, retenție urinară, hipervâscozitate a secrețiilor bronșice, excitație psihomotorie;
- la vârstnici: confuzie mentală.

Supradozaj

În cazul unei supradoze, pot apărea următoarele simptome: vărsături, dureri abdominale, amețeli, somnolență și în final comă. În caz de supradozaj trebuie să vă adresați imediat medicului.

Păstrare

- A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
- A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

- Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate.
- Cutie cu 150 blistere a câte 10 comprimate

Producător

S.C. Antibiotice S.A., Iași, România

Detinătorul Autorizatiei de punere de piață

S.C. Antibiotice S.A.,
Str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România

Data ultimei verificări a prospectului

Septembrie, 2006