

Excilor®

Pentru tratamentul infecției fungice a unghiei

Îmbogățit cu glicerol, lipide care îngrijesc unghia și biotină

Ce este infecția fungică a unghiei?

Infecția fungică a unghiei (cunoscută și sub denumirea de onicomicoză) se referă la infecția cu fungi (dermatofiti) a unghiilor degetelor de la picioare sau de la mâini. Infecția începe, de obicei, la marginea unghiei, care devine alb-gălbuie, maro sau verde. Ciuperca crește sub sau în unghie, făcând ca placa unghială să se îngroașe și să se sfărâme. Uneori unghia se desprinde parțial sau total, ceea ce poate fi dureros. În unele cazuri, unghia se va desprinde cu totul de pe deget.

Cum apare infecția fungică a unghiei?

Unghiile – cel mai frecvent cele de la picioare – sunt infectate de ciuperci din cauza umezelii excesive, a căldurii, a transpirației sau a igienei deficitare. În mod normal, placa unghială este prea groasă pentru a fi penetrată de ciuperci. Cu toate acestea, unghiile deteriorate se pot infecta cu ușurință. Pantofii prea strâmți și/sau picioarele care transpiră creează condiții pentru dezvoltarea și răspândirea ciupercilor. Infecțiile fungice sunt contagioase și se pot transmite la alte persoane (de exemplu, prin utilizarea dușurilor comune). De asemenea, este posibilă și autocontaminarea: infecția se poate răspândi de la o unghie la alta. Unii oameni (diabeticii, pacienții care folosesc corticosteroizi, pacienții cu sisteme imunitare compromise) sunt mai predispuși la infecții fungice. Este important să tratați infecția fungică a unghiei cât mai curând posibil: cu cât este mai mică zona afectată, cu atât mai scurtă este perioada de tratament. Tratamentul rapid poate împiedica infecția să se răspândească și la alte unghii.

Cum se previne infecția fungică a unghiei?

- Spălați-vă regulat pe picioare. Dacă folosiți săpun, clătiți-vă bine tălpile după aceea pentru a îndepărta toate urmele de săpun.
- Uscați-vă bine pe picioare, mai ales între degete.
- Purtați șosete curate din bumbac sau lână.
- Purtați pantofi care le permit picioarelor „să respire” și care nu sunt prea strâmți.
- Schimbați-vă pantofii regulat.
- Folosiți un produs antifungic în pantofi.
- Purtați sandale în zonele în care mulți oameni merg desculți, cum ar fi la dușurile comune, în vestiare și la piscină.

Excilor® este indicat pentru tratamentul micozei unghiei.

Cum tratează Excilor® infecția fungică a unghiei?

Cea mai importantă componentă a unghiilor este keratina, pe care cele mai multe preparate antifungice nu o pot penetra. În cele mai multe cazuri, ciupercile cresc sub unghie, ceea ce le face dificil de tratat.

Excilor® controlează micromediul unghiei acidificând patul unghial. Datorită tehnologiei unice de penetrare TransActive™, **Excilor®** poate penetra unghia, asigurând astfel tratarea acesteia de la interior către exterior. De obicei, este nevoie de câteva luni pentru ca o unghie afectată să aibă din nou un aspect sănătos. În medie, o unghie de la picior crește cu 1,5 mm pe lună. **Excilor®** reduce imediat pH-ul unghiei, creând un mediu ostil dezvoltării fungilor. Cu toate acestea, unghia afectată are nevoie de timp pentru a crește. Eficacitatea **Excilor®** a fost dovedită în studii clinice.

Excilor® este îmbogățit cu glicerol, lipide care îngrijesc unghia și biotină.

Placa unghială are o structură care poate fi comparată cu un zid de cărămidă, celulele unghiei servind drept „cărămizi” și lipidele dintre ele drept „ciment”. Îmbătrânirea are o influență semnificativă asupra acestei structuri a plăcii unghiale și în timp unghiile devin mai uscate și conțin mai puține lipide. Acest lucru crește riscul infecțiilor. Excilor este îmbogățit

cu glicerol, o moleculă care atrage apa. De asemenea, mai conține lipide speciale care protejează unghia și biotină. Această combinație înmoaie, hidratează și hrănește placa unghială.

Instrucțiuni de utilizare

Curățați unghia și dacă aceasta este dată cu oja îndepărtați oja complet înainte de a folosi **Excilor**[®].

Folosiți aplicatorul pentru a acoperi cu produs toată unghia și partea de dedesubt a marginii unghiei. Aveți grijă să aplicați **Excilor**[®] într-un strat generos.

Lăsați unghia să se usuce (30-40 secunde) înainte de a vă pune șosete și/sau pantofi. Astfel, produsul poate penetra unghia. După aplicare, este normal să simțiți o senzație de furnicături sub unghie; acest lucru arată că produsul a penetrat complet unghia. Aplicați pe zona infectată de două ori pe zi (o dată dimineața și o dată seara). Pentru cele mai bune rezultate, tratați zona infectată cel puțin trei luni. Este recomandabil să continuați tratamentul până când unghia s-a refăcut complet. Nu apăsați cu putere pe aplicator când aplicați produsul.

Aveți grijă să închideți bine aplicatorul după fiecare tratament pentru a preveni evaporarea produsului.

Excilor[®] conține:

- stilou aplicator: aproximativ 400 de aplicări
- soluție: 3,3 ml
- soluție XL: 7 ml

Reacții adverse

(Foarte rare, 1 caz la 100.000)

Senzație de arsură, mâncărimi sau durere ușoară, localizată. Dacă simptomele persistă sau se agravează, opriți tratamentul și consultați medicul sau farmacistul.

Precauții

Numai pentru uz extern.

Nu folosiți acest produs dacă sunteți hipersensibil sau alergic la oricare dintre ingredientele sale.

Evitați contactul cu ochii și mucoasele.

Dacă produsul intră în contact cu ochii sau mucoasele, clătiți bine cu apă.

Nu sunt disponibile date clinice cu privire la utilizarea produsului de către copii, sau de către femeile însărcinate sau care alăptează.

Diabeticii cu probleme la nivelul picioarelor trebuie să consulte medicul atunci când încep să utilizeze **Excilor**[®].

A nu se folosi după data de expirare.

Condiții de păstrare

A se păstra la temperatura camerei, departe de căldură sau lumina directă a soarelui.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor.

A nu se arde aplicatoarele folosite.

Ingrediente

lactat de etil, acid acetic, potențiator de penetrare, agent de formare a peliculei, apă, glicerol, polisorbit 80, acetat de cetil, alcool lanolinic acetilat, biotină și conservant (nu conține parabeni)

Brevet în curs de obținere

CE0481

Ultima revizuire a instrucțiunilor de utilizare: septembrie 2018



Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
BELGIUM

Distribuitor:

S.C. A&D Pharma Marketing &
Sales Services S.R.L.
Str. Ciobanului, nr. 133, comuna
Mogoșoaia, județul Ilfov, România

1591/620279/181/07020524/0