

Prospect: Informații pentru utilizator

ARNIGEL 70 mg/g gel
Arnica montana TM

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este ARNIGEL și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați ARNIGEL
3. Cum să utilizați ARNIGEL
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează ARNIGEL
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este ARNIGEL și pentru ce se utilizează

ARNIGEL este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul local al traumatologiei benigne în absența plăgilor (echimoze, contuzii, oboseală musculară) la adulți și copii cu vârsta de peste 1 an.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați ARNIGEL**Nu utilizați ARNIGEL:**

- dacă sunteți alergic la Arnica montana sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- la nivelul membranelor mucoase, dermatozelor umede, leziunilor infectate sau rănilor; a se evita contactul cu ochii;
- dacă pacientul este un copil cu vârsta de sub 1 an.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați ARNIGEL, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

ARNIGEL împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. În absența datelor experimentale și clinice și ca măsură de precauție, utilizarea acestui medicament ar trebui evitată pe perioada de sarcină.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

ARNIGEL nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați ARNIGEL

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Aplicați cât mai repede posibil un strat fin de ARNIGEL pe zona cutanată corespunzătoare regiunii dureroase masând ușor până la penetrarea completă. Se repetă aplicarea o dată sau de două ori pe zi.

Mod de administrare

Administrare cutanată.

Dacă utilizați mai mult ARNIGEL decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați ARNIGEL

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați ARNIGEL

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Există un risc de apariție a dermatozei pentru persoanele sensibile la Arnica montana. În cazul apariției reacțiilor alergice, se oprește tratamentul.

Deoarece produsul conține alcool, aplicațiile cutanate frecvente pot provoca iritații și uscăciunea pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează ARNIGEL

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după „EXP:”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține ARNIGEL

- Substanța activă este Arnica montana TM. Un gram de gel conține 70 mg de Arnica montana TM.
- Celelalte componente sunt: carbomer 980, hidroxid de sodiu sol. 10 %, etanol 96 % (v/v), apă purificată.

Cum arată ARNIGEL și conținutul ambalajului

Gel de culoare galbenă până la galben-portocaliu.

Cutie cu un tub din aluminiu conținând 45 g gel

Cutie cu un tub din aluminiu conținând 120 g gel

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Franța

Acest prospect a fost revizuit în martie 2020.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>.