

**Prospect: Informații pentru utilizator****MARKOTON 1000 UI + 50 mg/g gel**  
heparină sodică/dexpantenol

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 2 săptămâni nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Markoton și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Markoton
3. Cum să utilizați Markoton
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Markoton
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Markoton și pentru ce se utilizează**

Markoton este un medicament care conține heparină sodică și dexpantenol. Heparina are efect anticoagulant prin care previne dezvoltarea trombilor. Dexpantenolul contribuie la epitelizarea granulară și regenerarea tisulară. Baza de gel favorizează penetrarea componentelor active prin piele. Markoton este indicat a se folosi în:

- profilaxia flebitelor
- arsuri, favorizând reepitelizarea
- afecțiunile inflamatorii și trombotice superficiale: sindrom varicos și complicații
- tratamentul ulcerului varicos
- tratamentul leziunilor post-traumatice ale articulațiilor și țesuturilor moi: luxații, entorse, contuzii, întinderi musculare, afecțiuni ale meniscului, tenosinovite, contracturi, hematoame.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Markoton****Nu utilizați Markoton:**

- dacă sunteți hipersensibil la heparină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6)
- dacă există diateze hemoragice sau tulburări de coagulare.
- nu se aplică pe plăgi deschise, în focare infecțioase purulente sau pe mucoase.

**Atenționări și precauții**

- când există tulburări de coagulare

-la persoanele deshidratate, hipovolemice sau hipotensive, la care există un risc potențial de creștere a toxicității renale.

### **Markoton gel împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente

Nu se cunosc interacțiuni ale substanțelor active din Markoton gel cu alte medicamente aplicate local.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Medicamentul nu poate fi folosit în sarcină și alăptare decât numai pentru perioade scurte și la recomandarea medicului.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

### **Markoton gel conține parahidroxibenzoat de metil (E 218), parahidroxibenzoat de propil (E 216).**

Parahidroxibenzoații pot provoca reacții alergice (chiar întârziate).

Medicamentul conține o cantitate mică de etanol sub 10 g/100 ml gel.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Markoton nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și a folosi utilaje.

## **3. Cum să utilizați Markoton**

Pe pielea zonei dureroase se aplică 2-3 g de gel de 1 până la 3 ori pe zi.

Nu se indică masajul în cazul tratamentului afecțiunilor venoase, putându-se recurge la aplicarea unui pansament ocluziv peste zona pe care s-a aplicat gelul.

Durata tratamentului depinde de indicațiile terapeutului și de rezultatul obținut. După 2 săptămâni de la inițierea tratamentului este indicat să se reevalueze medicația.

Utilizați întotdeauna Markoton exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Markoton:**

În cazul manifestărilor de supradozaj tratamentul trebuie întrerupt, iar zona cutanată, pe care a fost aplicat gelul, va fi spălată cu săpun și apă caldă.

### **Dacă uitați să utilizați Markoton:**

Nu aplicați o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Markoton gel poate determina reacții adverse tipice heparinei sodice, manifestate prin reacții de hipersensibilizare.

În cazul apariției reacțiilor adverse tratamentul trebuie întrerupt, iar zona cutanată, pe care a fost aplicat gelul, trebuie spălată cu săpun și apă caldă.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Markoton**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Markoton**

- Substanțele active sunt heparină sodică și dexpanenol. Un gram de gel conține heparină sodică 1000 UI și dexpanenol 50 mg.
- Celelalte componente sunt: alantoină, carbomer 980, , trolamină, alcool etilic, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibezoat de propil (E 216), apă purificată.

#### **Cum arată Markoton și conținutul ambalajului**

Markoton se prezintă sub formă de gel incolor, cu aspect clar.

#### **Ambalaj**

Cutie cu 1 tub din aluminiu cu membrană acoperit cu lac de protecție epoxifenolic, închis cu capac cu filet din PE; tubul conține 25 g gel.

Cutie cu 1 tub din aluminiu cu membrană acoperit cu lac de protecție epoxifenolic, închis cu capac cu filet din PE; tubul conține 45 g gel.

Cutie cu 1 tub din aluminiu cu membrană acoperit cu lac de protecție epoxifenolic, închis cu capac cu filet din PE; tubul conține 100 g gel

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Fiterman Pharma S.R.L.

Str. Moara de Foc, nr. 35, 700520, Iași, România

#### **Fabricant**

Fiterman Pharma S.R.L.

DJ 249E Km 0.9, sat Tomești, jud. Iași, România

**Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2018.**