

Cicatridina Supozitoare - [FarmaDerma](#)

Supozitoarele Cicatridina au efect datorat prezentei acidului hialuronic, o mucopolizaharida care este distribuita din abundenta in multe tesuturi ale corpului.

Acidul hialuronic functioneaza ca suport structural , conferind astfel tonicitate ,trofism si elasticitate tesutului.

Numeroase studii clinice au demonstrat capacitatea acidului hialuronic de a accelera si ameliora procesul de reepitelizare si reparare a tesutului.

Indicații:

Tratament adjuvant al proceselor reparative ale canalului ano-rectal dupa chirurgie proctologica: hemoroizi interni si externi; proctita; infectii anale, rectale de diferite etiologii; rupturi anale; fisuri anale; fistule perianale.

Compoziție:

Hialuronat de sodiu 5mg, extract de ulei de Centella Asiatica, extract de ulei de Galbenele, extract de ulei de Aloe Vera, ulei esential din Arbore de Ceai, gliceride semisintetice, BHT.

Contraindicații:

In cazul hipersensibilitatii individuale la unul din componentele produsului .

Sarcina si alaptare :

Siguranta utilizarii supozitoarelor CICATRIDINA pe durata sarcinii si alaptarii nu a fost demonstrata .

Efecte supra capacitatii de conducere si utilizare a echipamentelor sau masinilor .

Nu sunt necesare masuri speciale de precautie .

Cum se utilizeaza :

Indepartati supozitorul prin dezlipirea celor 2 folii pre-taiate de pe blister si introduceti-l complet in anus

.

Pentru o buna practica igienica , spalati-va pe maini inainte si dupa utilizare dispozitivului medical .

Cand si pentru cat timp:

Utilizati 1 supozitor / zi , sau conform prescriptiei medicului .

Durata utilizarii depinde de evolutia simptomelor ; daca este necesar , supozitoarele Cicatridina pot fi utilizate pentru perioade lungi de timp .

Interactiuni cu alte produse :

Interactiunile cu alte produse nu sunt cunoscute , de aceea se recomanda consultarea unui doctor inainte de a utiliza supozitoarele CICATRIDINA in combinatie cu alte dispozitive medicale sau medicamente pentru uz rectal .

Efecte nedorite :

Utilizarea tuturor produselor cu aplicare topica in special pentru o perioada indelungata poate cauza sensibilizare locala .

In acest caz opriti tratamentul si consultati un doctor pentru a incepe o terapie corespunzatoare .

Daca au loc efecte nedorite care nu sunt descrise in acest prospect informati medicul sau farmacistul .

Prezentare:

Cutie cu 10 supozitoare pentru uz rectal de 2 g;

Producător:

[FarmaDerma](#) Italia