

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza **Gastimax[®] Med, comprimate masticabile**, chiar dacă ați mai utilizat acest dispozitiv medical. Este posibil ca aceste informații să se fi modificat de la ultima utilizare, conform ultimelor cercetări în domeniu.

Acest dispozitiv medical poate fi eliberat fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați **Gastimax[®] Med, comprimate masticabile** cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate. Păstrați aceste instrucțiuni. Se poate să fie necesar să le recitiți.

Când se recomandă?

Dispozitivul medical **Gastimax[®] Med, comprimate masticabile** se recomandă pentru tratamentul simptomelor refluxului gastro-esofagian: senzația de arsură în capul pieptului, regurgitația acidă, indigestia, tusea și inflamația faringelui și a laringelui (legate de reflux).

Aceste simptome pot să apară după mese (de exemplu când se consumă alimente grase sau picante) sau în timpul sarcinii sau la pacienții cu simptome asociate esofagitei de reflux (ce se manifestă prin înghițire dificilă și/sau dureroasă, puncte sensibile ale gurii, vărsături).

Cum acționează?

Dispozitivul medical **Gastimax[®] Med, comprimate masticabile** combină efectele a trei ingrediente funcționale - alginat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu și carbonat de calciu, iar mecanismul de acțiune este fizic și nu depinde de absorbția în circulația sistemică. Alginatul de sodiu formează în mediul acid din stomac un strat protector la suprafața mucoasei gastrice și a conținutului gastric. Concomitent, hidrogenocarbonatul de sodiu și carbonatul de calciu, la contactul cu acidul clorhidric din stomac, eliberează dioxidul de carbon care mobilizează straturile de gel de alginat de sodiu, la suprafața conținutului gastric. Se formează astfel un strat protector de gel care blochează refluxul conținutului gastric în esofag. În cazuri severe, gelul însuși poate trece din stomac în esofag în locul conținutului stomacal, exercitând un efect emolient. În plus, hidrogenocarbonatul de sodiu și carbonatul de calciu neutralizează

aciditatea gastrică în exces.

Mod de administrare:

Pentru administrare orală. Mestecați bine înainte de înghițire.

▶ **Adulți, inclusiv vârstnici și copii cu vârsta peste 12 ani:** 2-4 comprimate după mese și la culcare (de maxim patru ori pe zi).

▶ **Copii cu vârsta sub 12 ani:** se utilizează doar cu avizul medicului.

Dacă simptomele persistă după 7 zile de utilizare, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Gastimax[®] Med, comprimate masticabile nu se utilizează pe o perioadă mai lungă de 30 de zile consecutive.

Sarcina și alăptarea

Gastimax[®] Med, comprimate masticabile poate fi administrat în timpul sarcinii și alăptării, doar la recomandarea medicului.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Gastimax[®] Med, comprimate masticabile

Dacă utilizați prea mult din acest produs, este puțin probabil să vă facă rău. Cu toate acestea, vă puteți simți balonat. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă acest simptom nu dispare.

Nu utilizați Gastimax[®] Med, comprimate masticabile

▶ dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele.

Precauții

Acest produs conține mici cantități de sodiu (121,9 mg sau 5,3 mmol per doză de două comprimate) și calciu (64 mg sau 1,6 mmol per doză de două comprimate).

Dacă vi s-a recomandat să urmați o dietă restrictivă privind vreuna dintre aceste două săruri, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră înainte de a utiliza acest produs.

Adresați-vă medicului dumneavoastră privind concentrațiile acestor săruri și dacă suferiți sau ați suferit de o afecțiune semnificativă la nivelul renal (așa cum este: nefrocalcinioza sau litiaza renală recurentă cu calculi care conțin calciu) sau a inimii (așa cum este insuficiența cardiacă congestivă), deoarece anumite săruri pot avea efecte asupra acestor afecțiuni.

Acest produs conține aspartam. Dacă aveți fenilcetonurie, luați în considerare faptul că acest produs este îndulcit cu aspartam, care este o sursă de fenilalanină.

Acest produs conține sorbitol și dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest produs.

Interacțiuni

Se recomandă administrarea medicamentelor la distanță de cel puțin 2 ore față de administrarea **Gastimax® Med, comprimate masticabile**.

Pentru informații suplimentare cereți sfatul medicului sau farmacistului.

Efecte nedorite

Foarte rar pot apărea reacții alergice la componente care se pot manifesta prin: erupție trecătoare pe piele, mâncărime, dificultate în respirație, amețeli sau umflare a feței, buzelor, limbii sau gâtului.

Condiții de păstrare



A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Data de expirare



Nu utilizați **Gastimax® Med, comprimate masticabile** după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Compoziție: alginat de sodiu, hidrogeno-carbonat de sodiu, carbonat de calciu, sorbitol, celuloză microcristalină, gumă guar, hidroxipropilceluloză, aromă solidă de mentă, acid stearic micronizat, aspartam.

Gastimax® Med, comprimate masticabile sunt comprimate rotunde neacoperite, alb-gălbui, cu gust ușor dulce mentolat.

Ambalaj

Fiecare cutie conține un flacon cu 30/60 comprimate masticabile sau 1/2/3/6 blister(e) cu 10 comprimate masticabile sau 1 blister cu 6 comprimate masticabile sau 1/2 blister(e) cu 21 comprimate masticabile și instrucțiuni de utilizare.

Gastimax® Med, comprimate masticabile este un dispozitiv medical de clasa IIa, în concordanță cu Directiva Europeană pentru dispozitive medicale 93/42/EEC.



Fiterman Pharma S.R.L.
Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași,
România
Tel.: +40 232 252800

Data la care aceste instrucțiuni au fost revizuite:
Iunie 2018

	Atenționare		Nr. lot (serie)
	Citiți instrucțiunile de utilizare		Păstrați la temperaturi sub
	Data de expirare		Unică utilizare
	Producător		

