

Prospect informativ

Remifemin® Tablete

pentru reducerea neplăcerilor asociate menopauzei

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni pentru că ele conțin informații importante despre folosirea acestui produs. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să consultați medicul sau farmacistul.

- Acest produs este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos.
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
- A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Ingrediente/tabletă: cellactoză (*lactoză* monohidrat și pudră de celuloză) și amidon din cartofi (agenți de încărcare), **2,5 mg extract uscat 6 - 11:1 (agent de extracție: propan-2-ol 40% v/v) din rizomi de Cimicifuga racemosa**, stearat de magneziu (antiaglomerant).

Informații nutriționale	Cantitate pe tabletă	% valoarea zilnică
Extract de Cimicifuga racemosa	2,5 mg	nedeterminată

Remifemin® nu conține alcool.

Remifemin® nu conține gluten.

Remifemin® este un produs din plante folosit pentru ameliorarea neplăcerilor neurovegetative și de ordin emoțional induse de instalarea menopauzei (bufeuri, transpirație excesivă, tulburări de somn).

Nu folosiți produsul:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre ingrediente;
- dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

Consultați medicul înainte de administrare:

- dacă suferiți de afecțiuni ale ficatului;
- dacă vă administrați estrogeni;
- dacă ați urmat sau urmați un tratament pentru cancer de sân sau alte tumori estrogen-dependente.

Trebuie să consultați medicul dacă apar probleme de menstruație sau apar alte simptome noi.

Trebuie să încetați imediat administrarea produsului și să consultați medicul dacă apar semne și simptome sugestive pentru afectarea hepatică (oboseală, inapetență, icter tegumentar sau al mucoaselor, dureri abdominale severe, greață, modificări de culoare a urinei).

Rar pot apărea tulburări gastrointestinale (dispepsie, diaree), reacții alergice ale pielii (urticarie, prurit, înroșirea pielii), edeme ale membrelor sau ale feței, creșteri ale nivelului enzimelor ficatului sau creșteri în greutate.

Foarte rar au fost raportate leziuni ale ficatului în timpul administrării produselor ce conțin rizomi de Cimicifuga racemosa, fără a se putea stabili însă un raport de cauzalitate directă între fenomene.

Încetați să vă administrați produsul dacă apar efecte secundare și consultați medicul sau farmacistul.

Doza recomandată

Câte 1 tabletă de 2 ori pe zi, dimineața și seara, cu o cantitate suficientă de lichid.

Efectele apar după câteva săptămâni de administrare, atingându-se un maxim de efect după 4-12 săptămâni de administrare. După 6 luni de administrare, întrebați medicul dacă doriți să continuați administrarea produsului.

Ambalaj

Remifemin® tablete este ambalat în cutii cu 60 de tablete.

Greutate netă: 16,8g e

Păstrare

A se păstra la temperaturi de maximum 30°C.

Detinator notificare / Producător:

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG,
Bahnhofstr. 35, 38259 Salzgitter, Deutschland
Tel.: + 49 53 41 307-0, Fax: + 49 53 41 307-124
email info@schaper-bruemmer.de
Internet www.schaper-bruemmer.com

Responsabil cu punerea pe piață:

Aicore Consumer S.R.L.
Bulevardul Tudor Vladimirescu, numărul 22,
București, cod postal 050883, România

Termen de valabilitate

A se consuma, de preferință, până la sfârșitul ... (luna, anul) menționat pe partea laterală a pachetului.

Ultima revizuire a acestui prospect: noiembrie 2024