

Carbocit® DUO

20 Comprimate
dublu stratificate



Util în tratamentul simptomelor asociate cu balonarea și flatulența

Elimină gazele intestinale

Descriere, compoziție și mod de utilizare

Carbocit® Duo este un dispozitiv medical sub formă de comprimat dublu stratificat, util în tratamentul simptomelor legate de balonare și flatulență datorate acumulării de gaze. De asemenea, Carbocit® Duo diminuează crampele și durerea asociate flatulenței și balonării.

Mecanismul de acțiune

Eficacitatea dispozitivului medical se datorează sinergismului dintre cele două componente active. Simeticona prezintă acțiune anti-spumantă fiind completată de acțiunea absorbantă a cărbunelui activ. Prin urmare, acțiunea dispozitivului medical se bazează exclusiv pe fenomenele de natură mecanică. Comprimatul dublu stratificat permite eliberarea a aproximativ 50% din ingrediente în stomac în decurs de 15 minute după ingestia dispozitivului, în timp ce dezintegrarea completă a comprimatului are loc în mediul intestinal în decurs de 1 oră.

Componentele dispozitivului medical nu sunt absorbite în tractul gastro-intestinal și nu interferează cu absorbția nutrienților.

Componente

Fiecare comprimat conține:

- Simeticonă 50 mg
- Cărbune activ 300 mg

Excipienți: maltodextrină, sucroză, celuloză microcristalină, hidroxipropilmetilceluloză, polivinilpirrolidonă, siliciu coloidal, croscarmeloză sodică, polivinilpolipirrolidonă, glicerol behenat, dioxid de siliciu, stearat de magneziu

Forma de prezentare

Fiecare cutie conține 20 de comprimate dublu stratificate.

Doze și mod de administrare

Adulți: este recomandată administrarea a 1-2 comprimate după cele două mese principale. Se pot administra până la maximum 4 comprimate pe zi.
Adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani: este recomandată administrarea a 1 comprimat după cele două mese principale. Se pot administra până la maximum 2 comprimate pe zi. Comprimatele se înghit întregi, cu un pahar de apă.

Reacții adverse posibile

În urma administrării dozelor recomandate se poate observa închiderea la culoare a materiilor fecale din cauza cărbunelui. Fenomenul este fiziologic și nu implică nicio semnificație patologică. Nu se cunosc efecte secundare semnificative pe termen mediu și lung. Produsul nu afectează negativ nivelul de atenție. În cazul în care apar alte efecte secundare diferite de cele enumerate este recomandată consultarea unui medic.

Interacțiuni cu alte suplimente alimentare sau medicamente

Acțiunea absorbantă a cărbunelui și a simeticonei ar putea afecta negativ eficacitatea altor medicamente dacă sunt administrate în același timp. În cazul terapilor medicamentoase concomitente, consultați un medic înainte de a lua produsul. Simeticona poate împiedica efectul unor reactivi utilizați în diagnosticare, cum ar fi guma guaiac.

Experiența acumulată de-a lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă sunt puse în slujba oamenilor. De aceea, noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. Ne certificăm și recertificăm periodic la cel mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care ține de promisiunea noastră - să oferim produse sigure și de cea mai bună calitate.

 **BIOFARM®**

Carbocit® DUO

20 Comprimate
dublu stratificate



Util în tratamentul simptomelor asociate cu balonarea și flatulența

Elimină gazele intestinale

Condiții de păstrare

Păstrați Carbocit® Duo într-un loc uscat și departe de căldură directă sau surse de lumină. Deschideți blisterul doar înainte de utilizarea produsului. A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați Carbocit® Duo sub 25° C.

Atenționări și precauții

A nu se utiliza la copii cu vârsta sub 14 ani. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.

A se consuma, de preferință, înainte de data de expirare tipărită pe cutie. A nu se administra în poziția culcat. A nu se administra dacă ambalajul este deteriorat. Fiecare comprimat dublu stratificat este de unică folosință și trebuie extras din blister chiar înainte de administrare. A nu se administra comprimate parțial folosite (zdrobite sau sparte anterior) sau scoase anterior din blister. Acest mod de utilizare poate conduce la contaminarea produsului. A nu se administra în caz de leziuni gastrice sau intestinale. În caz de sarcină sau alăptare, luați Carbocit® Duo doar dacă este necesar și numai după consultarea unui medic. Nu depășiți doza superată, deoarece cantitățile mai mari pot provoca apariția unui efect advers.

Nu utilizați produsul mai mult de 30 de zile consecutive. Dacă simptomele persistă, consultați un medic. Nu se recomandă administrarea în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingredientele produsului.

Data de expirare

A nu se administra după data de expirare imprimată pe ambalaj. Data de expirare se referă la produsul din ambalajul său intact, depozitat corespunzător.

Eliminarea

Produsul expirat sau consumat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare în privința eliminării deșeurilor. Nu aruncați în niciun caz produsul sau ambalajul acestuia în mediul inconjurător.

Producător



SIIT SRL - Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano S/N (MI)



Distribuitor

BIOFARM S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București,
România
Tel.: (004)021.30.10.600

Ultima revizie Noiembrie 2021

Experiența acumulată de-a lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă sunt puse în slujba oamenilor. De aceea, noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. Ne certificăm și recertificăm periodic la cel mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care ține de promisiunea noastră - să oferim produse sigure și de cea mai bună calitate.

 **BIOFARM®**