



## TUSE USCATĂ

ACȚIUNE DUBLĂ

1 CALMEAZĂ IRIȚAȚIA | 2 PROTEJEAZĂ & HIDRATEAZĂ

99% ORIGINE NATURALĂ

FĂRĂ ZAHĂR

### TRATAMENTUL IRIȚAȚIEI GÂTULUI ASOCIATĂ CU TUSE USCATĂ

#### Instrucțiunile de utilizare

##### Ce este tusea?

Tusea este un reflex natural și esențial de apărare al organismului, care are ca scop curățarea căilor respiratorii. O tuse uscată, iritativă, deranjantă și epuizantă trebuie să fie distinsă de o tuse productivă, utilă pentru favorizarea eliminării secrețiilor.

Tusea uscată este însoțită de o senzație înțepătoare în gât și, de obicei, se intensifică noaptea, deteriorând calitatea vieții. Un produs specific trebuie utilizat pentru a trata fiecare tip de tuse separat. Dacă aveți dubii cu privire la natura tusei, consultați medicul sau farmacistul.

##### Ce este Bebedril sirop?

Bebedril este un sirop destinat sugarilor de la 6 luni și copiilor până la 6 ani împotriva iritației asociate cu tusea uscată, cauzată de infecțiile virale de iarnă responsabile de rinofaringită, răceala comună și anumite agresiuni exterioare precum prezența fumului de țigară, poluarea, praful, aerul uscat etc. Acționează, în special, datorită glicerolului, un extract din plante recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu putere naturală de hidratare, care calmează gâtul iritat.

##### Bebedril:

- 1 - Calmează iritația.
- 2 - Favorizează hidratarea și protejează gâtul prin formarea unei pelicule protectoare.

Fabricat în Franța. Formula sa compusă din ingrediente de origine naturală este fără zahăr, fără coloranți, fără parabeni și fără organisme modificate genetic (OMG). Aroma sa de căpșuni și pipeta sa gradată permit o administrare ușoară și sigură de la o vârstă fragedă.

##### Compoziție

**Sirop:** Glicerol, maltitol lichid, hidroxietilceluloză, benzoat de sodiu, acid citric monohidrat, citrat de sodiu, aromă de căpșuni, apă purificată.  
**Pipetă:** polietilenă (corp), polistiren (piston).

##### Ambalare

Flacon de 125 ml, prevăzut cu capac de siguranță pentru copii. O pipetă dozatoare gradată de 5 ml pentru administrare orală.

##### Contraindicații

Sugarii sub 6 luni.

Alergie la oricare dintre ingredientele produsului.

Intoleranță ereditară la fructoză (intoleranță congenitală la fructoză), rezultată în urma transformării maltitolului în fructoză.

##### ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE

Pentru sugarii cu vârste cuprinse între 6 luni și 12 luni se recomandă sfatul medicului.

În cazul unor simptome grave asociate cu tusea uscată (cum ar fi dificultăți de respirație, febră persistentă care durează mai mult de 3 zile, vărsături repetate, dificultăți la înghițire, diaree, modificări ale comportamentului sau tulburări de somn etc.), consultați un medic. Tusea este adesea asociată cu o infecție virală a tractului respirator, însă poate fi și semnul unei afecțiuni care necesită tratament specific (laringită, pneumonie, astm, etc.).

În cazul contactului accidental cu nasul, ochii sau urechile sugarului/copilului, clătiți cu soluție salină pentru a îndepărta siropul.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA SUGARILOR/COPILILOR, în special pipeta.

A nu se dilua. A nu se mânca și bea după administrare.

În cazul în care aveți dubii și/sau incidente grave asociate cu utilizarea produsului, consultați un medic.


Dacă aveți motive să credeți că a avut loc un incident grav în legătură cu utilizarea dispozitivului, vă rugăm să îl raportați autorității naționale competente și producătorului.

### Cum se folosește siropul Bebedril?

#### Informații privind administrarea siropului

Utilizați pipeta de dozare disponibilă în cutie.

Introduceți pipeta în flacon și trageți de pistonul alb până la marcajul negru de măsurare pentru a extrage o doză de 5 ml.



Introduceți vârful pipetei în gura sugarului/copilului după ce ați așezat sugarul/copilul astfel încât să evitați administrarea greșită a siropului. Apăsați încet și fără jet puternic pistonul pipetei, astfel încât sugarul/copilul să poată înghiți siropul.

Repetăți operațiunea respectând dozajul de 5 ml per doză de 3 până la 4 ori într-un interval de 24 de ore, dacă este necesar.

**Dacă ați uitat să administrați sugarului/copilului dumneavoastră siropul Bebedril la ora stabilită, nu dublați doza. Nu depășiți doza recomandată pentru sugar/copil.**

Clătiți pipeta după fiecare utilizare cu apă rece, pompând pistonul de mai multe ori.

Asigurați-vă că pipeta este curată înainte de a o pune înapoi în cutie.

#### Informații cu privire la pipetă:

Pipeta furnizată împreună cu siropul este special concepută pentru a administra o doză de 5 ml de sirop Bebedril.

În caz de pierdere sau deteriorare a pipetei, nu utilizați o pipetă dintr-un alt produs.

Părțile din plastic ale pipetei se pot deforma în cazul expunerii la căldură.

Astfel:

- nu utilizați un aparat de curățat, cum ar fi o mașină de spălat vase,
- nu sterilizați termic,
- nu introduceți pipeta în cuptorul cu microunde.

### Cum se păstrează siropul Bebedril?

Păstrați flaconul bine închis la temperatura camerei.

A se consuma în maxim 3 luni de la prima deschidere.

A nu se consuma după data de expirare (vezi eticheta de pe sticlă și/sau de pe cutie).

Sirop



**Pierre Fabre Médicament**

Les Cauquillous  
81500 Lavaur  
Franța



0459

Dispozitiv medical cu marcaj CE din:  
2013

Pipetă



**ROVIPHARM**

ZA Lucinges  
86, route du plan d'eau  
01370 Val-Revermont  
Franța



0459

Dispozitiv medical cu marcaj CE din:  
1999

Ambalat de:

**Pierre Fabre Médicament**

Les Cauquillous - 81500 Lavaur - Franța

Data revizuirii prospectului: Octombrie 2022



A se utiliza până la



Numărul lotului



Dispozitiv medical



Data de expirare după  
deschidere: 3 luni



Consultați instrucțiunile  
de utilizare



Producător



Identificator unic  
al dispozitivului



Pierre Fabre

335584