

DEPROX[®]
SUPOZITOARE

10 supozitoare

Conținutul ambalajului: 10 supozitoare (1,65 g).
Producător: IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.
Via Goffredo Mameli, 12 – 95020 Aci Bonaccorsi (CT), Italia.
Distribuit în România de Althea Life Science S.R.L.,
Str. Prahova nr. 7 Parter, Sector 1, București, România;
email: office@althealifescience.ro

DEPROX[®]
SUPOZITOARE

10 supozitoare


Althea
LIFE SCIENCE


pharma

Precauții: Întrerupeți utilizarea produsului în caz de reacții nedorite și consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul. În cazul utilizării concomitente a altor medicamente, consultați medicul înainte de a utiliza produsul. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat. **Condiții de păstrare:** a se păstra departe de sursele de căldură, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
Utilizare rectală. Nu înghițiți.

Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător după utilizare.

Citiți cu atenție prospectul înainte de utilizare.

DISPOZITIV MEDICAL Clasa IIb

MD



DEPROX[®]
SUPOZITOARE

Indicații/Utilizare: Supozitoarele Deprox[®] sunt un dispozitiv medical indicat ca adjuvant pentru tratamentul simptomelor locale (arsură, durere) ale canalului anorectal în prezența fenomenelor congestive asociate cu prostatita acută și cronică. **Compoziție:** GRAMINEX[®] NAX[™] (extract de polen de flori, pastă 7%; 24,7 mg/supozitor), hialuronat de sodiu (3,3 mg/supozitor), extract liposolubil de Malva sylvestris L., extract liposolubil de Calendula officinalis L., extract liposolubil de Aloe barbadensis M., Gliceride semisintetice, Gliceride C10-18 / gliceride C12-18, ulei esențial de Eugenia caryophyllus, Vitamina E acetat, Vitamina A palmitat, siliciu coloidal. **Doze și mod de administrare:** 1 supozitor zilnic, de preferință seara, înainte de culcare, timp de cel puțin

Dispozitiv medical cu acțiune emolientă și calmantă indicat ca adjuvant în tratamentul local al simptomelor canalului anorectal în prezența fenomenelor congestive asociate cu prostatita acută și cronică.

10 zile consecutive sau conform sfatului medicului. Durata tratamentului depinde de evoluția simptomelor. **Instrucțiuni de utilizare:** 1. Spălați-vă în prealabil pe mâini; 2. Îndoiți blisterul de-a lungul liniei punctate și trageți; 3. Îndepărtați ambalajul, așa cum este indicat pe alveolă, separând cele două clapete și extrageți supozitorul; 4. Introduceți supozitorul în rect și contractați fesele pentru câteva secunde; 5. Spălați-vă mâinile după introducerea supozitorului.



5 949096 840068

CE
0476

UDI

LOT



DEPROX[®]
SUPOZITOARE

10 supozitoare