



**aktiv**

# Iritacolin

Dispozitiv medical  
pentru tratamentul  
sindromului  
intestinului iritabil

cu simptome ca

- Balonare
- Diaree
- Constipație
- Durere

Cu Zeolit  
Aloe Vera  
Nalbă mare  
Mușețel



## Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Iritacolin își poate îndeplini scopul propus numai dacă este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare.

### Compoziție:

Zeolit (clinoptilolit), extract de mușețel (*Matricaria chamomilla* L), extract de nalbă mare (*Althaea officinalis* L), Aloe vera (*Aloe vera* L., gel din suc) 200:1 extract uscat, carboximetilceluloză de sodiu reticulată, *Lactobacillus plantarum* tindalizat (conține soia, lapte și produse lactate, inclusiv lactoză), celuloză, fosfați de calciu, săruri de magneziu ale acizilor grași, dioxid de siliciu, ulei esențial de enicul dulce (*Foeniculum vulgare* Mill.), ulei esențial de chimen (*Carum carvi* L.).

### Indicații de utilizare:

Dispozitiv medical indicat pentru tratamentul sindromului intestinului iritabil, caracterizat prin durere, balonare, distensie și disconfort abdominal, asociate sau nu cu modificări ale materiilor fecale și cu modificări ale tranzitului intestinal (constipație, diaree sau alternanța stărilor de constipație cu cele de diaree).

### Mecanism de acțiune:

Datorită acțiunii sale mecanice protectoare, Iritacolin interacționează fizic cu mucoasa intestinală, formând un film mucoadeziv care protejează mucoasa de contactul cu iritanții. În același timp, ajută la îndepărtarea substanțelor periculoase prin împiedicarea absorbției lor, printr-un mecanism fizic de adsorbție a gazelor intestinale, reducând astfel tulburările tipice ale sindromului intestinului iritabil.

### Mod de utilizare:

Luați 1 comprimat de două ori pe zi, între sau înainte de mese sau după sfatul medicului sau al farmacistului. În caz de durere acută, doza poate fi dublată.

În funcție de intensitatea tulburării, se recomandă prelungirea tratamentului de la 2 la 6 săptămâni și repetarea acestuia la posibila reapariție a primelor simptome.



### Atenționări:

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, se recomandă să nu se utilizeze produsul în timpul sarcinii sau alăptării și la copiii sub 12 ani. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest produs.
- Nu depășiți doza de 4 comprimate pe zi.
- Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic sau hipersensibil la orice componentă.
- Nu utilizați produsul după data de expirare tipărită pe ambalaj.
- Data de expirare se referă la produsul în ambalaj intact, depozitat corespunzător.

### Condiții de depozitare:



A se păstra în ambalajul original, la temperatura camerei, sub 25 °C, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină.

**Producător:**

Labomar S. p. A.  
Via N. Sauro, n. 35/I  
Istrana (TV)  
Italia

 FTP54

 0477

Dispozitiv medical

**Distribuitor:**

Queisser Pharma SRL  
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97,  
Etaj 1, Corpul B, Sector 1,  
București, cod 010624  
Tel.: 021 / 311.24.20  
[www.doppelherz.ro](http://www.doppelherz.ro)  
e-mail: [info@queisser.ro](mailto:info@queisser.ro)

Ultima revizuire: Aprilie 2022