

## FORESTO

4.50 g+2.03 g zgardă antiparazitară > 8 kg

### Denumirea produsului medical veterinar

Seresto 4.5 g+ 2.03 g collar for dogs > 8 kg  
Foresto 4.50 g+2.03 g zgarda antiparazitara > 8 kg  
Imidacloprid  
Flumetrin

### Declararea substanțelor active și a altor ingrediente

O zgardă de culoare gri, fără miros de 70 cm (45 g) conține 4,5 imidacloprid și 2,03 flumetrin ca substanțe active  
Excipienți: Dioxid de titan (E171), oxid de fier (E172), dibutiladipat, propilen glicoldicaprilocarpat, ulei de soia expoxidizat, acid stearic, policlorură de vinil.

### Indicații

Pentru tratamentul și prevenirea infestării cu purici (*Ctenocephalides felis*) tip de 7 până la 8 luni. Eficacitatea împotriva puricilor începe imediat după aplicarea zgărzii.

Protejează împrejurimile animalului împotriva dezvoltării larvelor de purici până la 8 luni. Foresto poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament pentru combaterea dermatitei alergice provocată de purici (FAD).

Produsul are efect acaricid (ucidere) de durată, eficacitatea împotriva infestărilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) și eficacitate repelentă (anti-hrănire) împotriva infestărilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) pentru 8 luni. Este eficient împotriva larvelor, nimfelor și căpușelor adulte.

Căpușele deja prezente pe câine înainte de tratament nu pot fi ucise în 48 de ore după aplicarea zgărzii și pot rămâne atașate și vizibile. Prin urmare, îndepărtarea căpușelor deja prezente pe câine, la momentul aplicării zgărzii este recomandat. Prevenirea infestațiilor cu noi căpușe începe în două zile după aplicarea zgărzii.

Pentru tratamentul infestărilor cu păduchi malofagi (*Trichodectes canis*).

Ideal, această zgardă antiparazitară trebuie să fie aplicată înainte de începutul sezonului cu purici și căpușe.

### Contraindicații

Nu se vor trata cățelei cu vârsta mai mică de 7 săptămâni.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

### Reacții adverse

Ocazional ușor prurit și/sau eritem pot fi observate la animalele care nu sunt obișnuite în a purta zgardă în primele zile după aplicare. Asigurați-vă că zgarda nu este fixată prea strâns. La locul de aplicare poate să apară o ușoară cădere a părului și reacții ușoare ale pielii care dispar, de obicei, în decurs de 1 până la 2 săptămâni fără a fi necesară îndepărtarea zgărzii. În cazuri izolate, o eliminare temporară a zgărzii poate fi recomandată, până când simptomele au dispărut.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

### Specii țintă

Câini > 8 kg


### Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare.

Câinii cu greutatea corporală mai mare de 8 kg primesc o zgardă Foresto cu lungime de 70 de cm. câinii de talie mică cu greutatea corporală până la 8 kg primesc o zgardă Foresto cu lungimea de 38 de cm.

Aplicare cutanată. O zgardă pentru fiecare animal, se fixează în jurul gâtului. Numai pentru uz extern.

### Recomandări privind administrarea corectă.

Zgarda se scoate din pungă de protecție doar înainte de utilizare. Se desface zgarda și se verifică dacă nu au rămas resturi de plastic pe partea interioară a zgărzii. Se fixează zgarda în jurul gâtului animalului fără a se strânge prea tare (ca un ghid ar trebui să fie posibilă inserarea a 2 degete între zgardă și gâtul animalului. Se trage partea liberă prin cataramă și se taie orice lungime în exces care depășește 2 cm.



Zgarda trebuie să fie purtată continuu pe toată perioada de protecție de 8 luni și trebuie să fie îndepărtată după perioada de tratament. Verificați periodic și ajustați zgarda dacă este necesar, mai ales atunci când cățelei sunt în creștere rapidă.

#### **Timp de așteptare**

Nu este cazul

#### **Precauții speciale pentru depozitare.**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.  
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.  
A nu se utiliza după data expirării marcată pe pungă și pe cutie.

#### **Atenționari speciale**

Ca regulă căpușele vor fi omorâte și vor cădea de pe zgardă într-un timp de 24 până la 48 de ore după infestare fără să fi avut o masă de sânge. Prezența unei căpușe după aplicare nu este exclusă. Din acest motiv transmiterea de boli infecțioase prin intermediul căpușelor nu poate fi exclusă complet mai ales în cazul în care condițiile sunt nefavorabile.

Ca la toate produsele topice cu acțiune pe termen lung, în perioadele de năpârlire poate conduce la o ușoară și tranzitorie reducere a eficacității prin pierderea părului de care era legată substanța activă din acest produs. Zgarda va completa imediat lipsa de substanță activă, astfel că eficacitatea deplină va fi restabilită, fără un tratament suplimentar sau de înlocuire a zgărzii.  
Pentru combaterea eficientă a puricilor în gospodăriile puternic infestate est necesar a se aplica în mediul înconjurător un insectivid adecvat pentru această utilizare.

Produsul este rezistent la apă, rămâne eficient dacă animalul se udă. Cu toate acestea, expunerea prelungită și intensă la apă și șamponarea excesivă ar trebui să fie evitată, deoarece durata de activitate poate fi redusă. Studiile au arătat că șamponarea lunară sau imersia în apă nu scurtează în mod semnificativ de 8 luni pentru căpușe după redistribuirea substanțelor active în blană dar eficacitatea produsului față de purici a scăzut treptat, începând cu luna 5.

Studiile de laborator, fie cu flumetrin sau imidacloprid pe șobolani și iepuri nu au produs efecte asupra fertilității sau reproducerii și nu au demonstrat efecte teratogene sau fetotoxice. Cu toate acestea, siguranța produsului medicinal veterinar la speciile țintă nu a fost stabilită în timpul sarcinii și alăptării și prin urmare în absența datelor disponibile, produsul nu este recomandat la cățelele care sunt gestante sau care sunt în lactație.

Datorită naturii produsului semen de supradozare sunt puțin probabile iar semen de supradozare nu sunt așteptate. O supradozare prin aplicare a 5 zgărzi în jurul gâtului a fost investigată la câini adulți pentru o perioadă de 8 luni și la căței cu vârsta de 7 săptămâni pentru o perioadă de 6 luni nu au fost observate reacții adverse în afară de pierderea ușoară a părului și reacții ușoare ale pielii. În cazul puțin probabil ca animalul să ingere zgarda pot să apară simptome gastro-intestinale (de exemplu, scaun moale).

Precauții speciale pentru persoanele care administrează Foresto la animale:  
Zgarda se scoate din pungă de protecție doar înainte de utilizare.

Asemănător cu orice produs medicinal veterinar, nu permiteți copiilor mici să se joace cu zgarda sau să doarmă în același pat cu proprietarii lor, în special copii.  
Persoanele cu sensibilitate cunoscută la ingredientele din zgardă trebuie să evite contactul cu zgarda. Eliminați imediat orice resturi sau bucăți tăiate din zgardă.  
Spălați-vă pe mâini cu apă rece după fixarea zgărzii.

#### **Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.  
Acest produs nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

#### **Alte informații**

Dimensiunea ambalajului: o zgardă.  
Ambele substanțe active sunt eliberate lent și continuu în concentrații scăzute din matricea acestui sistem din polimer de la zgardă spre animal. Ambele substanțe active sunt prezente în blana câinilor în concentrații acaricide/insecticide pe toată perioada de eficacitate.

Substanțele active se extind de la locul de contact direct pe întreaga suprafață a pielii. Studiile de supradozare pe speciile țintă de animale și studiile serice cinetice au stabilită că imidaclopridul a ajuns temporar în circulația sistemică în timp ce flumetrina în cea mai mare parte nu a putut fi măsurată. Absorbția orală a ambelor substanțe active nu este relevantă pentru eficacitatea clinică.

Activitatea împotriva puricilor începe imediat după aplicarea zgărzii. În plus față de indicațiile enumerate mai sus a fost demonstrată și activitate împotriva puricilor *Ctenocephalides canis* și *Pulex irritans*.

Produsul oferă activitate repelentă (anti-hrănire) împotriva căpușelor menționate, prin respingerea paraziților se previne astfel masa de sânge și ajută indirect la reducerea riscului de boli transmise prin vectori la câine. În plus față de indicațiile enumerate mai sus a fost demonstrat la câini activitate împotriva *I. hexagonus*, *I. scapularis* și a speciilor non-europene de *Dermacentor variabilis* și a căpușei paralizante din Australia *I. holocyclus*.

Zgărzile au fost de asemenea capabile să ajute la o evoluție favorabilă la infestarea cu *Sarcoptes scabiei* la câini infestați anterior ducând la o vindecare completă după 3 luni.