

PROIBS®



Pentru tratamentul simptomelor asociate sindromului de colon iritabil

Instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție înainte de utilizare, deoarece conțin informații importante pentru dumneavoastră. Acest dispozitiv medical este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, pentru a obține cel mai bun rezultat al tratamentului, PROIBS® trebuie utilizat conform instrucțiunilor.

Scopul propus

PROIBS® este un dispozitiv medical certificat pentru tratamentul simptomelor asociate, precum durerea abdominală, balonarea și modificări ale tranzitului intestinal (diaree și/sau constipație).

Despre sindromul colonului iritabil

Sindromul colonului iritabil este o tulburare gastro-intestinală frecventă. Se manifestă ca grup de simptome ce includ durerea abdominală, balonarea și modificări ale tranzitului intestinal ce variază de la diaree la constipație. Fiziopatologia și cauza sindromului colonului iritabil nu sunt pe deplin elucidate, astfel încât tratamentul vizează mai ales ameliorarea simptomelor.

Compoziție

Un plic PROIBS® conține ca substanță activă 250 mg de extract AVH200®, un extract vegetal. Alte ingrediente: Fructoză, inulină, acid citric, bicarbonat de sodiu, acid ascorbic, dioxid de siliciu, fosfat tricalcic, stearat de magneziu, aromă de lămâie, riboflavină.

Mod de utilizare

Dizolvați conținutul unui plic într-un pahar cu apă și administrați de 1-2 ori pe zi, în funcție de severitatea simptomelor.

Durata utilizării

PROIBS® este potrivit pentru utilizare pe termen lung. Cu toate acestea, dacă luați produsul pe termen lung sau dacă simptomele dumneavoastră se agravează, consultați medicul sau farmacistul.

Contraindicații

PROIBS® nu trebuie utilizat în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente, în special în caz de intoleranță la fructoză.

Persoanele cu diabet trebuie să utilizeze produsul numai după ce consultă medicul, deoarece PROIBS® conține zahăr.

Interacțiuni

Nu se cunosc interacțiuni cu medicamentele. Cu toate acestea, se recomandă consultarea medicului în cazul în care sunt administrate medicamente.

Reacții adverse

Nu se cunosc reacții adverse. Dacă apar reacții de hipersensibilitate, întrerupeți tratamentul. Dacă, contrar așteptărilor, prezentați reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct producătorului și autorității naționale competente.



Precauții

Utilizați produsul în timpul sarcinii și alăptării numai după consultarea medicului.

A nu se utiliza la copii cu vârsta sub 6 ani. Utilizați la copiii cu vârsta între 6 și 12 ani numai după consultarea medicului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Păstrare și valabilitate

Data limită de utilizare este marcată pe cutie și pe plic.  Nu utilizați produsul după această dată. A se păstra într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între 5 °C și 25 °C. 

Ambalaj

10/ 30 plicuri de 3 g

Ce părere ați avut despre produs?

Pentru sugestii sau solicitări, contactați producătorul. Păstrați instrucțiunile de utilizare. S-ar putea să doriți să le recitiți. Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau recomandări. Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează, consultați medicul.

  Dispozitiv medical

Producător

C. Hedenkamp GmbH & Co.KG
Schierbusch 1
331 61 Hövelhof
Germania

Distribuitor

MagnaPharm Marketing&Sales
ROMANIA SRL
Str. Av. Popișteanu, nr. 54A,
Clădirea 2, din incinta Expo
Business Park, etaj 7, Sector 1,
București, Cod poștal 012095,
Tel: +4 0372 502 200,
Fax: +4 0372 502 255