

**ANEXA I**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

## 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Rixathon 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă

Rixathon 500 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă

## 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Rixathon 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă

Fiecare ml conține rituximab 10 mg.

Fiecare flacon de 10 ml conține rituximab 100 mg (rituximabum).

Rixathon 500 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă

Fiecare ml conține rituximab 10 mg.

Fiecare flacon de 50 ml conține rituximab 500 mg (rituximabum).

Rituximab este un anticorp monoclonal himeric uman/șoarece, produs prin inginerie genetică, ce reprezintă o imunoglobulină glicozilată, cu regiuni constante de IgG1 uman și cu secvențe regionale variabile de lanțuri murine ușoare și grele. Anticorpul este produs în cultură de suspensie de celule de mamifer (ovar de hamster chinezesc) și purificat prin cromatografie de afinitate și schimb de ioni, incluzând procedee specifice de inactivare virală și îndepărtare.

Excipient cu efect cunoscut

Fiecare flacon de 10 ml conține 52,6 mg (2,3 mmoli) de sodiu.

Fiecare flacon de 50 ml conține 263,2 mg (11,5 mmoli) de sodiu.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluție perfuzabilă (concentrat steril).

Lichid limpede, incolor până la ușor gălbui, cu un pH de 6,3 - 6,7 și osmolalitate de  $\geq 240$  mOsm/kg.

## 4. DATE CLINICE

### 4.1 Indicații terapeutice

Rixathon este utilizat la adulți pentru următoarele indicații:

Limfom non-Hodgkin (LNH)

Rixathon este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom folicular stadiul III-IV, netratați anterior, în asociere cu chimioterapie.

Terapia de întreținere cu Rixathon este indicată pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom folicular, care au răspuns la terapia de inducție.

Monoterapia cu Rixathon este indicată pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom folicular stadiul III-IV, chimiorezistent sau care a recidivat de două sau mai multe ori după chimioterapie.

Rixathon este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom non-Hodgkin difuz cu celulă mare B, cu marker CD20 pozitiv, în asociere cu chimioterapie CHOP (ciclofosamidă, doxorubicină, vincristină, prednisolon).

Rixathon în asociere cu chimioterapie este indicat pentru tratamentul pacienților copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 18 ani) cu limfom difuz cu celulă mare B, cu marker CD20 pozitiv, în stadiu avansat, netratat anterior (DLBCL), limfom Burkitt (BL)/leucemie Burkitt (leucemie acută cu celule mature B) (BAL) sau limfom asemănător limfomului Burkitt (BLL).

#### Leucemie limfocitară cronică (LLC)

Rixathon în asociere cu chimioterapie este indicat pentru tratamentul pacienților cu LLC netratată anterior și cea cu recăderi/refractoră. Sunt disponibile numai date limitate de eficacitate și siguranță pentru pacienții tratați anterior cu anticorpi monoclonali inclusiv rituximab sau pacienții refractari la tratament anterior cu rituximab plus chimioterapie.

Pentru informații suplimentare vezi pct. 5.1.

#### Poliartrită reumatoidă

Rixathon în asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu poliartrită reumatoidă activă, severă, care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la alte antireumatice care modifică boala (DMARD) incluzând unul sau mai multe tratamente cu inhibitori ai factorului de necroză tumorală (TNF).

S-a demonstrat că rituximabul reduce rata de progresie a afectării articulare, determinată prin metode radiologice, și îmbunătățește funcția fizică, atunci când se administrează în asociere cu metotrexat.

#### Granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA)

Rixathon, administrat în asociere cu glucocorticoizi, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu GPA (Wegener) activă, severă și MPA.

Rixathon, administrat în asociere cu glucocorticoizi, este indicat pentru inducția remisiunii la pacienții copii și adolescenți (cu vârsta  $\geq 2$  până la  $< 18$  ani) cu GPA activă, severă (Wegener) și MPA.

#### Pemfigus vulgar (PV)

Rixathon este indicat pentru tratamentul pacienților cu PV moderat până la sever.

## **4.2 Doze și mod de administrare**

Rixathon trebuie administrat sub supravegherea atentă a unui profesionist experimentat din domeniul sănătății și într-un spațiu unde sunt disponibile imediat echipamente complete de resuscitare (vezi pct. 4.4).

#### Premedicația și medicația profilactică

Premedicația constând dintr-un antipiretic și un antihistaminic, de exemplu paracetamol și difenhidramină, trebuie întotdeauna administrată înaintea fiecărei perfuzii de Rixathon.

La pacienții adulți cu LNH și LLC, premedicația cu glucocorticoizi trebuie luată în considerare dacă Rixathon nu este administrat în asociere cu chimioterapie care conține glucocorticoizi.

Pentru pacienții adulți cu LNH și LLC cărora li s-a administrat Rixathon pe baza vitezei de perfuzare de 90 de minute, premedicația cu glucocorticosteroizi trebuie luată în considerare dacă Rixathon nu este administrat în asociere cu chimioterapie care conține glucocorticoizi.

La pacienții copii și adolescenți cu LNH, premedicația cu paracetamol și antihistamină H<sub>1</sub> (= difenhidramină sau echivalent) ar trebui să se administreze cu 30-60 minute înainte de începerea perfuziei cu Rixathon. În plus, ar trebui să se administreze prednison conform indicațiilor din Tabelul 1.

Pentru reducerea riscului de apariție a sindromului de liză tumorală la pacienții cu LLC, este recomandată profilaxia cu hidratare corespunzătoare și administrarea de uricostatice începând cu 48 de ore înainte de inițierea tratamentului. Pentru pacienții cu LLC la care numărul de limfocite este > 25 x 10<sup>9</sup>/l, este recomandat să se administreze 100 mg de prednison/prednisolon pe cale intravenoasă cu puțin timp înaintea perfuziei cu Rixathon pentru a scădea frecvența și severitatea reacțiilor acute asociate perfuziei și/sau a sindromului de eliberare de citokine.

La pacienții cu poliartrită reumatoidă, GPA sau MPA sau PV, premedicația cu 100 mg metilprednisolon intravenos trebuie finalizată cu 30 minute înainte de administrarea fiecărei perfuzii cu Rixathon, pentru a reduce incidența și severitatea reacțiilor legate de perfuzie (IRR).

La pacienții adulți cu GPA sau MPA, înainte de administrarea primei perfuzii de Rixathon se recomandă tratament cu metilprednisolon administrat intravenos timp de 1 până la 3 zile în doză de 1000 mg pe zi (ultima doză de metilprednisolon poate fi administrată în aceeași zi cu prima perfuzie de Rixathon). Acesta trebuie continuat cu prednisolon administrat oral 1 mg/kg/zi (fără a depăși 80 mg/zi și scăzut treptat cât mai rapid posibil pe baza necesității clinice), în timpul tratamentului și după terminarea perioadei de inducție de 4 săptămâni a tratamentului cu Rixathon.

La pacienții adulți cu GPA sau MPA sau PV se recomandă tratamentul profilactic împotriva pneumoniei cu *Pneumocystis jirovecii* (PJP) în timpul și după tratamentul cu Rixathon, în conformitate cu ghidurile de practică clinică locală.

#### *Copii și adolescenți*

La pacienții copii și adolescenți cu GPA sau MPA, înainte de administrarea primei perfuzii intravenoase de Rixathon se recomandă tratament cu metilprednisolon administrat intravenos timp de trei zile în doză de 30 mg/kg/ zi (fără a se depăși 1 g/zi) pentru tratamentul simptomelor severe de vasculită. Pot fi administrate maximum trei doze suplimentare zilnice de 30 mg/kg de metilprednisolon intravenos înainte de prima perfuzie de Rixathon.

După încheierea administrării de metilprednisolon intravenos, pacienții trebuie să primească prednison administrat oral 1 mg/kg/zi (fără a se depăși 60 mg/zi) și scăzut treptat cât mai rapid posibil pe baza necesității clinice (vezi pct. 5.1).

La pacienții copii și adolescenți cu GPA sau MPA se recomandă profilaxia PJP în timpul și după tratamentul cu Rixathon, după cum este cazul.

#### Doze

Este important să se verifice etichetele medicamentelor pentru a fi sigur că se administrează pacientului forma farmaceutică corespunzătoare, așa cum a fost prescrisă.

#### *Limfom non-Hodgkin (LNH)*

##### *Limfom folicular non-Hodgkin*

##### Terapie asociată

Doza recomandată de Rixathon în asociere cu chimioterapie pentru tratamentul de inducție la pacienții netratați anterior sau pacienți cu limfom folicular refractar/recidivat este: 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală pe ciclu, pentru 8 cicluri.

Rixathon trebuie administrat în ziua 1 a fiecărui ciclu de chimioterapie, după administrarea intravenoasă a componentei glucocorticoide a chimioterapiei, dacă este cazul.

#### Terapie de întreținere

- Limfom folicular netratat anterior

Doza recomandată de Rixathon utilizată ca tratament de întreținere pentru pacienții cu limfom folicular netratat anterior care au răspuns la tratamentul de inducție este: 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală o dată la 2 luni (începând la 2 luni după ultima doză a tratamentului de inducție) până la progresia bolii sau pentru o perioadă de maximum doi ani (12 perfuzii, în total).

- Limfom folicular refractar/recidivat

Doza recomandată de Rixathon utilizată ca tratament de întreținere pentru pacienții cu limfom folicular refractar/recidivat care au răspuns la tratamentul de inducție este: 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală o dată la 3 luni (începând la 3 luni după ultima doză a tratamentului de inducție) până la progresia bolii sau pentru o perioadă de maximum doi ani (8 perfuzii, în total)..

#### Monoterapie

- Limfom folicular refractar/recidivat

Doza recomandată de Rixathon în monoterapie utilizată ca tratament de inducție pentru pacienții adulți cu limfom folicular stadiul III–IV, chimiorezistent sau care a recidivat de două sau mai multe ori după chimioterapie este: 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, administrată în perfuzie intravenoasă, o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni.

Pentru repetarea tratamentului cu Rixathon în monoterapie pentru pacienții care au răspuns la tratamentul anterior cu rituximab în monoterapie pentru limfomul folicular refractar/recidivat, doza recomandată este: 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă, o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni (vezi pct. 5.1).

#### *Limfom non-Hodgkin difuz, cu celulă mare B, la pacienții adulți*

Rixathon trebuie utilizat în asociere cu chimioterapia CHOP. Doza recomandată este de 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, administrată în ziua 1 a fiecărui ciclu de chimioterapie pentru 8 cicluri, după administrarea perfuziei intravenoase a componentei glucocorticoide a CHOP. Nu au fost stabilite siguranța și eficacitatea rituximabului în asociere cu alte tipuri de chimioterapie în LNH difuz, cu celulă mare B.

#### Ajustarea dozei în timpul tratamentului

Nu sunt recomandate reduceri ale dozei de Rixathon. Atunci când Rixathon se administrează în asociere cu chimioterapie, trebuie aplicată schema standard de reduceri a dozei pentru medicamentele chimioterapice.

#### Leucemie limfocitară cronică (LLC)

Doza recomandată de Rixathon în asociere cu chimioterapie pentru pacienți netratați anterior și cei cu recăderi/refractari la tratament este de 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală administrată în ziua 0 a primului ciclu de tratament urmată de o doză de 500 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală administrată în ziua 1 a fiecărui ciclu ulterior, pentru 6 cicluri în total. Chimioterapia trebuie administrată după perfuzia cu Rixathon.

#### Poliartrită reumatoidă

Pacienții tratați cu Rixathon trebuie să primească un card de atenționare a pacientului la fiecare perfuzie.

O serie de tratament cu Rixathon constă în două perfuzii intravenoase de 1000 mg. Doza recomandată de Rixathon este de 1000 mg, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă, urmată de a doua perfuzie intravenoasă de 1000 mg, după două săptămâni.

La 24 de săptămâni de la seria de tratament anterioară trebuie evaluat necesarul unor serii ulterioare. Repetarea tratamentului trebuie efectuată la acel moment dacă activitatea reziduală a bolii persistă, altfel repetarea tratamentului trebuie întârziată până când reappare activitatea bolii.

Datele disponibile sugerează că răspunsul clinic este obținut, în general, în decurs de 16-24 săptămâni de la cura inițială de tratament. Continuarea tratamentului trebuie reconsiderată cu grijă la pacienții care nu prezintă nicio dovadă de beneficiu terapeutic în această perioadă.

#### Granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA)

Pacienții tratați cu Rixathon trebuie să primească cardul de atenționare al pacientului la fiecare perfuzie.

##### *Inducția remisiunii la adulți*

Doza recomandată de Rixathon pentru inducția tratamentului de remisiune la pacienții adulți cu GPA și MPA este de 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă o dată pe săptămână, timp de 4 săptămâni (în total patru perfuzii).

##### *Tratamentul de întreținere la adulți*

După inducția remisiunii cu Rixathon, tratamentul de întreținere la pacienții adulți cu GPA și MPA nu trebuie inițiat la un interval mai scurt de 16 săptămâni după ultima perfuzie cu rituximab.

După inducția remisiunii cu alte tratamente imunosupresoare standard, tratamentul de întreținere cu Rixathon trebuie inițiat în interval de 4 săptămâni de la obținerea remisiunii bolii.

Rixathon se va administra sub forma a două perfuzii de 500 mg pe cale intravenoasă separate printr-un interval de două săptămâni, ulterior administrându-se câte o perfuzie intravenos de 500 mg la intervale de 6 luni. Pacienților li se va administra Rixathon pe o perioadă de minimum 24 de luni după obținerea remisiunii (absența semnelor și simptomelor clinice). În cazul pacienților care pot fi expuși unui risc crescut de recurență a bolii, medicii trebuie să ia în considerare prelungirea duratei terapiei de întreținere cu Rixathon, până la 5 ani.

#### Pemfigus vulgar (PV)

Pacienții tratați cu Rixathon trebuie să primească un card de atenționare a pacientului la fiecare perfuzie.

Doza recomandată de Rixathon pentru tratamentul PV este de 1000 mg, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă, urmată la interval de două săptămâni de o a doua doză de 1000 mg în perfuzie administrate intravenos, în asociere cu glucocorticoizi în doze reduse progresiv.

##### *Tratamentul de întreținere*

La 12 și 18 luni și ulterior, la intervale de 6 luni sau în funcție de evaluarea clinică, dacă este necesar, se va administra o doză de întreținere de 500 mg intravenos.

##### *Tratamentul recurențelor*

În eventualitatea unei recurențe a bolii, pacienților li se poate administra o doză de 1000 mg intravenos. Profesionistul din domeniul sănătății trebuie să ia în considerare, de asemenea, reluarea tratamentului cu glucocorticoizi sau creșterea dozei de glucocorticoid, pe baza unei evaluări clinice.

Perfuziile ulterioare nu trebuie administrate la interval mai scurt de 16 săptămâni după perfuzia anterioară.

### Grupe speciale de pacienți

#### *Copii și adolescenți*

#### Limfomul non-Hodgkin (LNH)

La pacienții copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 18 ani cu DLBCL/BL/BAL/BLL, cu marker CD20 pozitiv, în stadiu avansat, netratat anterior, ar trebui să se folosească Rixathon în asociere cu chimioterapia sistemică pentru limfom Malin B (LMB) (vezi Tabelele 1 și 2). Doza recomandată de Rixathon este de 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală, administrat sub formă de perfuzie intravenoasă. Nu sunt necesare alte ajustări ale dozei de Rixathon decât pe baza suprafeței corporale.

Siguranța și eficacitatea rituximabului la pacienții copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 18 ani nu au fost stabilite în alte indicații decât cele de DLBCL/BL/BAL/BLL, cu marker CD20 pozitiv, în stadiu avansat, netratat anterior. Sunt disponibile numai date limitate pentru pacienții cu vârsta sub 3 ani. Pentru informații suplimentare vezi pct. 5.1.

Rixathon nu trebuie administrat la pacienții copii și adolescenți de la naștere și până la < 6 luni cu limfom difuz cu celulă mare B, cu marker CD20 pozitiv (vezi pct. 5.1).

**Tabel 1 Doze în cazul administrării rituximabului pentru pacienții copii și adolescenți cu LNH**

<b>Ciclu</b>	<b>Ziua de tratament</b>	<b>Detalii privind administrarea</b>
Pre-faza (COP)	Nu se administrează rituximab	-
Ciclu de tratament de inducție 1 (COPDAM1)	Ziua -2 (corespunzătoare celei de-a 6-a zi a pre-fazei) Prima perfuzie de rituximab	În timpul primului ciclu de tratament de inducție, se administrează prednison ca parte a ciclului de chimioterapie și trebuie să se administreze înainte de rituximab.
	Ziua 1 A 2-a perfuzie de rituximab	Rituximab se va administra în 48 de ore de la prima perfuzie de rituximab.
Ciclu de tratament de inducție 2 (COPDAM2)	Ziua -2 A 3-a perfuzie de rituximab	În timpul celui de-al doilea ciclu de tratament de inducție, nu se administrează prednison atunci când se administrează rituximab.
	Ziua 1 A 4-a perfuzie de rituximab	Rituximab se va administra în 48 de ore de la cea de-a treia perfuzie de rituximab.
Ciclu de tratament de consolidare 1 (CYM/CYVE)	Ziua 1 A 5-a perfuzie de rituximab	Nu se administrează prednison atunci când se administrează rituximab.
Ciclu de tratament de consolidare 2 (CYM/CYVE)	Ziua 1 A 6-a perfuzie de rituximab	Nu se administrează prednison atunci când se administrează rituximab.

Ciclu	Ziua de tratament	Detalii privind administrarea
Ciclu de tratament de întreținere 1 (M1)	Ziua 25-28 a ciclului de tratament de consolidare 2 (CYVE) Nu se administrează rituximab	Începe atunci când s-a restabilit numărul de celule din sângele periferic după ciclul de tratament de consolidare (CYVE) cu ANC > 1,0 x 10 <sup>9</sup> /l și trombocite > 100 x 10 <sup>9</sup> /l
Ciclu de tratament de întreținere 2 (M2)	Ziua a 28-a a ciclului de tratament de întreținere 1 (M1) Nu se administrează rituximab	-

ANC = Numărul absolut de neutrofile; COP = Ciclofosfamidă, Vincristină, Prednison; COPDAM = Ciclofosfamidă, Vincristină, Prednisolon, Doxorubicină, Metotrexat; CYM = Citarabină (Aracitină, Ara-C), Metotrexat; CYVE = Citarabină (Aracitină, Ara-C), VEposide (VP16)

**Tabel 2 Planul de tratament pentru pacienții copii și adolescenți cu LNH: Chimioterapie administrată concomitant cu rituximab**

Plan de tratament	Etapa pacientului	Detalii privind administrarea
Grupul B	Stadiul III cu nivel ridicat de LDH (> N x 2), SNC negativ stadiul IV	Pre-fază urmată de 4 cicluri: 2 cicluri de tratament de inducție (COPADM) cu HDMTX 3g/m <sup>2</sup> și 2 cicluri de tratament de consolidare (CYM)
Grupul C	Grupul C1: B-AL SNC negativ, stadiul IV și BAL SNC pozitiv și CSF negativ	Pre-fază urmată de 6 cicluri: 2 cicluri de tratament de inducție (COPADM) cu HDMTX 8g/m <sup>2</sup> , 2 cicluri de tratament de consolidare (CYVE) și 2 cicluri de tratament de întreținere (M1 și M2)
	Grupul C3: BAL CSF pozitiv, CSF pozitiv stadiul IV	
Ciclurile consecutive trebuie administrate imediat ce se stabilizează numărul de celule sanguine și starea pacientului permite acest lucru, cu excepția ciclurilor de tratament de întreținere care se administrează la intervale de 28 de zile		

BAL = leucemie Burkitt (leucemie acută cu celule B mature); CSF = Lichid cefalorahidian; SNC = Sistem Nervos Central; HDMTX = Metotrexat în doze mari; LDH = Lactat dehidrogenază

### Granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA)

#### Inducția remisiunii

Doza recomandată de Rixathon pentru inducția tratamentului de remisiune la pacienții copii și adolescenți cu GPA sau MPA activă, severă, este de 375 mg/ m<sup>2</sup> suprafața corporală, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă o dată pe săptămână timp de 4 săptămâni.

Siguranța și eficacitatea Rixathon la copii și adolescenți (cu vârsta ≥ 2 până la < 18 ani) nu au fost stabilite în alte indicații decât GPA sau MPA activă, severă.

Rixathon nu trebuie administrat pacienților cu GPA sau MPA activă, severă, cu vârste mai mici de 2 ani, întrucât există posibilitatea unui răspuns imun inadecvat la vaccinurile destinate prevenirii bolilor obișnuite ale copilăriei care pot fi prevenite prin vaccinare (de exemplu, rujeolă, oreion, rubeolă și poliomielită) (vezi pct. 5.1).

#### Pacienți vârstnici

Nu este necesară vreo ajustare a dozei la pacienții vârstnici (vârsta > 65 ani).



## Mod de administrare

Rixathon este destinat administrării intravenoase. Soluția preparată de Rixathon trebuie administrată sub formă de perfuzie intravenoasă pe o linie venoasă specifică. Nu trebuie administrată intravenos rapid sau în bolus.

Pacienții vor fi monitorizați cu atenție pentru a se depista instalarea sindromului de eliberare de citokine (vezi pct. 4.4). În cazul pacienților care prezintă manifestări ale unor reacții severe, în special dispnee severă, bronhospasm sau hipoxie, perfuzia trebuie întreruptă imediat. Pacienții cu LNH trebuie apoi evaluați pentru depistarea dovezilor de sindrom de liză tumorală, incluzând teste de laborator adecvate și radiografia toracică pentru a se verifica existența unei infiltrații pulmonare. În cazul tuturor pacienților, perfuzia nu va fi reluată până la remisiunea completă a tuturor simptomelor și normalizarea valorilor testelor de laborator și rezultatelor radiografiei. În această etapă, perfuzia poate fi reluată cu cel mult jumătate din viteza anterioară. În cazul în care se manifestă aceleași reacții adverse grave, se va lua în considerare întreruperea tratamentului, pe baza evaluării individuale.

Reacțiile ușoare și moderate la perfuzie (IRR) (pct. 4.8) răspund, în general, la reducerea vitezei de perfuzie. Viteza de perfuzare poate fi crescută după ameliorarea simptomelor.

### Prima perfuzie

Viteza de perfuzie inițială recomandată este de 50 mg/oră; după primele 30 minute, aceasta poate fi crescută treptat cu câte 50 mg/oră, la intervale de 30 minute, până la maximum 400 mg/oră.

### Perfuziile ulterioare

#### *Toate indicațiile*

Dozele ulterioare de Rixathon pot fi perfuzate inițial cu o viteză de 100 mg/oră și crescute apoi cu câte 100 mg/oră, la intervale de 30 minute, până la maximum 400 mg/oră.

#### *Pacienții copii și adolescenți – limfom non-Hodgkin*

##### Prima perfuzie

Viteza de perfuzie inițială recomandată este de 0,5 mg/kg/oră (maximum 50 mg/oră); aceasta poate fi crescută treptat cu câte 0,5 mg/kg/oră, la intervale de 30 minute, dacă nu apar reacții de hipersensibilitate sau reacții asociate perfuziei, până la maximum 400 mg/oră.

##### Perfuziile ulterioare

Dozele ulterioare de Rixathon pot fi perfuzate inițial cu o viteză de 1 mg/kg/oră (maximum 50 mg/oră); aceasta poate fi crescută treptat cu câte 1 mg/kg/oră la intervale de 30 minute până la maximum 400 mg/h.

#### *Pacienții adulți – doar limfom non-Hodgkin (LNH) și leucemie limfocitară cronică (LLC)*

Dacă pacienții nu au prezentat un eveniment advers de grad 3 sau 4 legat de perfuzie în timpul ciclului 1, în ciclul 2 se poate administra o perfuzie de 90 minute în asociere cu o schemă de chimioterapie care conține corticosteroizi. Începeți cu o viteză de 20% din doza totală administrată în primele 30 minute și restul de 80% din doza totală în următoarele 60 minute. Dacă perfuzia de 90 minute este tolerată în ciclul 2, se poate utiliza aceeași viteză la administrarea restului dozelor din schema de tratament (până la ciclul 6 sau 8).

Pacienților care suferă de boli cardiovasculare semnificative din punct de vedere clinic, inclusiv aritmii sau care au avut IRR-uri anterioare grave la orice terapie biologică prealabilă sau la rituximab, nu trebuie să li se administreze perfuzia mai rapidă.

## *Doar poliartrită reumatoidă*

Schemă de perfuzare alternativă, ulterioară, mai rapidă:

Dacă pacienții nu au avut o reacție gravă legată de perfuzie cu prima perfuzie sau următoarele perfuzii la o doză de 1000 mg Rixathon administrate conform schemei standard de perfuzare, poate fi administrată o perfuzie mai rapidă pentru a doua perfuzie sau următoarele perfuzii folosind aceeași concentrație ca în perfuziile anterioare (4 mg/ml la un volum de 250 ml). Începeți cu o rată de 250 mg/oră în primele 30 minute și apoi 600 mg/oră în următoarele 90 minute. Dacă este tolerată o perfuzare mai rapidă, această schemă de perfuzare poate fi utilizată la administrarea perfuziilor ulterioare.

Pacienților care suferă de boli cardiovasculare semnificative din punct de vedere clinic, inclusiv aritmii sau care au avut IRR-uri anterioare grave la orice terapie biologică prealabilă sau la rituximab, nu trebuie să li se administreze perfuzia mai rapidă.

### **4.3 Contraindicații**

#### Contraindicații pentru utilizarea în limfomul non-Hodgkin (LNH) și leucemia limfocitară cronică (LLC)

Hipersensibilitate la substanța activă, la proteinele murine sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

Infecții severe, active (vezi pct. 4.4).

Pacienți cu statusul imunitar sever afectat.

#### Contraindicații pentru utilizarea în poliartrita reumatoidă, granulomatoza cu poliangeită (GPA), poliangeita microscopică (MPA) și pemfigus vulgar (PV)

Hipersensibilitate la substanța activă sau la proteinele murine sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

Infecții severe, active (vezi pct. 4.4).

Pacienți cu statusul imunitar sever afectat.

Insuficiență cardiacă severă (clasa IV New York Heart Association) sau boală cardiacă necontrolată, severă (vezi pct. 4.4 pentru informații privind alte boli cardiovasculare).

### **4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare**

#### Trasabilitate

Pentru a avea sub control trasabilitatea medicamentelor biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție.

#### Leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP)

Toți pacienții tratați cu Rixathon pentru poliartrită reumatoidă, GPA, MPA sau PV trebuie să primească un card de atenționare a pacientului la fiecare perfuzie. Cardul de atenționare conține informații importante de siguranță pentru pacienți privind riscul potențial crescut de infecții, LMP.

Au fost raportate cazuri foarte rare de LMP letală ca urmare a utilizării rituximabului. Pacienții trebuie să fie monitorizați la intervale regulate pentru orice simptom neurologic nou sau agravat sau semne care pot fi sugestive pentru LMP. Dacă este suspectată o LMP, doza ulterioară nu trebuie administrată

până când LMP este exclusă. Medicul trebuie să evalueze pacientul pentru a determina dacă simptomele sunt sugestive pentru disfuncția neurologică și dacă sunt, trebuie văzut dacă aceste simptome sunt posibil sugestive pentru LMP. Efectuarea unui consult de către un neurolog trebuie considerată ca fiind indicată clinic.

Dacă există orice îndoială, trebuie luate în considerare noi evaluări, inclusiv investigare RMN preferabil cu contrast, testarea lichidului cefalorahidian (LCR) pentru ADN-ul virusului JC și evaluări neurologice repetate.

Medicul trebuie să fie atent în special la simptomele sugestive pentru LMP pe care pacientul ar putea să nu le observe (de exemplu simptome cognitive, neurologice sau psihice). Pacienții trebuie, de asemenea, sfătuiți să își informeze despre tratamentul lor partenerii sau persoanele care îi îngrijesc, întrucât aceștia pot observa simptome de care pacientul nu este conștient.

Dacă un pacient manifestă LMP, tratamentul cu Rixathon trebuie întrerupt permanent.

După reechilibrarea imunitară la pacienții imunocompromiși cu LMP, a fost observată o stabilizare sau îmbunătățirea stării pacienților. Rămâne necunoscut dacă descoperirea precoce a LMP sau suspendarea terapiei de rituximab poate duce la stabilizare similară sau rezultat îmbunătățit.

### Limfom non-Hodgkin (LNH) și leucemie limfocitară cronică (LLC)

#### Reacții legate de perfuzie (IRR)

Tratamentul cu rituximab este asociat cu apariția de reacții legate de administrare/perfuzie care pot fi legate de eliberarea de citokine și/sau alți mediatori chimici. Este posibil ca sindromul de eliberare de citokine să nu poată fi deosebit din punct de vedere clinic de reacțiile de hipersensibilitate acută.

Acest grup de reacții care include sindromul de eliberare de citokine, sindromul de liză tumorală și reacții anafilactice și de hipersensibilitate, este descris mai jos.

În perioada ulterioară punerii pe piață a formei farmaceutice cu administrare intravenoasă a rituximabului, au fost raportate reacții severe legate de perfuzie cu evoluție letală, cu un interval de debut variind de la 30 minute la 2 ore de la începerea primei perfuzii de rituximab administrat intravenos. Ele au fost caracterizate de evenimente pulmonare și în unele cazuri, au inclus liză tumorală rapidă și caracteristici ale sindromului de liză tumorală, la care se adaugă febră, frisoane, rigiditate, hipotensiune arterială, urticarie, angioedem și alte simptome (vezi pct. 4.8).

Sindromul sever de eliberare de citokine se caracterizează prin dispnee marcată, adesea însoțită de bronhospasm și hipoxie la care se adaugă febră, frisoane, rigiditate, urticarie și angioedem. Acest sindrom poate fi asociat cu unele caracteristici ale sindromului de liză tumorală ca de exemplu hiperuricemie, hiperkaliemie, hipocalcemie, hiperfosfatemie, insuficiență renală acută, creșterea lactat dehidrogenazei (LDH) și poate fi asociat cu insuficiență respiratorie acută și deces. Insuficiența respiratorie acută poate fi însoțită de evenimente precum infiltrația interstițială pulmonară sau edem, vizibile la radiografia toracică. Acest sindrom se manifestă adesea în interval de una sau două ore de la începerea primei perfuzii. Pacienții cu insuficiență respiratorie în antecedente sau cei cu infiltrație tumorală pulmonară pot prezenta un risc crescut și trebuie tratați cu o atenție deosebită. În cazul pacienților care dezvoltă un sindrom sever de eliberare de citokine, se va întrerupe imediat perfuzia (vezi pct. 4.2) și se va administra un tratament simptomatic intensiv. Dat fiind faptul că ameliorarea inițială a simptomelor clinice poate fi urmată de o deteriorare, pacienții trebuie atent monitorizați până când sindromul de liză tumorală și infiltrarea pulmonară se vor stabiliza sau vor dispărea. Tratamentul ulterior al pacienților după remisiunea completă a semnelor și simptomelor a avut rareori ca rezultat repetarea sindromului sever de eliberare de citokine.

Pacienții cu o încărcătură tumorală mare sau cu un număr mare de celule maligne circulante ( $\geq 25 \times 10^9/l$ ), cum sunt pacienții cu LLC, care în mod special prezintă un risc mai mare de manifestare a unui sindrom sever de eliberare de citokine, trebuie să fie tratați cu maximă prudență.

Acești pacienți trebuie să fie monitorizați foarte atent pe tot parcursul primei perfuzii. La acești pacienți se va avea în vedere utilizarea unei viteze reduse de perfuzare la prima administrare sau o împărțire a dozei pe durata a două zile în timpul primului ciclu și pentru orice cicluri ulterioare dacă numărul de limfocite este încă  $> 25 \times 10^9/l$ .

La 77% dintre pacienții tratați cu rituximab au fost observate reacții adverse legate de administrarea perfuziei de toate tipurile (inclusiv sindromul de eliberare de citokine însoțit de hipotensiune arterială și bronhospasm la 10% dintre pacienți) vezi pct. 4.8. Aceste simptome sunt în general reversibile ca urmare a întreruperii perfuziei cu rituximab și administrării unui antipiretic, a unui antihistaminic și ocazional, a oxigenului, a unei soluții saline administrate intravenos sau a unor bronhodilatatoare și glucocorticoizi, dacă este necesar. Pentru reacțiile severe se vor consulta datele de mai sus referitoare la sindromul de eliberare de citokine.

Au fost raportate reacții anafilactice și alte reacții de hipersensibilitate, ca urmare a administrării intravenoase de proteine. Spre deosebire de sindromul de eliberare de citokine, reacțiile de hipersensibilitate apar, de obicei, la câteva minute de la debutul perfuziei. Medicația pentru tratamentul reacțiilor de hipersensibilitate, de exemplu, epinefrină (adrenalină), antihistaminice și glucocorticoizi, trebuie să se afle la îndemâna medicului pentru a fi utilizată imediat în cazul apariției unei reacții alergice în timpul administrării rituximabului. Manifestările clinice ale anafilaxiei pot fi similare celor ale sindromului de eliberare de citokine (descrie mai sus). Reacțiile atribuite hipersensibilității au fost constatate mai rar decât cele atribuite eliberării de citokine.

Reacții suplimentare raportate în unele cazuri au fost infarct miocardic, fibrilație atrială, edem pulmonar și trombocitopenie acută reversibilă.

Întrucât în decursul administrării rituximabului poate să apară hipotensiune arterială, se va avea în vedere întreruperea tratamentului cu antihipertensive cu 12 ore înainte de începerea administrării medicamentului.

#### Tulburări cardiace

La pacienții tratați cu rituximab au fost semnalate episoade de angină pectorală, aritmii cardiace cum sunt flutterul atrial și fibrilația atrială, insuficiență cardiacă și/sau infarct miocardic. De aceea, pacienții cu antecedente de boli cardiace și/sau chimioterapie cardiotoxică trebuie atent monitorizați.

#### Toxicitate hematologică

Deși rituximabul în monoterapie nu are potențial mielosupresiv, se va acorda o atenție deosebită atunci când se preconizează administrarea tratamentului unor pacienți la care numărul neutrofilelor este  $< 1,5 \times 10^9/l$  și/sau numărul trombocitelor este  $< 75 \times 10^9/l$ , întrucât experiența clinică referitoare la această categorie de pacienți este limitată. Rituximab a fost utilizat pentru tratamentul a 21 pacienți care au fost supuși transplantului autolog de măduvă osoasă și la alte grupuri de risc cu funcție medulară presupus redusă, fără a se constata mielotoxicitate.

În timpul terapiei cu Rixathon trebuie să se monitorizeze regulat hemograma completă, inclusiv verificarea numărului neutrofilelor și trombocitelor.

#### Infecții

În timpul tratamentului cu rituximab se pot produce infecții serioase, inclusiv letale (vezi pct. 4.8). Rixathon nu trebuie administrat la pacienții cu o infecție activă, severă (de exemplu tuberculoză, sepsis și infecții oportuniste, vezi pct. 4.3).

Medicii trebuie să fie precauți la inițierea tratamentului cu Rixathon la pacienții cu antecedente de infecții cronice sau recurente sau cu afecțiuni asociate care pot predispuce ulterior pacienții la infecții grave (vezi pct. 4.8).

La subiecții aflați în tratament cu rituximab, s-au raportat cazuri de reactivare a hepatitei B, inclusiv hepatită fulminantă finalizată cu deces. Totodată, majoritatea subiecților erau expuși și la chimioterapie citotoxică. Informații limitate provenite dintr-un studiu clinic efectuat la pacienți cu LLC refractară/cu recăderi sugerează că tratamentul cu rituximab poate avea drept efect și înrăutățirea rezultatului infecțiilor primare cu virusul hepatitei B. Înainte de inițierea tratamentului cu medicamentul Rixathon, toți pacienții trebuie supuși testelor de depistare a virusului *hepatitei B* (VHB), dintre care cel puțin statusul AgHBs și statusul Ac anti-HBc. Acestea se pot completa cu teste corespunzătoare altor markeri conform ghidurilor locale. Pacienții cu forma activă a hepatitei B nu trebuie tratați cu medicamentul Rixathon. Pacienții la care s-a depistat serologie pozitivă a hepatitei B (AgHBs sau Ac anti-HBc) trebuie consultați de către specialiști în boli hepatice înainte de a începe tratamentul și trebuie să fie monitorizați și controlați conform standardelor medicale locale pentru a preveni reactivarea hepatitei B.

Au fost raportate cazuri foarte rare de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) în timpul utilizării după punerea pe piață a rituximabului în LNH și LLC (vezi pct. 4.8). Majoritatea pacienților au primit rituximab în asociere cu chimioterapie sau ca parte a unui transplant hematopoietic de celule stem.

În timpul utilizării după punerea pe piață a rituximab au fost raportate cazuri de meningoencefalită enterovirală, inclusiv letale.

Rezultate fals-negative la testarea serologică a infecțiilor

Din cauza riscului de rezultate fals negative la testarea serologică a infecțiilor trebuie luate în considerare instrumente de diagnosticare alternative în cazul pacienților care prezintă simptome ce indică boli infecțioase rare, de exemplu, virusul West Nile și neuroborelioza.

#### Imunizări

Siguranța imunizării cu vaccinuri virale vii atenuate după tratamentul cu rituximab nu a fost studiată pentru pacienții cu LNH și LLC, de aceea vaccinurile virale vii nu sunt recomandate. Pacienții tratați cu Rixathon pot primi vaccinuri inactivate; totuși, cu vaccinurile inactivate, ratele de răspuns pot fi scăzute. Într-un studiu nerandomizat, pacienții adulți cu LNH cu grad scăzut cu recădere care au primit rituximab în monoterapie când au fost comparați cu grupurile de control cu voluntari sănătoși netratați, au avut o rată de răspuns mai scăzută la vaccinarea rapel antitetanic (16% vs. 81%) și la neoantigenul *Keyhole Limpet Haemocyanin* (KLH) (4% vs. 76% la o determinare de > 2 ori mai mare a titrului de anticorpi). Pentru pacienții cu LLC sunt presupuse rezultate similare luând în considerare asemănările dintre cele două afecțiuni, dar aceasta nu a fost investigată în studii clinice.

Media titrurilor de anticorpi împotriva unui grup de antigene (*Streptococcus pneumoniae*, virus gripal A, parotidită epidemică, rubeolă, varicelă) înainte de tratament s-a menținut pentru o perioadă de cel puțin 6 luni după tratamentul cu rituximab.

#### Afecțiuni cutanate

Au fost raportate afecțiuni cutanate severe, cum sunt necroliza epidermică toxică (sindromul Lyell) și sindromul Stevens-Johnson, unele cu evoluție letală (vezi pct. 4.8). În cazul în care apare un astfel de eveniment, suspectat a fi asociat cu administrarea rituximabului, tratamentul trebuie întrerupt permanent.

#### Copii și adolescenți

Sunt disponibile numai date limitate pentru pacienții cu vârsta sub 3 ani. Pentru informații suplimentare vezi pct. 5.1.

Poliartrită reumatoidă, granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA) și pemfigus vulgar (PV)

#### Populația cu poliartrită reumatoidă care nu a fost tratată cu metotrexat (MTX)

La pacienții care nu au fost tratați cu MTX nu este recomandată administrarea de rituximab deoarece nu a fost stabilită o relație beneficiu-risc favorabilă.

#### Reacții legate de perfuzie (IRR)

Tratamentul cu rituximab este asociat cu IRR, ce pot fi asociate cu eliberarea de citokine și/sau alți mediatori chimici.

După punerea pe piață a medicamentului au fost raportate la pacienți cu poliartrită reumatoidă, IRR severe, finalizate cu deces. În poliartrita reumatoidă, majoritatea evenimentelor legate de perfuzie raportate în studiile clinice au fost de severitate ușoară până la moderată. Cele mai frecvente simptome au fost reacțiile alergice cum ar fi cefalee, prurit, iritație faringiană, hiperemie facială, erupție cutanată, urticarie, hipertensiune și pirexie. În general, proporția pacienților care au prezentat orice reacție determinată de perfuzie a fost mai mare după prima perfuzie decât după următoarea perfuzie a oricărei serii de tratament. Incidența IRR a scăzut cu următoarele serii de tratament (vezi pct. 4.8). Reacțiile raportate au fost, de obicei, reversibile la reducerea vitezei de perfuzare sau a întreruperii perfuziei de rituximab și administrarea unui antipiretic, a unui antihistaminic și ocazional, a oxigenului, a unei soluții injectabile de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) administrată intravenos sau a unor bronhodilatatoare și glucocorticoizi, dacă este necesar. Pacienții cu afecțiuni cardiace preexistente și cei care au prezentat anterior reacții adverse cardiopulmonare trebuie atent monitorizați. În funcție de severitatea IRR și de măsurile ce trebuie luate, tratamentul cu Rixathon trebuie întrerupt temporar sau permanent. În cele mai multe cazuri, perfuzia poate fi reluată cu o viteză redusă cu 50% (de exemplu, de la 100 mg/oră la 50 mg/oră), după remiterea completă a simptomelor.

Medicația pentru tratamentul reacțiilor de hipersensibilitate, de exemplu, epinefrină (adrenalină), antihistaminice și glucocorticoizi, trebuie să fie la îndemâna medicului pentru a fi utilizată imediat în cazul unor asemenea manifestări, în timpul administrării Rixathon.

Nu sunt disponibile date privind siguranța administrării rituximabului la pacienții cu insuficiență cardiacă moderată (NYHA, clasa III) sau boală cardiovasculară necontrolată, severă. La pacienții tratați cu rituximab s-a observat că afecțiunile cardiace ischemice preexistente devin simptomatice, cum ar fi angina pectorală și, de asemenea, s-au observat fibrilație atrială și flutter. Ca urmare, la pacienții cu antecedente cardiace cunoscute și la cei care au prezentat anterior reacții adverse cardiopulmonare, riscul complicațiilor cardiovasculare ca urmare a reacțiilor legate de perfuzie trebuie luat în considerare înaintea inițierii tratamentului cu Rixathon și pacienții trebuie monitorizați cu atenție în timpul administrării. Deoarece hipotensiunea poate apărea în timpul perfuziei cu rituximab, trebuie luată în considerare întreruperea medicației antihipertensive cu 12 ore înaintea perfuziei cu Rixathon.

IRR la pacienții cu GPA, MPA și PV au fost în concordanță cu cele observate în studiile clinice și după punerea pe piață a medicamentului, la pacienții cu poliartrită reumatoidă (vezi pct. 4.8).

#### Tulburări cardiace

La pacienții tratați cu rituximab au fost semnalate episoade de angină pectorală, aritmii cardiace cum sunt flutterul atrial și fibrilația atrială, insuficiență cardiacă și/sau infarct miocardic. De aceea, pacienții cu antecedente de boli cardiace trebuie atent monitorizați (vezi Reacții legate de perfuzie, de mai sus).

## Infecții

Pe baza mecanismului de acțiune al rituximabului și cunoscând faptul că celulele B joacă un rol important în menținerea unui răspuns imun normal, pacienții prezintă un risc crescut de infecții după tratamentul cu rituximab (vezi pct. 5.1). În timpul tratamentului cu rituximab pot apărea infecții grave, inclusiv letale (vezi pct. 4.8). Rixathon nu se administrează la pacienții cu infecții severe, active (de exemplu tuberculoză, infecții oportuniste și sepsis, vezi pct. 4.3) sau la pacienții sever imunocompromiși (de exemplu, în cazurile în care valorile CD4 sau CD8 sunt foarte scăzute). Medicii trebuie să fie precauți la inițierea tratamentului cu rituximab la pacienții cu antecedente de infecții cronice sau recurente sau cu afecțiuni asociate care pot predispute ulterior pacienții la infecții grave, de exemplu, hipogamaglobulinemia (vezi pct. 4.8). Se recomandă determinarea valorilor imunoglobulinelor înaintea inițierii tratamentului cu Rixathon.

Pacienții care raportează semne și simptome de infecție după terapia cu Rixathon trebuie evaluați cu promptitudine și tratați corespunzător. Înaintea administrării unei cure ulterioare de Rixathon, pacienții trebuie reevaluați pentru identificarea oricărui risc potențial de infecții.

Au fost raportate cazuri foarte rare de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) letală ca urmare a utilizării rituximabului pentru tratamentul poliartritei reumatoide și afecțiunilor autoimune, incluzând lupusul eritematos sistemic (LES) și vasculita.

În timpul utilizării după punerea pe piață a rituximab au fost raportate cazuri de meningoencefalită enterovirală, inclusiv letale.

Rezultate fals-negative la testarea serologică a infecțiilor

Din cauza riscului de rezultate fals negative la testarea serologică a infecțiilor trebuie luate în considerare instrumente de diagnosticare alternative în cazul pacienților care prezintă simptome ce indică boli infecțioase rare, de exemplu, virusul West Nile și neuroborelioza.

## Infecții cu hepatita B

La pacienții cu poliartrită reumatoidă, GPA și MPA cărora li se administrează rituximab au fost raportate cazuri de reactivare a hepatitei B, incluzând cazuri cu rezultat letal.

Înainte de inițierea tratamentului cu medicamentul Rixathon, toți pacienții trebuie supuși testelor de depistare a *virusului hepatitei B* (VHB), dintre care cel puțin statusul AgHBs și statusul Ac anti-HBc. Acestea se pot completa cu teste corespunzătoare altor markeri conform ghidurilor locale. Pacienții cu forma activă a hepatitei B nu trebuie tratați cu rituximab. Pacienții la care s-a depistat serologie pozitivă a hepatitei B (AgHBs sau Ac anti-HBc) trebuie consultați de către specialiști în boli hepatice înainte de a începe tratamentul și trebuie să fie monitorizați și controlați conform standardelor medicale locale pentru a preveni reactivarea hepatitei B.

## Neutropenie cu debut întârziat

Înainte fiecărei serii de tratament cu Rixathon, în mod regulat până la 6 luni după întreruperea tratamentului și la apariția semnelor sau simptomelor de infecție, trebuie măsurate valorile neutrofilelor din sânge (vezi pct. 4.8).

## Afecțiuni cutanate

Au fost raportate afecțiuni cutanate severe, cum sunt necroliza epidermică toxică (sindromul Lyell) și sindromul Stevens-Johnson, unele cu evoluție letală (vezi pct. 4.8). În cazul în care apare un astfel de eveniment, suspectat a fi asociat cu administrarea Rixathon, tratamentul trebuie întrerupt permanent.

## Imunizare

Înainte de tratamentul cu Rixathon, medicii trebuie să reevalueze statusul vaccinării pacienților și pacienții trebuie să fie aduși la zi, dacă este posibil, cu toate imunizările care sunt în acord cu ghidurile curente de imunizare. Vaccinarea trebuie încheiată cu cel puțin 4 săptămâni înainte de prima administrare de Rixathon.

Siguranța imunizării cu vaccinuri virale vii atenuate după tratamentul cu rituximab nu a fost studiată. De aceea, vaccinarea cu vaccinuri virale vii atenuate nu este recomandată în timpul terapiei cu Rixathon sau în timpul depleției de celule B periferice.

Pacienții tratați cu Rixathon pot primi vaccinuri inactivate; totuși, ratele de răspuns cu vaccinuri inactivate pot fi scăzute. Într-un studiu clinic randomizat, pacienții cu poliartrită reumatoidă tratați cu rituximab și metotrexat au avut rate de răspuns comparabile la rapelul antitetanic (39% vs. 42%), rate scăzute la vaccinul pneumococic polizaharidic (43% vs. 82% la cel puțin 2 serotipuri de anticorpi pneumococici) și neoantigenul KLH (47% vs. 93%), administrate la 6 luni după tratamentul cu rituximab, comparativ cu pacienții care au primit numai metotrexat. Dacă sunt necesare vaccinuri inactivate în timpul terapiei cu rituximab, acestea trebuie finalizate cu cel puțin 4 săptămâni înainte de începerea următoarei cure de rituximab.

În experiența globală de tratament repetat cu rituximab pe durata unui an în poliartrita reumatoidă, proporțiile de pacienți cu titruri pozitive de anticorpi împotriva *S. pneumoniae*, gripei, rubeolei, varicelei și tetanosului toxoid au fost în general similare cu proporțiile la momentul inițial.

## Utilizarea concomitentă/secvențială a altor DMARD în poliartrita reumatoidă

Utilizarea concomitentă de Rixathon și medicații antireumatice, altele decât cele specificate în indicațiile și dozele pentru poliartrita reumatoidă, nu este recomandată.

Nu există date suficiente din studiile clinice pentru o evaluare completă a siguranței utilizării secvențiale a altor DMARD (inclusiv inhibitori TNF) după terapia cu rituximab (vezi pct. 4.5). Datele disponibile indică faptul că rata infecțiilor relevante clinic este neschimbată când aceste terapii sunt utilizate la pacienții tratați anterior cu rituximab, totuși pacienții trebuie monitorizați cu atenție pentru identificarea semnelor de infecție, dacă se administrează agenți biologici și/sau DMARD după terapia cu rituximab.

## Malignitate

Imunomodulatorii pot crește riscul de malignitate. Cu toate acestea, datele disponibile nu sugerează un risc crescut de malignitate pentru rituximab, utilizat în indicațiile afecțiunilor autoimune dincolo de cel asociat deja cu afecțiunea autoimună asociată.

## Excipienți

Acest medicament conține 2,3 mmoli (sau 52,6 mg) sodiu pe flacon de 10 ml și 11,5 mmoli (sau 263,2 mg) sodiu pe flacon de 50 ml echivalent cu 2,6% (pentru flaconul de 10 ml) și 13,2% (pentru flaconul de 50 ml) din doza maximă zilnică recomandată de OMS de 2 g sodiu pentru un adult.

## **4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune**

În prezent, există date limitate referitoare la posibile interacțiuni medicamentoase.

La pacienții cu LLC, administrarea concomitentă cu rituximab nu pare a avea efect asupra farmacocineticii fludarabinei sau ciclofosfamidei. În plus, nu a existat niciun efect aparent al fludarabinei și ciclofosfamidei asupra farmacocineticii rituximabului.



Administrarea concomitentă cu metotrexat nu are efect asupra farmacocineticii rituximabului la pacienții cu poliartrită reumatoidă.

Pacienții cu titruri de anticorpi umani anti-șoarece (HAMA) sau anticorpi anti-medicament (ADA) pot dezvolta reacții alergice sau de hipersensibilitate atunci când li se administrează alți anticorpi monoclonali pentru diagnostic sau tratament.

La pacienții cu poliartrită reumatoidă, 283 pacienți au primit ulterior terapie cu un DMARD biologic după terapia cu rituximab. La acești pacienți rata infecțiilor clinic relevante în timpul terapiei cu rituximab a fost de 6,01 din 100 pacienți pe an, comparativ cu 4,97 din 100 pacienți pe an după terapia cu un DMARD biologic.

#### **4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea**

##### Contracepția la bărbați și femei

Datorită timpului mare de retenție a rituximab la pacienții cu depleție a celulelor B, femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficiente în timpul tratamentului și timp de 12 luni după tratamentul cu Rixathon.

##### Sarcina

Este cunoscut faptul că imunoglobulinele IgG traversează bariera fetoplacentară.

Numărul de celule B la nou-născuții umani, după expunerea maternă la rituximab, nu a fost analizat în studiile clinice. Deși nu există date adecvate și bine controlate din studii la femei gravide, totuși, au fost raportate depleția tranzitorie a celulelor B și limfocitopenie la unii sugari ai căror mame au fost expuse la rituximab în timpul sarcinii. Efecte similare au fost observate în studiile la animale (vezi pct. 5.3). Din aceste motive, Rixathon nu trebuie administrat femeilor gravide decât dacă beneficiile posibile justifică riscul potențial.

##### Alăptarea

Datele limitate privind excreția rituximabului în laptele matern sugerează concentrații foarte scăzute de rituximab în lapte (doza relativă la sugar mai mică de 0,4%). Puține cazuri de monitorizare a sugarilor alăptați descriu creșterea și dezvoltarea normală până la 2 ani. Cu toate acestea, deoarece aceste date sunt limitate și rezultatele pe termen lung ale sugarilor alăptați rămân necunoscute, alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului cu rituximab și în mod optim timp de 6 luni după încheierea tratamentului cu rituximab.

##### Fertilitatea

Studiile la animale nu au relevat efecte negative ale rituximab asupra organelor de reproducere.

#### **4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje**

Nu s-au efectuat studii privind efectele rituximabului asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje, deși activitatea farmacologică și reacțiile adverse constatate până în prezent sugerează faptul că rituximabul nu ar avea vreo influență sau ar avea o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## 4.8 Reacții adverse

Experiența din limfomul non-Hodgkin și leucemia limfocitară cronică (LLC), la pacienții adulți

### Rezumatul profilului de siguranță

Profilul general de siguranță pentru rituximab în limfomul non-Hodgkin și LLC se bazează pe datele pacienților din studiile clinice și din experiența de după punerea pe piață. Acești pacienți au fost tratați fie cu rituximab în monoterapie (ca terapie de inducție sau terapie de întreținere după terapia de inducție) sau în asocieri cu chimioterapie.

Cele mai frecvente reacții adverse (RA) observate la pacienții tratați cu rituximab au fost IRR care au apărut la majoritatea pacienților în timpul primei perfuzii. Incidența simptomelor legate de perfuzie scade substanțial cu perfuziile ulterioare și este mai mică de 1% după opt doze de rituximab.

În timpul studiilor clinice, evenimentele infecțioase (predominant bacteriene și virale) au apărut la aproximativ 30-55% dintre pacienții cu LNH și la 30-50% dintre pacienți cu LLC.

Cele mai frecvent raportate sau observate reacții adverse grave au fost:

- IRR (incluzând sindromul de eliberare de citokine, sindromul de liză tumorală), vezi pct. 4.4.
- Infecțiile, vezi pct. 4.4.
- Evenimentele cardiovasculare, vezi pct. 4.4.

Alte RA grave raportate au inclus reactivarea hepatitei B și LMP (vezi pct. 4.4).

### Lista tabelară a reacțiilor adverse

Frecvențele RA raportate la rituximab în monoterapie sau în asocieri cu chimioterapie sunt listate în Tabelul 3. Frecvențele sunt definite ca foarte frecvente ( $\geq 1/10$ ), frecvente ( $\geq 1/100$  și  $< 1/10$ ), mai puțin frecvente ( $\geq 1/1000$  și  $< 1/100$ ), rare ( $\geq 1/10000$  și  $< 1/1000$ ) și foarte rare ( $< 1/10000$ ) și cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul oricărui grup de frecvență reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

RA identificate numai în timpul perioadei ulterioare punerii pe piață și pentru care frecvența nu a putut fi estimată sunt enumerate sub „cu frecvență necunoscută”.

**Tabel 3 RA raportate în studiile clinice sau în timpul perioadei ulterioare punerii pe piață la pacienții cu LNH și LLC tratați cu rituximab în monoterapie/întreținere sau în asociere cu chimioterapie**

Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe	Foarte frecvente	Frecvente	Mai puțin frecvente	Rare	Foarte rare	Frecvență necunoscută
<b>Infecții și infestări</b>	infecții bacteriene, infecții virale, +bronșite	sepsis, +pneumonie, +infecție febrilă, +herpes zoster, +infecții ale tractului respirator, infecții fungice, infecții de etiologie necunoscută, +bronșite acute, +sinuzite, hepatită B <sup>1</sup>		infecții virale grave <sup>2</sup> <i>Pneumocystis jirovecii</i>	LMP	meningoencefalită enterovirală <sup>2,3</sup>
<b>Tulburări hematologice și limfatice</b>	neutropenie, leucopenie, +neutropenie febrilă, +trombocitopenie	anemie, +pancitopenie, +granulocitopenie	tulburări de coagulare, anemie aplastică, anemie hemolitică, limfadenopatie		creșterea tranzitorie a valorilor serice de IgM <sup>4</sup>	neutropenie tardivă <sup>4</sup>
<b>Tulburări ale sistemului imunitar</b>	reații legate de perfuziei <sup>5</sup> , angioedem	hipersensibilitate		anafilaxie	sindrom de liză tumorală, sindrom de eliberare de citokine <sup>5</sup> , boala serului	trombocitopenie reversibilă acută legată de perfuzie <sup>5</sup>
<b>Tulburări metabolice și de nutriție</b>		hiperglicemie, scădere în greutate, edem periferic, edem facial, creșterea valorilor LDH, hipocalcemie				
<b>Tulburări psihice</b>			depresie, nervozitate			
<b>Tulburări ale sistemului nervos</b>		parestezie, hipoestezie, agitație, insomnie, vasodilatație, amețeli, anxietate	disgeuzie		neuropatie periferică, paralizia nervului facial <sup>6</sup>	neuropatie cerebrală, pierderea altor simțuri <sup>6</sup>
<b>Tulburări oculare</b>		tulburări de lacrimație, conjunctivită			pierdere severă a vederii <sup>6</sup>	
<b>Tulburări acustice și vestibulare</b>		tinitus, otalgie				pierderea auzului <sup>6</sup>

<b>Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe</b>	<b>Foarte frecvente</b>	<b>Frecvente</b>	<b>Mai puțin frecvente</b>	<b>Rare</b>	<b>Foarte rare</b>	<b>Frecvență necunoscută</b>
<b>Tulburări cardiace</b>		+infarct miocardic <sup>5, 7</sup> , aritmie, +fibrilație atrială, tahicardie, +tulburări cardiace	+insuficiență ventriculară stângă, +tahicardie supraventriculară, +tahicardie ventriculară, +angină pectorală, +ischemie miocardică, bradicardie	tulburări cardiace grave <sup>5, 7</sup>	insuficiență cardiacă <sup>5, 7</sup>	
<b>Tulburări vasculare</b>		hipertensiune arterială, hipotensiune arterială ortostatică, hipotensiune arterială			vasculită (predominant cutanată), vasculită leucocitoclastică	
<b>Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale</b>		bronhospasm <sup>5</sup> , tulburări respiratorii, dureri toracice, dispnee, intensificarea tusei, rinită	astm bronșic, bronșiolită obliterantă, tulburări pulmonare, hipoxie	afecțiuni pulmonară interstițială <sup>8</sup>	insuficiență respiratorie <sup>5</sup>	infiltrate pulmonare
<b>Tulburări gastro-intestinale</b>	greață	vărsături, diaree, dureri abdominale, disfagie, stomatită, constipație, dispepsie, anorexie, iritație faringiană	distensie abdominală		perforație gastro-intestinală <sup>8</sup>	
<b>Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat</b>	prurit, erupție cutanată, +alopecie	urticarie, transpirații, transpirații nocturne, +afecțiuni cutanate			afecțiuni cutanate buloase severe, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell) <sup>8</sup>	
<b>Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv</b>		hipertonie, mialgie, artralgie, dorsalgie, dureri cervicale, durere				
<b>Tulburări renale și ale căilor urinare</b>					insuficiență renală <sup>5</sup>	

Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe	Foarte frecvente	Frecvente	Mai puțin frecvente	Rare	Foarte rare	Frecvență necunoscută
<b>Tulburări generale și la nivelul locului de administrare</b>	febră, frison, astenie, cefalee	durere la nivelul tumorii, hiperemie facială, stare generală de rău, sindrom pseudo-gripal, +oboseală, +frison, +insuficiență multiplă de organe <sup>5</sup>	durere la locul de perfuzie			
<b>Investigații diagnostice</b>	scăderea valorilor IgG					

Pentru fiecare termen, calcularea frecvenței s-a bazat pe reacțiile de toate gradele (de la ușoare la severe), cu excepția termenilor marcați cu "+" pentru care calcularea frecvenței s-a bazat numai pe reacțiile severe ( $\geq$  grad 3 NCI criterii comune de toxicitate). Au fost raportate numai reacțiile cu cea mai mare frecvență din studiile clinice

<sup>1</sup> include reactivări și infecții primare; frecvența s-a bazat pe schema R-FC în LLC cu recăderi/refractară

<sup>2</sup> vezi de asemenea pct. infecții de mai jos

<sup>3</sup> observate în timpul perioadei ulterioare punerii pe piață

<sup>4</sup> vezi de asemenea pct. reacții adverse hematologice de mai jos

<sup>5</sup> vezi de asemenea pct. reacții legate de perfuzie de mai jos. Rar au fost raportate cazuri letale

<sup>6</sup> semne și simptome ale neuropatiei cerebrale apărute la momente diferite pînă la câteva luni după terminarea terapiei cu rituximab

<sup>7</sup> observate în principal la pacienții cu afecțiuni cardiace preexistente și/sau chimioterapie cardiotoxică și au fost asociate mai ales cu reacțiile legate de perfuzie

<sup>8</sup> include cazuri letale

Următorii termeni au fost raportați ca evenimente adverse în timpul studiilor clinice, totuși, au fost raportați cu o incidență similară sau mai scăzută în brațele cu rituximab comparativ cu brațele de control: hematotoxicitate, infecție neutropenică, infecția tractului urinar, tulburări senzoriale, pirexie.

Semne și simptome sugestive unei reacții legate de perfuzie au fost raportate la mai mult de 50% dintre pacienții din studiile clinice și au fost predominant observate în timpul primei perfuzii, de obicei în primele două ore. Aceste simptome au cuprins în principal febră, frisoane, rigiditate. Alte simptome au inclus hiperemie facială, angioedem, bronhospasm, vărsături, greață, urticarie/erupție cutanată, fatigabilitate, cefalee, iritație faringiană, rinită, prurit, durere, tahicardie, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, dispnee, dispepsie, astenie și aspecte ale sindromului de liză tumorală. Reacții grave legate de perfuzie (cum ar fi bronhospasm, hipotensiune arterială) au apărut la pînă la 12% dintre cazuri.

Reacții suplimentare raportate în unele cazuri au fost infarct miocardic, fibrilație atrială, edem pulmonar și trombocitopenie acută reversibilă. Agravarea afecțiunilor cardiace preexistente, ca de exemplu angina pectorală sau insuficiența cardiacă congestivă sau tulburări cardiace grave (insuficiență cardiacă, infarct miocardic, fibrilație atrială), edemul pulmonar, insuficiență multiplă de organe, sindromul de liză tumorală, sindromul de eliberare de citokine, insuficiența renală și insuficiența respiratorie au fost raportate cu frecvență mai mică sau necunoscută. Incidența simptomelor legate de perfuzie a scăzut substanțial cu perfuziile ulterioare și apare la < 1% dintre pacienți pînă la ciclul opt de terapie cu rituximab.

#### Descrierea reacțiilor adverse selectate

##### *Infecții*

Rituximab a indus scăderea numărului celulelor B la 70-80% din pacienți, dar a fost asociată cu o scădere a nivelului imunoglobulinelor serice doar la un număr mic de pacienți.

Infecții localizate cu candida și Herpes zoster au fost raportate cu o incidență mai mare în brațul care conține rituximab din studiile randomizate. Infecții grave au fost raportate la aproximativ 4% dintre pacienți tratați cu rituximab în monoterapie. Frecvențe mai mari de infecții generale, inclusiv infecții de grad 3 sau 4, au fost observate în timpul tratamentului de întreținere cu rituximab de până la 2 ani comparativ cu observația. În decursul unei perioade de tratament de 2 ani, nu s-a raportat o toxicitate cumulativă în ceea ce privește infecțiile. În plus, alte infecții virale grave, fie noi, reactivate sau agravate, dintre care unele au fost letale, au fost raportate în timpul tratamentului cu rituximab. Majoritatea pacienților au fost tratați cu rituximab în asociere cu chimioterapie sau ca parte a unui transplant hematopoietic de celule stem. Exemple de aceste infecții virale grave sunt infecțiile determinate de virusuri herpetice (*Citomegalovirus*, *Virus Varicelo-Zosterian* și *Virus Herpes Simplex*), virusul JC (leucoencefalopatia multifocală progresivă [LMP]), enterovirusul (meningoencefalita) și virusul hepatitic C (vezi pct. 4.4). În studiile clinice au fost raportate, de asemenea, cazuri de LMP letală apărută după progresia bolii și repetarea tratamentului. Au fost raportate cazuri de reactivare a hepatitei B, majoritatea acestora fiind la pacienții la care s-a administrat rituximab în asociere cu chimioterapie citotoxică. La pacienții cu LLC cu recăderi/refractoră, incidența infecției cu virus hepatic B grad 3/4 (reactivare și infecție primară) a fost de 2% pentru R-FC vs. 0% pentru FC. La pacienții expuși la rituximab cu sarcom Kaposi preexistent s-a observat progresia sarcomului Kaposi. Aceste cazuri au apărut în indicații neaprobate și majoritatea pacienților erau HIV pozitivi.

#### *Reacții adverse hematologice*

În studiile clinice cu rituximab în monoterapie administrat pentru 4 săptămâni, afectările hematologice au apărut la un număr mic de pacienți și au fost în general ușoare și reversibile. Neutropenie severă (grad 3/4) a fost raportată la 4,2% din numărul pacienților, anemie severă a fost raportată la 1,1% dintre pacienți și trombocitopenie severă a fost raportată la 1,7% dintre pacienți. În timpul terapiei de întreținere cu rituximab de până la 2 ani, leucopenia (5% vs. 2%, grad 3/4) și neutropenia (10% vs. 4%, grad 3/4) au fost raportate cu o incidență mai mare comparativ cu observația. Incidența trombocitopeniei a fost scăzută (< 1%, grad 3/4) și nu au fost diferențe între brațele de studiu. În timpul curei de tratament în studiile cu rituximab în asociere cu chimioterapie, leucopenia grad 3/4 (R-CHOP 88% vs. CHOP 79%, R-FC 23% vs. FC 12%), neutropenia (R-CVP 24% vs. CVP 14%; R-CHOP 97% vs. CHOP 88%, R-FC 30% vs. FC 19% în LLC netratată anterior), pancitopenia (R-FC 3% vs. FC 1% în LLC netratată anterior) au fost obișnuit raportate cu o frecvență mai mare comparativ cu chimioterapia singură. Totuși, incidența mai mare a neutropeniei la pacienții tratați cu rituximab și chimioterapie nu a fost asociată cu o incidență mai mare a infecțiilor și infestărilor comparativ cu pacienții tratați numai cu chimioterapie. Studiile în LLC netratată anterior și cu recăderi/refractoră au stabilit că până la 25% dintre pacienții tratați cu R-FC au prezentat neutropenie prelungită (definită ca numărul neutrofilelor care rămâne sub  $1 \times 10^9/l$  între zilele 24 și 42 după ultima doză) sau apărută cu un debut întârziat (definită ca numărul neutrofilelor sub  $1 \times 10^9/l$  la mai mult de 42 zile după ultima doză la pacienții fără antecedente de neutropenie prelungită sau care s-au recuperat înainte de ziua 42) după tratamentul cu rituximab plus FC. Nu au fost diferențe raportate pentru incidența anemiei. Au fost raportate unele cazuri de neutropenie tardivă apărută la mai mult de patru săptămâni după ultima perfuzie de rituximab. În studiile clinice de primă linie în LLC, pacienții cu stadiul C Binet au avut mai multe reacții adverse în brațul R-FC comparativ cu cei din brațul FC (R-FC 83% vs. FC 71%). În studiul clinic în LLC cu recăderi/refractoră a fost raportată trombocitopenie grad 3/4 la 11% dintre pacienți în grupul R-FC comparativ cu 9% dintre pacienți în grupul FC.

În studiile clinice cu rituximab la pacienți cu macroglobulinemie Waldenstrom s-a observat creșterea tranzitorie a nivelurilor serice ale IgM după inițierea terapiei, care a putut fi asociată cu hipervâscozitate și simptome asociate. De obicei, creșterea tranzitorie a IgM a revenit cel puțin la nivelul inițial în următoarele 4 luni.

#### *Reacții adverse cardiovasculare*

Reacțiile cardiovasculare în timpul studiilor clinice cu rituximab în monoterapie au fost raportate la 18,8% din pacienți, cele mai frecvent raportate evenimente fiind hipotensiunea arterială și

hipertensiunea arterială. Au fost raportate cazuri de aritmii grad 3 sau 4 (inclusiv tahicardie ventriculară și supraventriculară) și angină pectorală în timpul perfuziei. În timpul terapiei de întreținere, incidența tulburărilor cardiace de grad 3/4 a fost comparabilă între pacienții tratați cu rituximab și cei din observație. Evenimentele cardiace au fost raportate ca evenimente adverse grave (inclusiv fibrilație atrială, infarct miocardic, insuficiență ventriculară stângă, ischemie miocardică) la 3% dintre pacienții tratați cu rituximab comparativ cu < 1% dintre cei aflați pe observație. În studiile care au evaluat rituximab în asociere cu chimioterapie, incidența aritmiilor cardiace de grad 3 și 4, predominant aritmii supraventriculare cum ar fi tahicardia și flutter/fibrilație atrială, a fost mai mare în grupul R-CHOP (14 pacienți, 6,9%) comparativ cu grupul CHOP (3 pacienți, 1,5%). Toate aceste aritmii au apărut, fie în contextul perfuziei cu rituximab sau asociate cu condiții predispozante cum ar fi febra, infecția, infarctul miocardic acut sau afecțiuni respiratorii și cardiovasculare preexistente. Nu s-a observat o diferență între grupul R-CHOP și CHOP în incidența altor evenimente cardiace de grad 3 și 4 incluzând insuficiența cardiacă, boală miocardică și manifestări de boală arterială coronariană. În LLC, incidența globală a afecțiunilor cardiace de grad 3 sau 4 a fost mică în ambele studii clinice, cel de primă linie (4% R-FC, 3% FC) și cel din LLC cu recăderi/refractară (4% R-FC, 4% FC).

#### *Aparat respirator*

Au fost raportate cazuri de boală pulmonară interstițială, unele finalizate cu deces.

#### *Tulburări neurologice*

În timpul perioadei de tratament (faza tratamentului de inducție conținând R-CHOP pentru cel mult opt cicluri), patru pacienți (2%) din grupul R-CHOP, toți cu factori de risc cardiovascular, au prezentat accidente tromboembolice cerebrovasculare în timpul primului ciclu de tratament. Nu a fost nicio diferență între cele două grupuri de tratament privind incidența altor evenimente tromboembolice. În schimb, trei pacienți din grupul CHOP (1,5%) au prezentat evenimente cerebrovasculare care au apărut în perioada următoare tratamentului. În LLC, incidența globală a afecțiunilor sistemului nervos de grad 3 sau 4 a fost mică în ambele studii clinice, cel de primă linie (4% R-FC, 4% FC) și cel din LLC cu recăderi/refractară (3% R-FC, 3% FC).

Au fost raportate cazuri de sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă (SEPR) / sindrom de leucoencefalopatie posterioară reversibilă (SLPR). Semnele și simptomele au inclus tulburări de vedere, cefalee, convulsii și stare psihică alterată, cu sau fără hipertensiune asociată. Diagnosticul de SEPR/SLPR necesită confirmarea prin imagistică cerebrală. Cazurile raportate au dus la recunoașterea factorilor de risc pentru SEPR/SLPR, incluzând boala de fond a pacientului, hipertensiunea arterială, terapia imunosupresivă și/sau chimioterapie.

#### *Tulburări gastro-intestinale*

La pacienții care au primit rituximab pentru tratamentul LNH au fost observate cazuri de perforații gastro-intestinale, care au dus în unele cazuri la deces. În majoritatea acestor cazuri, rituximabul a fost administrat cu chimioterapie.

#### *Valorile IgG*

În studiul clinic care a evaluat terapia de întreținere cu rituximab în limfomul folicular refractar/recidivat, valorile mediane IgG au fost sub limita inferioară a valorilor normalului (LIN) (< 7 g/l) după tratamentul de inducție în ambele grupuri, observațional și rituximab. În grupul observațional, valoarea mediană IgG a crescut ulterior peste LIN, dar a rămas constantă în grupul cu rituximab. Proporția de pacienți cu valorile IgG sub LIN a fost de aproximativ 60% în grupul cu rituximab pentru perioada de tratament de 2 ani, în timp ce în grupul observațional a scăzut (36% după 2 ani).

La pacienții copii și adolescenți tratați cu rituximab a fost observat un număr mic de cazuri raportate spontan și din literatura de specialitate de hipogamaglobulinemie, în unele cazuri severă și necesitând tratament de substituție cu imunoglobulină pe termen lung. Consecințele pe termen lung ale depleției celulelor B la pacienții copii și adolescenți nu se cunosc.

#### *Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat*

Au fost raportate foarte rar cazuri de necroză epidermică toxică (sindrom Lyell) și sindrom Stevens-Johnson, unele cu evoluție letală.

#### *Grupe speciale de pacienți - rituximab în monoterapie*

##### Vârstnici ( $\geq 65$ ani)

Incidența RA de toate gradele și a RA de grad 3/4 a fost similară la pacienții vârstnici comparativ cu pacienții tineri ( $< 65$  ani).

##### Pacienți cu masă tumorală mare

Pacienții cu masă tumorală mare au avut o incidență mai mare a RA de grad 3/4 față de pacienții fără această formă a bolii (25,6% vs. 15,4%). Incidența RA de orice tip a fost similară în ambele grupuri.

##### Un nou ciclu de monoterapie

Procentul pacienților cu mai multe cicluri de terapie cu rituximab la care s-au raportat RA a fost similar cu cel al pacienților care au raportat RA după expunerea pentru prima dată la terapie (orice grad și RA de grad 3/4).

#### *Grupe speciale de pacienți - rituximab în terapie asociată*

##### Vârstnici ( $\geq 65$ ani)

Incidența reacțiilor adverse sanguine și limfatice de grad 3/4 a fost mai mare la pacienții vârstnici comparativ cu pacienții tineri ( $< 65$  ani), cu LLC netratată anterior sau cu recăderi/refractară.

#### Experiența în DLBCL/BL/BAL/BLL la pacienții copii și adolescenți

#### Rezumatul profilului de siguranță

La pacienții copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 18 ani) cu DLBCL/BL/BAL/BLL, cu marker CD20 pozitiv, în stadiu avansat, netratat anterior, a fost efectuat un studiu randomizat multicentric, deschis, de chimioterapie destinată limfomului Malin B (LMB) cu sau fără rituximab.

S-a administrat rituximab unui număr total de 309 pacienți copii și adolescenți și au fost incluși în populația de analiză de siguranță. Pacienților copii și adolescenți randomizați pentru brațul cu chimioterapie LMB și rituximab, sau înscriși în unicul braț care face parte din studiu, li s-au administrat o doză de 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală de rituximab și au primit în total șase perfuzii intravenoase de rituximab (două în timpul fiecăruia din cele două cicluri de tratament de inducție și una în timpul fiecăruia dintre cele două cicluri de tratament de consolidare din schema destinată LMB).

Profilul de siguranță al rituximabului la pacienții copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani) cu DLBCL/BL/BAL/BLL, cu marker CD20 pozitiv, în stadiu avansat, netratat anterior, a fost, în general în conformitate cu tipul, natura și severitatea profilului de siguranță cunoscut la pacienții adulți cu NHL și CLL. Adăugarea rituximabului la chimioterapie a dus la o creștere a riscului unor evenimente, incluzând infecții (inclusiv sepsis), comparativ cu chimioterapia singură.



## Experiența în poliartrita reumatoidă

### Rezumatul profilului de siguranță

Profilul general de siguranță al rituximabului în poliartrita reumatoidă se bazează pe datele de la pacienți din studii clinice și din experiența după punerea pe piață.

Profilul de siguranță al rituximabului la pacienții cu poliartrită reumatoidă (PR) severă este rezumat în secțiunile de mai jos. În studiile clinice mai mult de 3100 pacienți au primit cel puțin o cură de tratament și au fost monitorizați pentru perioade cuprinse între 6 luni și peste 5 ani; aproximativ 2400 de pacienți au urmat două sau mai multe cure de tratament, mai mult de 1000 dintre ei urmând 5 sau mai multe serii de tratament. Informațiile de siguranță colectate din timpul experienței după punerea pe piață reflectă profilul reacțiilor adverse posibile, așa cum au fost evidențiate în studiile clinice cu rituximab (vezi pct. 4.4).

Pacienților li s-a administrat 2 x 1000 mg rituximab, la interval de două săptămâni; în asociere cu metotrexat (10-25 mg/săptămână). Perfuziile de rituximab au fost administrate după o perfuzie intravenoasă de 100 mg metilprednisolon; pacienților li s-a administrat, de asemenea, tratament oral cu prednison timp de 15 zile.

### Lista tabelară a reacțiilor adverse

Reacțiile adverse sunt enumerate în Tabelul 4. Frecvențele sunt definite ca foarte frecvente ( $\geq 1/10$ ), frecvente ( $\geq 1/100$  și  $< 1/10$ ), mai puțin frecvente ( $\geq 1/1000$  și  $< 1/100$ ), rare ( $\geq 1/10000$  și  $< 1/1000$ ), foarte rare ( $< 1/10000$ ) și cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul oricărui grup de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

Cele mai frecvente reacții adverse, considerate a fi în legătură cu administrarea rituximab, au fost IRR. Incidența globală a IRR în studiile clinice a fost de 23% la prima perfuzie și a scăzut cu perfuziile ulterioare. IRR grave au fost mai puțin frecvente (0,5% dintre pacienți) și au fost observate predominant în timpul curei inițiale. Suplimentar reacțiilor adverse observate în studiile clinice cu rituximab în PR, în timpul perioadei de după punerea pe piață au fost raportate leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) (vezi pct. 4.4) și reacții asemănătoare bolii serului.

**Tabel 4 Sumarul reacțiilor adverse raportate în studiile clinice sau în timpul perioadei după autorizare apărute la pacienții cu poliartrită reumatoidă tratați cu rituximab**

<b>Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe</b>	<b>Foarte frecvente</b>	<b>Frecvente</b>	<b>Mai puțin frecvente</b>	<b>Rare</b>	<b>Foarte rare</b>	<b>Cu frecvență necunoscută</b>
<b>Infecții și infestări</b>	infecția tractului respirator superior, infecții ale tractului urinar	bronșite, sinuzite, gastroenterită, tinea pedis			LMP, reactivarea hepatitei B	infecție virală gravă <sup>1</sup> , meningoencefalită enterovirală <sup>2</sup>
<b>Tulburări hematologice și limfatice</b>		neutropenie <sup>3</sup>		neutropenie cu debut întârziat <sup>4</sup>	reacții asemănătoare bolii serului	

<b>Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe</b>	<b>Foarte frecvente</b>	<b>Frecvente</b>	<b>Mai puțin frecvente</b>	<b>Rare</b>	<b>Foarte rare</b>	<b>Cu frecvență necunoscută</b>
<b>Tulburări ale sistemului imunitar</b>	reacții legate de perfuzie <sup>5</sup> (hipertensiune, greață, erupție cutanată, pirexie, prurit, urticarie, iritație faringiană, bufeuri, hipotensiune, rinită, rigiditate, tahicardie, fatigabilitate, durere orofaringiană, edem periferic, eritem)		reacții legate de perfuzie <sup>5</sup> (edem generalizat, bronhospasm, wheezing, edem laringeal, edem angioneurotic, prurit generalizat, anafilaxie, reacții anafilactoide)			
<b>Tulburări generale și la nivelul locului de administrare</b>						
<b>Tulburări metabolice și de nutriție</b>		hipercolesterolemie				
<b>Tulburări psihice</b>		depresie, anxietate				
<b>Tulburări ale sistemului nervos</b>	cefalee	parestezie, migrenă, amețeli, sciatică				
<b>Tulburări cardiace</b>				angină pectorală, fibrilație atrială, insuficiență cardiacă, infarct miocardic	flutter atrial	
<b>Tulburări gastro-intestinale</b>		dispepsie, diaree, reflux gastro-esofagian, ulcerații la nivelul gurii, durere la nivelul abdomenului superior				
<b>Tulburări cutanate și ale țesutului subcutanat</b>		alopecie			necroliza epidermică toxică, (sindrom Lyell), sindrom Stevens-Johnson <sup>7</sup>	

Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe	Foarte frecvente	Frecvente	Mai puțin frecvente	Rare	Foarte rare	Cu frecvență necunoscută
Tulburări musculoscheletice și ale țesutului conjunctiv		artralgie/durere musculoscheletală, artroză, bursită				
Investigații diagnostice	scăderea valorilor IgM <sup>6</sup>	scăderea valorilor IgG <sup>6</sup>				

<sup>1</sup> A se vedea, de asemenea, secțiunea *Infecții* de mai jos.  
<sup>2</sup> Observate în timpul perioadei ulterioare punerii pe piață.  
<sup>3</sup> Categoria de frecvență provine din valorile testelor de laborator, colectate în studiile clinice în cadrul monitorizării de rutină în laborator.  
<sup>4</sup> Categoria de frecvență provine din datele obținute după punerea pe piață.  
<sup>5</sup> Reacții apărute în timpul sau în decurs de 24 ore de la perfuzie. Vezi de asemenea reacțiile legate de perfuzie de mai jos. IRR pot apărea ca rezultat al hipersensibilității și/sau la mecanismul de acțiune.  
<sup>6</sup> Include observațiile colectate în cadrul monitorizării de rutină în laborator.  
<sup>7</sup> Include cazuri letale.

### *Cure multiple de tratament*

Curele multiple de tratament sunt asociate cu un profil de RA similar celui observat după prima expunere. Rata tuturor RA după prima expunere la rituximab a fost mai ridicată în timpul primelor 6 luni, scăzând după această perioadă. Aceasta este reprezentată în cea mai mare parte de IRR (cele mai frecvente în timpul primei cure de tratament), exacerbarea PR și infecții, toate acestea fiind mai frecvente în primele 6 luni de tratament.

### *Descrierea reacțiilor adverse selectate*

#### *Reacții legate de perfuzie*

Cele mai frecvente RA evidențiate în timpul studiilor clinice cu rituximab au fost IRR (a se vedea Tabelul 4). Dintre cei 3189 pacienți tratați cu rituximab, 1135 (36%) au prezentat cel puțin o IRR, cu 733/3189 (23%) dintre pacienți care au experimentat o IRR după administrarea primei perfuzii la prima expunere la rituximab. Incidența IRR a scăzut cu perfuziile ulterioare. În studiile clinice, mai puțin de 1% (17/3189) dintre pacienți au prezentat o IRR gravă. În studiile clinice, nu au fost IRR gradul 4 CTC și decese determinate de IRR. Proporția evenimentelor de grad 3 CTC și de IRR care să determine întreruperea tratamentului a scăzut cu fiecare cură și au fost rare de la seria a 3-a de tratament. Premedicația cu un glucocorticoid intravenos reduce semnificativ incidența și severitatea IRR (vezi pct. 4.2 și 4.4). După punerea pe piață a medicamentului au fost raportate IRR grave, finalizate cu deces.

Într-un studiu clinic realizat la pacienții cu poliartrită reumatoidă, pentru a evalua siguranța unei perfuzii de rituximab mai rapide, a fost permisă administrarea perfuziei intravenoase de 2 ore de rituximab pacienților cu PR activă moderată până la severă care nu au manifestat o RA gravă legată de perfuzie pe parcursul sau în intervalul a 24 de ore de la prima perfuzie studiată. Pacienții care au prezentat în antecedente o reacție adversă gravă legată de perfuzie la un tratament biologic pentru PR au fost excluși de la încercarea în studiu. Incidența, tipurile și severitatea RA au fost în concordanță cu cele observate în trecut. Nu au fost observate RA grave.

#### *Infecții*

Pentru pacienții tratați cu rituximab, rata globală a infecțiilor raportate în studiile clinice a fost de aproximativ 94 din 100 pacienți pe an. Infecțiile au fost predominant ușoare până la moderate și au constat, în principal, în infecții ale tractului respirator și infecții ale tractului urinar. Incidența infecțiilor care au fost grave sau au necesitat antibiotic intravenos a fost de aproximativ 4 din 100 pacienți pe an. Rata infecțiilor grave nu a demonstrat o creștere semnificativă după cure multiple

cu rituximab. În timpul studiilor clinice au fost raportate infecții ale tractului respirator inferior (incluzând pneumonii), cu o incidență similară în brațele cu rituximab comparativ cu brațele de control.

După punerea pe piață, au fost raportate infecții virale grave la pacienții cu PR tratați cu rituximab.

Au fost raportate cazuri letale de leucoencefalopatie multifocală progresivă ca urmare a utilizării rituximabului pentru tratamentul afecțiunilor autoimune. Acestea includ poliartrita reumatoidă și alte afecțiuni autoimune, incluzând lupusul eritematos sistemic (LES) și vasculita.

Au fost raportate cazuri de reactivare a hepatitei B la pacienții cu limfom non-Hodgkin tratați cu rituximab în asociere cu chimioterapie citotoxică (vezi limfomul non-Hodgkin). Reactivarea infecției cu hepatită B a fost, de asemenea, raportată foarte rar la pacienții cu PR tratați cu rituximab (vezi pct. 4.4).

#### *Reacții adverse cardiovasculare*

Reacții cardiace grave au fost raportate cu o frecvență de 1,3 din 100 pacienți pe an la pacienții tratați cu rituximab, comparativ cu 1,3 din 100 pacienți pe an la pacienții tratați cu placebo. Proporția pacienților care au prezentat reacții cardiace (totale sau grave) nu a crescut după curele multiple de tratament.

#### *Evenimente neurologice*

Au fost raportate cazuri de sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă (SEPR) / sindrom de leucoencefalopatie posterioară reversibilă (SLPR). Semnele și simptomele au inclus tulburări de vedere, cefalee, convulsii și stare psihică alterată, cu sau fără hipertensiune arterială asociată. Diagnosticul de SEPR/SLPR necesită confirmarea prin imagistică cerebrală. Cazurile raportate au dus la recunoașterea factorilor de risc pentru SEPR/SLPR, incluzând boala de fond a pacientului, hipertensiunea arterială, terapia imunosupresivă și/sau chimioterapia.

#### *Neutropenie*

Au fost observate evenimente de neutropenie asociate tratamentului cu rituximab, dintre care majoritatea au fost tranzitorii și de severitate ușoară sau moderată. Neutropenia poate să apară la câteva luni după administrarea rituximabului (vezi pct. 4.4).

În perioadele controlate placebo din studiile clinice, 0,94% (13/1382) dintre pacienții tratați cu rituximab și 0,27% (2/731) dintre pacienții tratați cu placebo au prezentat neutropenie severă.

Evenimentele neutropenice, incluzând neutropenia severă cu debut întârziat și persistentă, au fost raportate rar după punerea pe piață, unele dintre acestea fiind asociate cu infecții letale.

#### *Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat*

Au fost raportate foarte rar cazuri de necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell) și sindrom Stevens-Johnson, unele cu evoluție letală.

#### *Valori anormale ale testelor de laborator*

La pacienții cu PR tratați cu rituximab a fost observată hipogamaglobulinemia (valorile IgG sau IgM sub limita inferioară normală). După scăderea valorilor IgG sau IgM, rata tuturor infecțiilor sau a infecțiilor grave nu a crescut (vezi pct. 4.4).

La pacienții copii și adolescenți tratați cu rituximab a fost observat un număr mic de cazuri raportate spontan și din literatura de specialitate de hipogamaglobulinemie, în unele cazuri severă și necesitând

tratament de substituție cu imunoglobulină pe termen lung. Consecințele pe termen lung ale depleției celulelor B la pacienții copii și adolescenți nu se cunosc.

### Experiența în granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA)

#### *Inducția remisiunii la adulți (Studiul 1 privind GPA/MPA)*

În Studiul 1 privind GPA/MPA, 99 de pacienți adulți au fost tratați pentru inducția remisiunii GPA și MPA cu rituximab (375 mg/m<sup>2</sup>, o dată pe săptămână timp de 4 săptămâni) și glucocorticoizi (vezi pct. 5.1).

RA listate în Tabelul 5 au fost toate evenimente adverse care au apărut cu o incidență  $\geq 5\%$  în grupul tratat cu rituximab și cu o frecvență mai mare decât la cei din grupul comparator.

**Tabel 5 Reacții adverse care au apărut la 6 luni la  $\geq 5\%$  dintre pacienții adulți tratați cu rituximab în Studiul 1 privind GPA/MPA (Rituximab n=99, cu o frecvență mai mare decât la cei din grupul comparator) sau în timpul supravegherii de după punerea pe piață.**

Clasa MedDRA de aparate, organe și sisteme	Frecvență
<b>Reacție adversă</b>	
<b>Infecții și infestări</b>	
Infecție a tractului urinar	7%
Bronșită	5%
Herpes zoster	5%
Nazofaringite	5%
Infecție virală gravă <sup>1,2</sup>	necunoscută
Meningoencefalită enterovirală <sup>1</sup>	necunoscută
<b>Tulburări hematologice și limfatic</b>	
Trombocitopenie	7%
<b>Tulburări ale sistemului imunitar</b>	
Sindrom de eliberare de citokine	5%
<b>Tulburări metabolice și de nutriție</b>	
Hiperkaliemie	5%
<b>Tulburări psihice</b>	
Insomnie	14%
<b>Tulburări ale sistemului nervos</b>	
Amețeli	10%
Tremor	10%
<b>Tulburări vasculare</b>	
Hipertensiune arterială	12%
Hiperemie facială	5%
<b>Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale</b>	
Tuse	12%
Dispnee	11%
Epistaxis	11%
Congestie nazală	6%
<b>Tulburări gastro-intestinale</b>	
Diaree	18%
Dispepsie	6%
Constipație	5%
<b>Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat</b>	
Acnee	7%
<b>Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv</b>	
Spasme musculare	18%

Clasa MedDRA de aparate, organe și sisteme	Frecvență
<b>Reacție adversă</b>	
Artralgie	15%
Dorsalgie	10%
Slăbiciune musculară	5%
Dureri musculo-scheletice	5%
Dureri la nivelul extremităților	5%
<b>Tulburări generale și la nivelul locului de administrare</b>	
Edem periferic	16%
<b>Investigații diagnostice</b>	
Valori scăzute ale hemoglobinei	6%

<sup>1</sup> Observată în timpul supravegherii de după punerea pe piață.

<sup>2</sup> A se vedea, de asemenea, secțiunea Infecții de mai jos.

*Tratamentul de întreținere la pacienții adulți (Studiul 2 privind GPA/MPA)*

În Studiul 2 privind GPA/MPA, un număr total de 57 de pacienți adulți cu GPA activă, severă și MPA au fost tratați cu rituximab în scopul menținerii remisiei (vezi pct. 5.1).

**Tabel 6 Reacții adverse induse de medicament care au apărut la  $\geq 5\%$  dintre pacienții adulți ai Studiului 2 privind GPA/MPA tratați cu rituximab (Rituximab n=57) la o frecvență mai mare decât în grupul comparator sau în timpul supravegherii de după punerea pe piață.**

Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe	Frecvență
<b>Reacția adversă</b>	
<b>Infecții și infestări</b>	
Bronșită	14%
Rinită	5%
Infecție virală gravă <sup>1, 2</sup>	necunoscută
Meningoencefalită enterovirală <sup>1</sup>	necunoscută
<b>Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale</b>	
Dispnee	9%
<b>Tulburări gastro-intestinale</b>	
Diaree	7%
<b>Tulburări generale și la nivelul locului de administrare</b>	
Pirexie	9%
Simptome asemănătoare celor gripale	5%
Edem periferic	5%
<b>Leziuni, intoxicații și complicații legate de procedurile utilizate</b>	
Reacții legate de perfuzie <sup>3</sup>	12%

<sup>1</sup> Observată în timpul supravegherii de după punerea pe piață.

<sup>2</sup> A se vedea, de asemenea, secțiunea Infecții de mai jos.

<sup>3</sup> Detaliile referitoare la reacțiile legate de perfuzie sunt prezentate la punctul în care sunt descrise reacțiile adverse selectate.

Profilul de siguranță general a fost concordant cu profilul de siguranță bine stabilit al rituximab pentru indicațiile aprobate privind afecțiunile autoimune, inclusiv GPA și MPA. În total, 4% dintre pacienții brațului tratat cu rituximab au prezentat reacții adverse care au condus la întreruperea tratamentului. Cele mai multe evenimente adverse din brațul cu rituximab au fost ușoare sau moderate ca severitate. Niciun pacient din brațul cu rituximab nu a prezentat evenimente adverse letale.

Evenimentele adverse cel mai frecvent raportate ca RA induse de medicament au fost reacțiile legate de perfuzie și infecțiile.

### *Monitorizarea pe termen lung (Studiul 3 privind GPA/MPA)*

În cadrul unui studiu observațional privind siguranța, derulat pe termen lung, 97 de pacienți cu GPA și MPA au primit tratament cu rituximab (în medie, 8 perfuzii [interval 1-28]) pe o perioadă de până la 4 ani, în funcție de practica uzuală a medicului și decizia acestuia. Profilul de siguranță general a fost concordant cu profilul de siguranță bine stabilit al Rituximab în PR și GPA și MPA, nefiind raportate reacții adverse noi.

#### Copii și adolescenți

S-a realizat un studiu deschis, cu un singur braț, care a inclus 25 pacienți copii sau adolescenți cu GPA sau MPA activă, severă. Perioada totală de studiu a constat într-o fază de 6 luni de inducție a remisiunii, cu o perioadă de monitorizare de minimum 18 luni, până la 4,5 ani în total. În cursul fazei de monitorizare, Rituximab a fost administrat conform deciziei investigatorului (17 din cei 25 de pacienți au primit tratament suplimentar cu rituximab). A fost permis tratamentul concomitent cu altă terapie imunosupresoare (vezi pct. 5.1).

RAM considerate ca evenimente adverse au fost cele care au survenit cu o incidență  $\geq 10\%$ . Acestea au inclus: infecții (17 pacienți [68%] în faza de inducție a remisiunii; 23 pacienți [92%] în perioada totală a studiului), IRR (15 pacienți [60%] în faza de inducție a remisiunii; 17 pacienți [68%] în perioada totală a studiului) și greață (4 pacienți [16%] în faza de inducție a remisiunii; 5 pacienți [20%] în perioada totală a studiului).

Pe perioada totală a studiului, profilul de siguranță al rituximabului a fost similar cu cel raportat în decursul fazei de inducție a remisiunii.

Profilul de siguranță al rituximabului la pacienții copii și adolescenți cu GPA sau MPA a fost similar ca tip, natură și severitate cu profilul de siguranță cunoscut la pacienții adulți, în indicațiile aprobate ale bolilor autoimune, inclusiv GPA sau MPA la pacienții adulți.

#### Descrierea reacțiilor adverse selectate

##### *Reacții legate de perfuzie*

În Studiul 1 privind GPA/MPA (studiu de inducție a remisiunii la adulți), IRR au fost definite ca orice eveniment advers care apare în interval de 24 ore de la administrarea perfuziei și considerat de către investigatorii în siguranța populației ca fiind cauzat de perfuzie. Din cei 99 de pacienți tratați cu rituximab, 12 (12%) au manifestat cel puțin o IRR. Toate IRR au fost de grad 1 sau 2 CTC. Cele mai frecvente IRR au inclus sindrom de eliberare de citokine, hiperemie facială, iritație faringiană și tremor. Rituximabul a fost administrat intravenos în asociere cu glucocorticoizi care pot reduce incidența și severitatea acestor evenimente.

În Studiul 2 privind GPA/MPA (studiu cu terapie de întreținere, la pacienții adulți), 7/57 pacienți (12%) din grupul tratat cu Rituximab au prezentat cel puțin o reacție legată de perfuzie (IRR). Frecvența simptomelor IRR a fost mai mare pe durata sau ulterior administrării primei perfuzii (9%) și a scăzut la administrarea perfuziilor ulterioare (< 4%). Toate simptomele IRR au fost ușoare sau moderate și cele mai multe au fost raportate pentru următoarele clase de aparate, sisteme și organe: tulburări respiratorii, toracice și mediastinale și afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat.

În studiul clinic realizat la pacienți copii și adolescenți cu GPA sau MPA, IRR raportate au fost observate predominant la prima perfuzie (8 pacienți [32%]) și apoi au scăzut în timp odată cu numărul perfuziilor de rituximab (20% la a doua perfuzie, 12% la a treia perfuzie și 8% la a patra perfuzie). Cele mai frecvente simptome ale IRR raportate în cursul fazei de inducție a remisiunii au fost: cefalee, erupție cutanată tranzitorie, rinoree și pirexie (8%, pentru fiecare simptom). Simptomele observate ale IRR au fost similare cu cele cunoscute la pacienții adulți cu GPA sau MPA tratați cu rituximab. Majoritatea IRR au fost de grad 1 și grad 2, au existat două IRR de grad 3 lipsite de gravitate și nu s-au

raportat IRR de grad 4 sau 5. Un singur IRR grav de grad 2 (edem generalizat care s-a remis sub tratament) a fost raportat la un pacient (vezi pct. 4.4).

### *Infecții*

În Studiul 1 privind GPA/MPA, rata globală a infecțiilor a fost de aproximativ 237 la 100 pacienți pe an (Î 95% 197-285) la criteriul final primar la 6 luni. Infecțiile au fost predominant ușoare până la moderate și au constat în mare parte în infecții ale tractului respirator superior, herpes zoster și infecții ale tractului urinar. Rata infecțiilor grave a fost de aproximativ 25 la 100 pacienți pe an. Infecția gravă raportată cel mai frecvent în grupul tratat cu rituximab a fost pneumonia, cu o frecvență de 4%.

În Studiul 2 privind GPA/MPA, la pacienții adulți, 30 din cei 57 pacienți (53%) din grupul tratat cu Rituximab au prezentat infecții. Frecvența infecțiilor, indiferent de gradul severității, a fost similară între brațele de tratament. Infecțiile au fost preponderent ușoare până la moderate. Cele mai frecvente infecții din brațul cu Rituximab au fost infecțiile la nivelul tractului respirator superior, gastroenterita, infecțiile la nivelul tractului urinar și zona zoster. Frecvența infecțiilor grave a fost similară în cele două brațe de tratament (aproximativ 12%). Infecția gravă raportată cel mai frecvent în grupul cu Rituximab a fost bronșita ușoară sau moderată ca severitate.

În studiul clinic realizat la pacienți copii și adolescenți cu GPA activă, severă și MPA, 91% dintre infecțiile raportate au fost lipsite de gravitate și 90% au fost ușoare până la moderate. Cele mai frecvente infecții pe perioada totală a studiului au fost: infecțiile de tract respirator superior (ITRS) (48%), *gripa* (24%), conjunctivita (20%), nazofaringita (20%), infecțiile de tract respirator inferior (16%), sinuzita (16%), ITRS virale (16%), otită (12%), gastroenterită (12%), faringită (12%), infecții de tract urinar (12%). Infecții grave au fost raportate la 7 pacienți (28%) și au inclus: *gripa* (2 pacienți [8%]) și infecția tractului respirator inferior (2 pacienți [8%]) drept evenimentele cel mai frecvent raportate.

După punerea pe piață, au fost raportate infecții virale grave la pacienții cu GPA/MPA tratați cu rituximab.

### *Malignități*

În Studiul 1 privind GPA/MPA la pacienții adulți, incidența apariției de malignități la pacienții tratați cu rituximab pentru GPA și MPA, în studiul clinic, a fost de 2,00 la 100 pacienți pe an la data programată de închidere a studiului clinic (atunci când ultimul pacient a terminat perioada de monitorizare). Pe baza ratelor standardizate de incidență, incidența malignităților pare să fie similară cu cea raportată anterior la pacienții cu vasculite asociate-ANCA.

În studiul clinic efectuat la copii și adolescenți, nu s-au raportat malignități pe o perioadă de monitorizare de până la 54 de luni.

### *Reacții adverse cardiovasculare*

În Studiul 1 privind GPA/MPA, evenimentele cardiace au apărut cu o rată de aproximativ 273 la 100 pacienți pe an (95% Î 149-470), la criteriul final primar de la 6 luni. Incidența evenimentelor cardiace grave a fost de 2,1 la 100 pacienți pe an (95% Î 3-15). Evenimentele raportate cel mai frecvent au fost tahicardia (4%) și fibrilația atrială (3%) (vezi pct. 4.4).



### *Evenimente neurologice*

La pacienții cu afecțiuni autoimune au fost raportate cazuri de sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă (SEPR)/sindrom de leucoencefalopatie posterioară reversibilă (SLPR). Semnele și simptomele au inclus tulburări de vedere, cefalee, convulsii și stare psihică alterată, cu sau fără hipertensiune arterială asociată. Diagnosticul de SEPR/SLPR necesită confirmarea prin imagistică cerebrală. Cazurile raportate au dus la recunoașterea factorilor de risc pentru SEPR/SLPR, incluzând boala de fond a pacientului, hipertensiunea arterială, terapia imunosupresivă și/sau chimioterapia.

### *Reactivarea hepatitei B*

La pacienții cu GPA și MPA cărora li s-a administrat rituximab, s-a raportat în perioada de după punerea pe piață a medicamentului, un număr mic de cazuri de reactivare a hepatitei B, unele cu evoluție letală.

### *Hipogamaglobulinemie*

La pacienții adulți, copii și adolescenți cu GPA și MPA tratați cu rituximab a fost observată hipogamaglobulinemie (IgA, IgG sau IgM sub limita inferioară a normalului).

În Studiul 1 privind GPA/MPA, la 6 luni, în grupul tratat cu rituximab, valorile IgA, IgG și IgM au scăzut la respectiv 27%, 58% și 51% dintre pacienții care au avut valorile imunoglobulinei normale la momentul inițial, în comparație cu 25%, 50% și 46% în grupul tratat cu ciclofosfamidă. Rata infecțiilor totale și a infecțiilor grave nu a crescut după scăderea titrurilor de IgA, IgG sau IgM.

În Studiul 2 privind GPA/MPA nu au fost constatate diferențe semnificative clinic între cele două brațe de tratament sau scăderi ale nivelurilor imunoglobulinei totale, IgG, IgM sau IgA pe durata studiului.

În studiul clinic realizat la copii și adolescenți, pe durata totală a studiului, 3/25 (12%) dintre pacienți au raportat un episod de hipogamaglobulinemie, 18 pacienți (72%) au avut valori prelungite (definite ca niveluri ale Ig sub limita inferioară a normalului timp de cel puțin 4 luni) ale IgG scăzut (dintre aceștia, 15 pacienți au avut și valori prelungite ale IgM scăzut). Trei pacienți au primit tratament cu imunoglobuline intravenoase (IG-IV). Pe baza datelor limitate nu se pot trage concluzii ferme cu privire la faptul că valorile prelungite, ale IgG și IgM scăzute, au dus la un risc crescut de infecții grave la acești pacienți. Consecințele pe termen lung ale depleției celulelor B la pacienții copii și adolescenți nu se cunosc.

### *Neutropenie*

În Studiul 1 privind GPA/MPA, 24% dintre pacienții din grupul tratat cu rituximab (schemă unică de tratament) și 23% dintre pacienții din grupul tratat cu ciclofosfamidă au dezvoltat neutropenie de grad 3 CTC sau mai mare. Neutropenia nu a fost asociată cu o creștere a numărului de infecții grave observate la pacienții tratați cu rituximab.

În Studiul 2 privind GPA/MPA, frecvența neutropeniei de orice grad a fost 0% pentru pacienții tratați cu rituximab față de 5% la pacienții tratați cu azatioprină.

### *Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat:*

Au fost raportate foarte rar cazuri de necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell) și sindrom Stevens-Johnson, unele cu evoluție letală.

## Experiența din studiile clinice privind pemfigusul vulgar

### Rezumatul profilului de siguranță în Studiul 1 PV (Studiul ML22196) și Studiul 2 PV (Studiul WA29330)

Profilul de siguranță a rituximab în asociere cu glucocorticoizi administrați în doze reduse, pe termen scurt, în tratamentul pacienților cu PV a fost studiat într-un studiu clinic de fază 3, randomizat, controlat, deschis, multicentric, care a inclus 38 de pacienți cu PV randomizați la grupul de tratament cu rituximab (Studiul 1 PV). Pacienții randomizați la grupul de tratament cu rituximab au primit o doză inițială de 1000 mg pe cale intravenoasă în ziua 1 și o a doua doză de 1000 mg intravenos în ziua de studiu 15. Dozele de întreținere de 500 mg intravenos au fost administrate în lunile 12 și 18. Pacienții puteau primi o doză de 1000 mg intravenos în momentul recurenței bolii (vezi pct. 5.1).

În Studiul 2 PV, un studiu randomizat, dublu-orb, dublu-dummy, controlat cu comparator activ, multicentric, care a evaluat eficacitatea și siguranța tratamentului cu rituximab comparativ cu micofenolat mofetil (MMF) la pacienți cu PV moderat până la sever care necesitau corticoterapie orală, 67 de pacienți cu PV au fost tratați cu rituximab (doză inițială de 1000 mg administrare intravenos în ziua 1 a studiului și o a doua doză de 1000 mg administrare intravenos în ziua 15, cu repetare în săptămânile 24 și 26) timp de până la 52 săptămâni (vezi pct. 5.1).

Profilul de siguranță al rituximab în PV a corespuns cu profilul de siguranță stabilit pentru alte indicații aprobate în tratamentul bolilor autoimune.

### Lista reacțiilor adverse prezentată sub formă de tabel pentru Studiile 1 și 2 privind PV

Reacțiile adverse din Studiile 1 și 2 privind PV sunt prezentate în Tabelul 7. În Studiul 1 PV, RA au fost definite ca evenimente adverse apărute cu o frecvență  $\geq 5\%$  în rândul pacienților cu PV tratați cu rituximab, cu o diferență absolută  $\geq 2\%$  în ceea ce privește incidența între grupul tratat cu rituximab și cel tratat cu doza standard de prednison până în luna 24. Nu a fost retras niciun pacient din cauza RA în Studiul 1. În cadrul Studiului 2 PV, RA au fost definite ca evenimente survenite cu frecvență  $\geq 5\%$  în rândul pacienților din brațul tratat cu rituximab și evaluate ca fiind corelate cu medicamentul.

**Tabel 7 Reacțiile adverse apărute la pacienții cu PV tratați cu rituximab în Studiul 1 PV (până în luna 24) și în Studiul 2 PV (până în săptămâna 52) sau în timpul supravegherii de după punerea pe piață**

Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe	Foarte frecvente	Frecvente	Necunoscute
<b>Infecții și infestări</b>	Infecție la nivelul tractului respirator superior	Infecție cu virus herpetic Herpes zoster Herpes bucal Conjunctivită Rinofaringită Candidoză bucală Infecție la nivelul tractului urinar	Infecție virală gravă <sup>1, 2</sup> , meningoencefalită enterovirală <sup>1</sup>
<b>Tumori benigne, maligne și nespecificate (incluzând chisturi și polipi)</b>		Papilom cutanat	
<b>Tulburări psihice</b>	Tulburare depresivă persistentă	Depresie majoră Iritabilitate	
<b>Tulburări ale sistemului nervos</b>	Cefalee	Amețeală	
<b>Tulburări cardiace</b>		Tahicardie	

Clasa MedDRA de aparate, sisteme și organe	Foarte frecvente	Frecvente	Necunoscute
<b>Tulburări gastro-intestinale</b>		Durere la nivelul abdomenului superior	
<b>Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat</b>	Alopecie	Prurit Urticarie Afecțiune cutanată	
<b>Tulburări musculo-scheletice, ale țesutului conjunctiv și osoase</b>		Durere musculo-scheletică Artralgie Dorsalgie	
<b>Tulburări generale și la nivelul locului de administrare</b>		Fatigabilitate Astenie Pirexie	
<b>Leziuni, intoxicații și complicații legate de procedurile utilizate</b>	Reacții legate de perfuzie <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Observată în timpul supravegherii de după punerea pe piață.  
<sup>2</sup> A se vedea, de asemenea, secțiunea Infecții de mai jos.  
<sup>3</sup> Reacțiile legate de perfuzie din cadrul Studiului 1 PV au inclus simptome înregistrate la următoarea vizită programată după fiecare perfuzie și evenimentele adverse survenite în ziua administrării perfuziei sau la o zi după administrare. Cele mai frecvente simptome ale reacțiilor legate de perfuzie/termenii preferați cel mai frecvent raportați în cadrul Studiului 1 PV au inclus cefaleea, frisoanele, tensiunea arterială crescută, greața, astenia și durerea.

Cele mai frecvente simptome ale reacțiilor legate de perfuzie/termenii preferați cel mai frecvent raportați în cadrul Studiului 2 PV au fost dispneea, eritemul, hiperhidroza, hiperemia facială/bufeurile, hipotensiunea arterială/tensiunea arterială scăzută și erupția cutanată tranzitorie/erupția pruritică.

### Descrierea reacțiilor adverse selectate

#### *Reacții legate de perfuzie*

În Studiul 1 PV, reacțiile legate de perfuzie au fost frecvente (58%). Aproape toate reacțiile legate de perfuzie au fost ușoare până la moderate. Proporția pacienților care au prezentat o reacție legată de perfuzie a fost de 29% (11 pacienți), 40% (15 pacienți), 13% (5 pacienți) și 10% (4 pacienți) după prima, a doua, a treia și, respectiv, a patra perfuzie. Niciunul dintre pacienți nu a fost retras din studiu din cauza reacțiilor legate de perfuzie. Simptomele reacțiilor legate de perfuzie au fost similare ca tip și severitate cu cele observate la pacienții cu PR și GPA/MPA.

În Studiul 2 PV, IRR au apărut în special la prima perfuzie, iar frecvența IRR a scăzut odată cu perfuziile ulterioare: 17,9%, 4,5%, 3% și respectiv 3% dintre pacienți au manifestat IRR la prima, a doua, a treia și respectiv a patra perfuzie. La 11 din 15 pacienți care au manifestat cel puțin o IRR, gradul de severitate al IRR a fost 1 sau 2. La 4 din 15 pacienți au fost raportate IRR de grad  $\geq 3$  care au condus la întreruperea tratamentului cu rituximab; trei dintre cei patru pacienți au prezentat IRR grave (care au pus viața în pericol). IRR grave au survenit la administrarea primei perfuzii (2 pacienți) sau celei de-a doua perfuzii (1 pacient) și s-au remis prin tratament simptomatic.

#### *Infecții*

În Studiul 1 PV, 14 pacienți (37%) din grupul tratat cu rituximab au prezentat infecții asociate cu tratamentul, comparativ cu 15 pacienți (42%) din grupul tratat cu prednison în doză standard. Cele mai frecvente infecții în grupul cu rituximab au fost infecțiile cu herpes simplex și zoster, bronșita, infecția la nivelul tractului urinar, infecția fungică și conjunctivita. Trei pacienți (8%) din grupul cu rituximab au prezentat, în total, 5 infecții grave (pneumonie cu *Pneumocystis jirovecii*, tromboză infecțioasă, discită intervertebrală, infecție pulmonară, sepsis stafilococic) și un pacient (3%) din grupul tratat cu prednison în doză standard a prezentat o infecție gravă (pneumonie cu *Pneumocystis jirovecii*).

În Studiul 2 PV, 42 pacienți (62,7%) din brațul de tratament cu rituximab au dezvoltat infecții. Cele mai frecvente infecții în grupul tratat cu rituximab au fost infecțiile la nivelul tractului respirator superior, rinofaringita, candidoza bucală și infecția de tract urinar. Șase pacienți (9%) din brațul cu

rituximab au prezentat infecții grave.

După punerea pe piață, au fost raportate infecții virale grave la pacienții cu PV tratați cu rituximab.

#### *Valori anormale ale testelor de laborator*

În Studiul 2 PV, în brațul de tratament cu rituximab, după administrarea perfuziei au fost foarte frecvent observate scăderi temporare ale numărului de limfocite determinate de scăderea populațiilor de limfocite T din sângele periferic, precum și scăderea temporară a concentrației plasmatică de fosfor. Se consideră că acestea au fost induse de perfuzia intravenoasă cu metilprednisolon administrată ca premedicație.

În Studiul 2 PV, a fost observată frecvent scăderea nivelurilor de IgG și foarte frecvent scăderea nivelurilor de IgM; cu toate acestea, nu a existat nicio dovadă a unui risc crescut de infecții grave ca urmare a acestor scăderi.

#### Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesiștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul **sistemului național de raportare**, astfel cum este menționat în [Anexa V](#).

### **4.9 Supradozaj**

Există experiență limitată în studiile clinice la om cu doze mai mari decât doza aprobată de rituximab forma farmaceutică intravenoasă. Cea mai mare doză intravenoasă de rituximab testată la om până în prezent este de 5000 mg (2250 mg/m<sup>2</sup>), testată într-un studiu de creștere a dozei la pacienții cu LLC. Nu au fost identificate semne suplimentare de siguranță.

Pacienții care prezintă supradozaj trebuie să întrerupă imediat perfuzia și să fie atent monitorizați.

După punerea pe piață, au fost raportate cinci cazuri de supradozaj cu rituximab. Trei dintre cazuri nu au raportat reacții adverse. Cele două evenimente adverse raportate au fost simptome asemănătoare gripei, la o doză de rituximab 1,8 g și insuficiență respiratorie letală, la o doză de rituximab 2 g.

## **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Grupa farmacoterapeutică: agenți antineoplazici, anticorpi monoclonali, codul ATC: L01FA01.

Rixathon este un medicament biosimilar. Informații detaliate sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente <http://www.ema.europa.eu>.

Rituximab se leagă specific de antigenul transmembrantar, CD20, care este o fosfoproteină neglicozilată, situată pe limfocitele pre-B și B mature. Antigenul este prezent la > 95% din numărul total al limfoamelor non-Hodgkin cu celule B.

CD20 se găsește atât pe celulele B normale, cât și pe cele maligne, dar nu pe celulele stem hematopoietice, pe celulele pro-B, pe celulele plasmatică normale sau pe alt tip de țesut normal. Acest antigen nu pătrunde în interior după legarea anticorpilor și nu se desprinde de pe suprafața celulară. CD20 nu circulă în plasmă ca un antigen liber și, de aceea, nu intră în competiție pentru legarea anticorpilor.

Fragmentul Fab al rituximab se leagă de antigenul CD20 de pe limfocitele B și devine capabil să medieze distrugerea celulelor B pe calea domeniul Fc. Printre mecanismele posibile ale distrugerii celulare se numără citotoxicitatea dependentă de complement (CDC) care rezultă din legarea C1q și citotoxicitatea celulară dependentă de anticorpi (ADCC) mediată prin unul sau mai mulți receptori Fcy pe suprafața granulocitelor, macrofagelor și celulelor NK. De asemenea, s-a demonstrat că legarea rituximab la antigenul CD20 de pe suprafața limfocitelor B induce moartea celulară prin apoptoză.

Numărul celulelor B periferice a scăzut sub valoarea normală după administrarea primei doze de rituximab. La pacienții tratați pentru malignități hematologice, recuperarea celulelor B a început în decursul a 6 luni de tratament și în general a revenit la limite normale în decurs de 12 luni după terminarea tratamentului, deși la unii pacienți aceasta poate dura mai mult timp (până la un timp mediu de recuperare de 23 luni după tratamentul de inducție). La pacienții cu poliartrită reumatoidă, depleția imediată a celulelor B în sângele periferic a fost observată după două perfuzii a 1000 mg cu rituximab, administrate la un interval de 14 zile. Numărul celulelor B din sângele periferic începe să crească din săptămâna 24, iar repopularea cu celule B a fost observată la majoritatea pacienților din săptămâna 40, indiferent dacă rituximabul a fost administrat ca monoterapie sau în combinație cu metotrexat. Un procent mic de pacienți a prezentat depleție de celule B periferice prelungită o perioadă de 2 ani sau mai mult, de la ultima lor doză de rituximab. La pacienții cu GPA sau MPA, numărul de celule B periferice din sânge a scăzut la < 10 celule/μl după administrarea a două perfuzii săptămânale de rituximab 375 mg/m<sup>2</sup> și au rămas la acest nivel în cazul celor mai mulți pacienți până la sfârșitul perioadei de 6 luni. Majoritatea pacienților (81%) a prezentat semne de revenire la normal a celulelor B, cu un număr > 10 celule/μl în luna 12, crescând la 87% dintre pacienți în luna 18.

### Experiența clinică în limfomul non-Hodgkin (LNH) și leucemia limfocitară cronică (LLC)

#### Limfom folicular

##### *Monoterapie*

Terapia inițială, săptămânală, pentru 4 doze

Într-un studiu clinic pivot, 166 pacienți cu limfom non-Hodgkin cu celule B, de grad mic sau folicular, recidivat sau chimiorezistent, au primit 375 mg/m<sup>2</sup> rituximab administrat în perfuzie intravenoasă o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni. Rata de răspuns globală (RRG) la populația cu intenție de tratament (ITT) a fost de 48% (Î<sub>95</sub>% 41% - 56%) cu un procent de răspuns complet (RC) de 6% și rata de răspuns parțială (RP) de 42%. Timpul până la progresia bolii (TPP), median proiectat, pentru pacienții care au răspuns la tratament a fost de 13 luni. Într-o analiză a unui subgrup, RRG a fost mai mare la pacienții cu IWF subtipurile histologice B, C și D comparativ cu IWF subtipul A (58% vs. 12%) și mai mare la pacienții la care cea mai mare leziune a fost < 5 cm față de > 7 cm în cel mai mare diametru (53% vs. 38%) și mai mare la pacienții care au recidivă chimiosensibilă față de pacienții cu recidivă chimiorezistentă (definită ca durată a răspunsului < 3 luni) (50% vs. 22%). RRG la pacienții tratați anterior cu transplant autolog de măduvă osoasă (ABMT) a fost de 78% față de 43% la pacienții fără transplant autolog. Vârsta, sexul pacienților, gradul limfomului, diagnosticul inițial, prezența sau absența unei mase tumorale mari, LDH normală sau crescută, prezența sau nu a bolii extraganglionare nu au efect semnificativ statistic (testul Fisher) asupra răspunsului la rituximab. O corelație semnificativă statistic a fost observată între ratele de răspuns și afectarea măduvei osoase. 40% din pacienții cu afectare a măduvei osoase au răspuns la tratament față de 59% din pacienții care nu au prezentat afectarea măduvei osoase (p = 0,0186). Aceste observații nu au fost susținute de analiza logistică regresivă în care următorii factori au fost identificați ca factori de prognostic: tipul histologic, pozitivitatea bcl-2 la inițierea terapiei, rezistența la ultima chimioterapie și masa tumorală mare.

Tratamentul inițial, săptămânal pentru 8 doze

Într-un studiu clinic multicentric, cu braț unic, 37 pacienți cu limfom de grad mic sau folicular non-Hodgkin, cu celule B, recidivat sau chimiorezistent, au primit 375 mg/m<sup>2</sup> rituximab în perfuzie intravenoasă, administrată săptămânal, în 8 doze. RRG a fost de 57% (95% Interval de Încredere (ÎI); 41% - 73%; răspuns complet 14% și parțial 43%) cu un TPP median proiectat pentru pacienții care răspund la tratament de 19,4 luni (în intervalul de 5,3 până la 38,9 luni).

Tratamentul inițial, pacienți cu masă tumorală mare, săptămânal pentru 4 doze

În datele rezultate din trei studii clinice, 39 pacienți cu recidivă sau chimiorezistență, cu masă tumorală mare (o singură leziune  $\geq 10$  cm în diametru), cu limfom folicular non-Hodgkin cu celule B de grad mic, au primit 375 mg/m<sup>2</sup> rituximab în perfuzie intravenoasă, săptămânal în 4 doze. RRG a fost de 36% (ÎI95% 21% - 51%; răspuns complet 3% și parțial 33%) cu un TPP median pentru pacienții care au răspuns la terapie de 9,6 luni (în intervalul 4,5 la 26,8 luni).

Reluarea tratamentului, săptămânal pentru 4 doze

Într-un studiu clinic multicentric, cu braț unic, 58 pacienți cu limfom de grad mic sau folicular non-Hodgkin cu celule B, recidivat sau chimiorezistent, care au obținut răspuns clinic obiectiv într-o primă fază cu terapie cu rituximab, au fost retratați cu 375 mg/m<sup>2</sup> rituximab în perfuzie intravenoasă, administrată săptămânal în 4 doze. Trei dintre pacienți au primit 2 cure de tratament cu rituximab înainte de includerea în studiu și o a treia cură în timpul studiului. Doi pacienți au fost retratați de 2 ori în cadrul acestui studiu. Pentru 60 reluări de tratament, RRG a fost de 38% (ÎI95% 26% - 51%; răspuns complet 10% și parțial 28%) cu un TPP median proiectat pentru pacienții care răspund terapiei de 17,8 luni (în interval de 5,4 până la 26,6 luni). Acesta este comparabil în mod favorabil cu TPP obținut după prima cură de tratament cu rituximab (12,4 luni).

*Terapie inițială, în asociere cu chimioterapie*

Într-un studiu clinic deschis randomizat, un număr total de 322 pacienți netratați anterior, cu limfom folicular au fost randomizați să primească fie chimioterapie cu CVP (ciclofosfamidă 750 mg/m<sup>2</sup>, vincristină 1,4 mg/m<sup>2</sup> până la un maximum de 2 mg în ziua 1 și prednisolon 40 mg/m<sup>2</sup>/zi în zilele 1-5) la fiecare 3 săptămâni pentru 8 cicluri sau rituximab 375 mg/m<sup>2</sup> în asociere cu CVP (R-CVP). Rituximabul a fost administrat în prima zi a fiecărui ciclu de tratament. Un număr total de 321 pacienți (162 R-CVP, 159 CVP) au primit terapie și au fost analizați pentru eficacitatea terapiei. Timpul median de monitorizare a fost de 53 luni. R-CVP a dus la un beneficiu semnificativ față de CVP pentru obiectivul primar al studiului, timpul până la eșecul terapiei (27 luni vs. 6,6 luni,  $p < 0,0001$ , testul log-rank). Proporția pacienților cu răspuns tumoral (RC, RCu, RP) a fost semnificativ mai mare ( $p < 0,0001$  testul Chi-Square) în grupul R-CVP (80,9%) decât în grupul CVP (57,2%). Tratamentul cu R-CVP a prelungit semnificativ timpul până la progresia bolii sau deces comparativ cu CVP, 33,6 luni și respectiv 14,7 luni ( $p < 0,0001$ , testul log-rank). Durata mediană de răspuns a fost 37,7 luni în grupul R-CVP și de 13,5 luni în grupul CVP ( $p < 0,0001$ , testul log-rank).

Diferența dintre grupurile de tratament cu privire la supraviețuirea globală a arătat o diferență semnificativă clinic ( $p = 0,029$ , testul log-rank stratificat pe centru): ratele de supraviețuire la 53 de luni au fost de 80,9% pentru pacienții din grupul R-CVP comparativ cu 71,1% pentru pacienții din grupul CVP.

Rezultatele din alte trei studii clinice randomizate care au folosit rituximab în asociere cu alt regim chimioterapic în afară de CVP (CHOP, MCP, CHVP/ $\alpha$ -Interferon), au arătat de asemenea îmbunătățiri semnificative în ratele de răspuns, parametrii dependenți de timp ca și în supraviețuirea globală. Rezultatele cheie din toate cele patru studii sunt rezumate în Tabelul 8.

**Tabel 8 Rezumatul rezultatelor cheie din patru studii randomizate de fază III care evaluează beneficiul rituximabului cu diferite scheme de chimioterapie în limfomul folicular**

Studiu	Tratament, n	FU median, luni	RRG, %	RC, %	Valoare mediană a TPE/SFP/SFE, luni	Ratele SG, %
<b>M39021</b>	CVP, 159 R-CVP, 162	53	57 81	10 41	Valoare mediană a TPP: 14,7 33,6 p < 0,0001	53-luni 71,1 80,9 p = 0,029
<b>GLSG'00</b>	CHOP, 205 R-CHOP, 223	18	90 96	17 20	Valoare mediană a TPE: 2,6 ani Neatins p < 0,001	18-luni 90 95 p = 0,016
<b>OSHO-39</b>	MCP, 96 R-MCP, 105	47	75 92	25 50	Valoare mediană a SFP: 28,8 Neatins p < 0,0001	48-luni 74 87 p = 0,009 6
<b>FL2000</b>	CHVP-IFN, 183 CHVP-IFN, 175	42	85 94	49 76	Valoare mediană a SFE: 36 Neatins p < 0,0001	42-luni 84 91 p = 0,029

SFE - Supraviețuire fără evenimente  
 TPP – Timp până la progresie sau deces  
 SFP – Supraviețuirea fără progresie  
 TPE – Timp până la eșecul tratamentului  
 Rate SG – rate de supraviețuire globală la momentul analizei

#### *Terapia de întreținere*

Limfom folicular netratat anterior

Într-un studiu prospectiv, deschis, internațional, multicentric, de fază III, 1193 pacienți cu limfom folicular avansat, netratat anterior au primit terapie de inducție cu R-CHOP (n = 881), R-CVP (n = 268) sau R-FCM (n = 44), în funcție de alegerea investigatorului. În total, 1078 pacienți au răspuns la terapia de inducție, dintre care 1018 au fost randomizați pentru terapia de întreținere cu rituximab (n = 505) sau observație (n = 513). Cele două grupuri de tratament au fost bine echilibrate în ceea ce privește caracteristicile inițiale și statusul bolii. Tratamentul de întreținere cu rituximab constă în administrarea unei perfuzii de rituximab, 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală la fiecare 2 luni, până la progresia bolii sau pentru o perioadă de maximum doi ani.

Analiza primară pre-specificată a fost realizată la un timp median de observație de 25 de luni de la randomizare, tratamentul de întreținere cu rituximab a dus la obținerea unei îmbunătățiri semnificative statistic și relevante clinic a obiectivului primar al studiului, supraviețuirea fără progresie (SFP), evaluat de investigator, în comparație cu observația la pacienții cu limfom folicular netratat anterior (Tabel 9).

În analiza primară, a fost observat, de asemenea, un beneficiu semnificativ al tratamentului de întreținere cu rituximab pentru obiectivele secundare ale studiului, supraviețuirea fără evenimente (SFE), timpul până la următorul tratament anti-linfom (TNLT), timpul până la următoarea cură de chimioterapie (TNCT) și rata de răspuns globală (RRG) (Tabel 9).

Datele din monitorizarea extinsă a pacienților din cadrul studiului (timpul median de observație de 9 ani) au confirmat avantajele pe termen lung ale terapiei de întreținere cu rituximab în ceea ce privește SFP, SFE, TNLT și TNCT (Tabelul 9).

**Tabel 9 Profilul eficacității, rezultate pentru rituximab întreținere față de observație la analiza primară stabilită în protocol și după durata mediană de monitorizare de 9 ani (analiza finală)**

	Analiza primară (durata mediană de FU: 25 luni)		Analiza finală (durata mediană de FU: 9 ani)	
	Observație N=513	Rituximab N=505	Observație N=513	Rituximab N=505
<b>Eficacitate Primară</b> Supraviețuirea fără progresie (valoare mediană) Valoarea p (testul log-rank) Raport de risc (Î 95%) Reducerea riscului	NR	NR	4,06 ani	10,49 ani
	< 0,0001		< 0,0001	
	0,50 (0,39, 0,64)		0,61 (0,52, 0,73)	
	50%		39%	
<b>Eficacitate Secundară</b> Supraviețuirea globală (valoare mediană) Valoarea p (testul log-rank) Raport de risc (Î 95%) Reducerea riscului	NR	NR	NR	NR
	0,7246		0,7948	
	0,89 (0,45, 1,74)		1,04 (0,77, 1,40)	
	11%		-6%	
Supraviețuirea fără evenimente (valoare mediană) Valoarea p (testul log-rank) Raport de risc (Î 95%) Reducerea riscului	38 luni	NR	4,04 ani	9,25 ani
	< 0,0001		< 0,0001	
	0,54 (0,43, 0,69)		0,64 (0,54, 0,76)	
	46%		36%	
TNLT (valoare mediană) Valoarea p (testul log-rank) Raport de risc (Î 95%) Reducerea riscului	NR	NR	6,11 ani	NR
	0,0003		< 0,0001	
	0,61 (0,46, 0,80)		0,66 (0,55, 0,78)	
	39%		34%	
TNCT (valoare mediană) Valoarea p (testul log-rank) Raport de risc (Î 95%) Reducerea riscului	NR	NR	9,32 ani	NR
	0,0011		0,0004	
	0,60 (0,44, 0,82)		0,71 (0,59, 0,86)	
	40%		39%	
Rata de răspuns globală* Valorile p din testul Chi-pătrat Risc relativ estimat (Î 95%)	55%	74%	61%	79%
	< 0,0001		< 0,0001	
	2,33 (1,73, 3,15)		2,43 (1,84, 3,22)	
Rata Răspunsului Complet (RC/RCu)* Valorile p din testul Chi-pătrat Risc relativ estimat (Î 95%)	48%	67%	53%	67%
	< 0,0001		< 0,0001	
	2,21 (1,65, 2,94)		2,34 (1,80, 3,03)	

\* la sfârșitul tratamentului de întreținere/observație; rezultatele analizei finale pe baza timpului median de observație de 73 de luni.

FU: monitorizare; NR: nu a putut fi atins la momentul opririi studiului clinic; TNCT: timpul până la următoarea cură de chimioterapie; TNLT: timpul până la următorul tratament anti-limfom.

Tratamentul de întreținere cu rituximab a adus beneficii considerabile tuturor subgrupurilor predefinite testate: sex (bărbat, femeie), vârstă (< 60 ani, ≥ 60 ani), scorul indexului internațional de prognostic al limfomului folicular, FLIPI (≤ 1, 2 sau ≥ 3), terapia de inducție (R-CHOP, R-CVP sau R-FCM) și indiferent de calitatea răspunsului la tratamentul de inducție (RC, RCu sau RP). Analiza exploratorie a beneficiului tratamentului de întreținere a arătat un efect mai puțin pronunțat la pacienții vârstnici (> 70 ani), dar grupurile de testat au fost mici.



### Limfomul folicular refractar/recidivat

Într-un studiu prospectiv, deschis, internațional, multicentric, de fază III, 465 pacienți cu limfom folicular recidivat/refractar au fost randomizați, într-o primă etapă, pentru terapia de inducție cu CHOP (ciclofosfamidă, doxorubicin, vincristina, prednison; n = 231) sau rituximab plus CHOP (R-CHOP, n = 234). Cele două grupuri de tratament au fost bine echilibrate cu privire la caracteristicile inițiale și statusul bolii. Un total de 334 pacienți care au prezentat remisiune completă sau parțială după terapia de inducție au fost randomizați, în a doua etapă, pentru terapia de întreținere (n = 167) sau observație (n = 167). Tratamentul de întreținere cu rituximab constă în administrarea unei perfuzii de rituximab, 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală la fiecare 3 luni, pentru o perioadă de maximum doi ani sau până la progresia bolii.

Analiza finală a eficacității a inclus toți pacienții randomizați în ambele etape ale studiului. După o perioadă de observație de 31 luni pentru pacienții randomizați în etapa de inducție, rezultatele pentru brațul R-CHOP au fost semnificativ îmbunătățite comparativ cu brațul CHOP, la pacienții cu limfom folicular recidivat/refractar (vezi Tabel 10).

**Tabel 10** Etapa de inducție: profilul eficacității, rezultate pentru CHOP față de R-CHOP (timp median de observație 31 luni)

	CHOP	R-CHOP	Valoarea p	Reducerea riscului <sup>1)</sup>
<b>Eficacitate primară</b>				
RRG <sup>2)</sup>	74%	87%	0,0003	na
RC <sup>2)</sup>	16%	29%	0,0005	na
RP <sup>2)</sup>	58%	58%	0,9449	na

<sup>1)</sup> Estimările au fost calculate pe baza rapoartelor de risc

<sup>2)</sup> Ultimul răspuns tumoral evaluat de investigator. Testul statistic “primar” pentru “răspuns” a fost testul trend pentru RC versus RP versus non-responsivi (p < 0,0001)

Abrevieri: na, nu este disponibil; RRG: rata de răspuns globală; RC: răspuns complet; RP: răspuns parțial

Pentru pacienții randomizați în etapa de întreținere a studiului, timpul median de observație a fost de 28 luni. Tratamentul de întreținere cu rituximab duce la o îmbunătățire semnificativă statistic și relevantă clinic a obiectivului primar al studiului, SFP, (timpul de la randomizare în etapa de întreținere până la recădere, progresia bolii sau deces) comparativ cu brațul observațional (p < 0,0001 testul log-rank). Valoarea mediană a SFP a fost de 42,2 luni în brațul cu rituximab ca tratament de întreținere comparativ cu 14,3 luni în brațul observațional. Folosind analiza de regresie cox, riscul de boală progresivă sau deces a fost redus cu 61% în brațul cu rituximab ca tratament de întreținere comparativ cu brațul observațional (ÎÎ 95%, 45% - 72%). Estimările ratelor fără progresie Kaplan-Meier la 12 luni au fost de 78% în grupul cu rituximab față de 57% în grupul observațional. O analiză a supraviețuirii globale a confirmat beneficiul semnificativ al tratamentului de întreținere cu rituximab comparativ cu grupul observațional (p = 0,0039 testul log-rank). Tratamentul de întreținere cu rituximab reduce riscul de deces cu 56% (ÎÎ 95%; 22% - 75%).

**Tabel 11 Etapa de întreținere: profilul eficacității, rezultate pentru rituximab față de brațul observațional (timp median de observație 28 luni)**

Parametri de Eficacitate	Timpul median estimat până la eveniment conform Kaplan-Meier (luni)			Reducerea riscului
	Observație (N = 167)	Rituximab (N = 167)	Log-rank valoarea p	
Supraviețuirea fără progresie (SFP)	14,3	42,2	< 0,0001	61%
Supraviețuirea globală	NR	NR	0,0039	56%
Timpul până la un nou tratament pentru limfom	20,1	38,8	< 0,0001	50%
Supraviețuirea fără semne de boală <sup>a</sup>	16,5	53,7	0,0003	67%
Subgrup de analiză SFP				
CHOP	11,6	37,5	< 0,0001	71%
R-CHOP	22,1	51,9	0,0071	46%
RC	14,3	52,8	0,0008	64%
PR	14,3	37,8	< 0,0001	54%
OS				
CHOP	NR	NR	0,0348	55%
R-CHOP	NR	NR	0,0482	56%

NR: neatins; <sup>a</sup>: aplicabil numai la pacienții care au prezentat RC

Beneficiul tratamentului de întreținere cu rituximab a fost confirmat în toate subgrupurile analizate, indiferent de schema terapeutică de inducție (CHOP sau R-CHOP) sau de calitatea răspunsului la tratamentul de inducție (RC sau RP) (Tabel 11). Tratamentul de întreținere cu rituximab a prelungit semnificativ valoarea mediană a SFP la pacienții care au răspuns la terapia de inducție cu CHOP (valoarea mediană a SFP de 37,5 luni față de 11,6 luni,  $p < 0,0001$ ), precum și la cei care au răspuns la terapia de inducție cu R-CHOP (valoarea mediană a SFP 51,9 luni față de 22,1 luni,  $p < 0,0071$ ). Tratamentul de întreținere cu rituximab aduce un beneficiu semnificativ în termeni de supraviețuire globală, atât pentru pacienții care au răspuns la CHOP, cât și pentru cei care au răspuns la R-CHOP, deși subgrupurile au fost mici și este necesară o monitorizare mai lungă pentru confirmarea acestei observații.

#### Limfom non-Hodgkin difuz cu celulă mare B, la pacienții adulți

Într-un studiu randomizat deschis, un total de 399 pacienți vârstnici (cu vârste între 60 și 80 ani) netratați anterior, cu limfom non-Hodgkin difuz cu celulă mare B, au primit chimioterapia standard CHOP (ciclofosamidă 750 mg/m<sup>2</sup>, doxorubicină 50 mg/m<sup>2</sup>, vincristină 1,4 mg/m<sup>2</sup> până la maximum 2 mg în ziua 1 și prednisolon 40 mg/m<sup>2</sup> și zi în zilele 1-5) la fiecare 3 săptămâni timp de 8 cicluri de tratament sau rituximab 375 mg/m<sup>2</sup> plus CHOP (R-CHOP). Rituximabul a fost administrat în prima zi a ciclului de tratament.

Analiza finală a eficacității a inclus toți pacienții randomizați (197 CHOP, 202 R-CHOP), cu un timp median de monitorizare de aproximativ 31 luni. Cele două grupuri de tratament au fost bine echilibrate în ceea ce privește caracteristicile inițiale și statusul bolii. Analiza finală confirmă că tratamentul cu R-CHOP a fost asociat cu o îmbunătățire relevantă clinic și semnificativă statistic a duratei de supraviețuire fără evenimente (parametrii eficacității primare; în cazurile în care evenimentele au fost decesul, recăderea sau progresia limfomului sau instituirea unui nou tratament anti-limfom) ( $p = 0,0001$ ). Estimările Kaplan-Meier ale timpului median de supraviețuire fără evenimente au fost de 35 luni în brațul R-CHOP comparativ cu 13 luni în brațul CHOP, reprezentând o reducere a riscului de 41%. La 24 luni, estimările pentru supraviețuirea globală au fost de 68,2% în brațul R-CHOP comparativ cu 57,4% în brațul CHOP. O analiză subsecventă a supraviețuirii globale, efectuată într-o

perioadă mediană de monitorizare de 60 luni, a confirmat beneficiile tratamentului cu R-CHOP față de tratamentul cu CHOP ( $p = 0,0071$ ), reprezentând o reducere a riscului de 32%.

Analiza tuturor parametrilor secundari (ratele de răspuns, supraviețuirea fără progresia bolii, supraviețuirea fără semne de boală, durata răspunsului) demonstrează efectele tratamentului cu R-CHOP comparativ cu tratamentul cu CHOP. Rata răspunsului complet după 8 cicluri de tratament a fost de 76,2% în grupul R-CHOP și de 62,4% în grupul CHOP ( $p = 0,0028$ ). Riscul de progresie a bolii a fost redus cu 46% iar riscul de recădere cu 51%. În toate subgrupurile de pacienți (sex, vârstă, IPI ajustat în funcție de vârstă, stadiul Ann Arbor, ECOG,  $\beta_2$ -microglobulina, LDH, albumina, simptomele B, masa tumorală mare, localizările extraganglionare, afectarea măduvei osoase), ratele de risc pentru supraviețuirea fără evenimente și supraviețuirea globală (R-CHOP comparativ cu CHOP) au fost mai mici de 0,83 respectiv 0,95.

R-CHOP a fost asociat cu îmbunătățirea rezultatelor atât a pacienților cu risc mare cât și a celor cu risc mic, în concordanță cu IPI ajustat în funcție de vârstă.

#### Rezultate ale testelor clinice de laborator

La 67 pacienți testați pentru anticorpi umani antișoarece (HAMA), nu s-a observat niciun răspuns. Din 356 pacienți testați pentru anticorpi anti-medicament (ADA), 1,1% (4 pacienți) au fost pozitivi.

#### Leucemia limfocitară cronică (LLC)

În două studii deschise, randomizate, un număr total de 817 pacienți netratați anterior și 552 pacienți cu LLC cu recăderi/refractoră au fost randomizați să primească fie chimioterapie FC (fludarabină 25 mg/m<sup>2</sup>, ciclofosamidă 250 mg/m<sup>2</sup>, în zilele 1-3) la fiecare 4 săptămâni pentru 6 cicluri, fie rituximab în asociere cu FC (R-FC). Rituximabul a fost administrat în doză de 375 mg/m<sup>2</sup> în timpul primului ciclu, cu o zi înainte de chimioterapie și în doză de 500 mg/m<sup>2</sup> în ziua 1 a fiecărui ciclu ulterior de tratament. Pacienții au fost excluși din studiu, în LLC cu recăderi/refractoră, dacă au fost tratați anterior cu anticorpi monoclonali sau dacă au fost refractari (definit ca eșec de a obține o remisiune parțială pentru cel puțin 6 luni) la fludarabină sau orice analog nucleozidic. Un număr total de 810 pacienți (403 R-FC, 407 FC) din studiul de primă linie (Tabel 12a și Tabel 12b) și 552 pacienți (276 R-FC, 276 FC) din studiul în LLC cu recăderi/refractoră (Tabel 13) au fost analizați pentru eficacitate.

În studiul de primă linie, după un timp median de observație de 48,1 luni, valoarea mediană a SFP a fost de 55 luni în grupul R-FC și de 33 luni în grupul FC ( $p < 0,0001$ , testul log-rank). Analiza supraviețuirii globale a arătat un beneficiu semnificativ al tratamentului R-FC față de chimioterapia FC singură ( $p = 0,0319$ , testul log-rank) (Tabel 12a). Beneficiul în termenii SFP a fost observat în majoritatea subgrupurilor de pacienți analizate conform cu riscul de boală la momentul inițial (de exemplu stadii A-C Binet) (Tabel 12b).

**Tabel 12a** Tratamentul de primă linie al LLC  
Privire generală asupra rezultatelor eficacității pentru rituximab plus FC vs. monoterapia FC - timp median de observație 48,1 luni

Parametri de Eficacitate	Timp median estimat până la eveniment conform Kaplan-Meier (luni)			Reducerea riscului
	FC (N = 409)	R-FC (N = 408)	Valoarea p (testul log-rank)	
Supraviețuirea fără progresie (SFP)	32,8	55,3	< 0,0001	45%
Supraviețuirea globală	NR	NR	0,0319	27%
Supraviețuirea fără evenimente	31,3	51,8	< 0,0001	44%
Rata de răspuns (RC, nRP, sau RP)	72,6%	85,8%	< 0,0001	n.a.
Ratele RC	16,9%	36,0%	< 0,0001	n.a.
Durata răspunsului*	36,2	57,3	< 0,0001	44%
Supraviețuirea fără semne de boală (DFS)**	48,9	60,3	0,0520	31%
Timpul până la un nou tratament	47,2	69,7	< 0,0001	42%

Rata de răspuns și ratele RC au fost analizate folosind Testul Chi-pătrat. NR: neatins; n.a. nu este disponibil

\*: aplicabil numai la pacienții care au prezentat un RC, nRP, RP

\*\*: aplicabil numai la pacienții care au prezentat un RC

**Tabel 12b** Tratamentul de primă linie al LLC  
Rapoartele de risc ale supraviețuirii fără progresie conform stadiului Binet (ITT) - timp median de observație 48,1 luni

Supraviețuirea fără progresie (SFP)	Număr de pacienți		Raport de risc (ÎI 95%)	valoare p (test Wald, neajustat)
	FC	R-FC		
Stadiu A Binet	22	18	0,39 (0,15; 0,98)	0,0442
Stadiu B Binet	259	263	0,52 (0,41; 0,66)	< 0,0001
Stadiu C Binet	126	126	0,68 (0,49; 0,95)	0,0224

ÎI: Interval de încredere

În studiul în LLC cu recăderi/refractoră, valoarea mediană a supraviețuirii fără progresie (obiectivul primar) a fost de 30,6 luni în grupul R-FC și de 20,6 luni în grupul FC ( $p = 0,0002$ , testul log-rank). Beneficiul în termenii SFP a fost observat la aproape toate subgrupurile de pacienți analizate conform riscului de boală la momentul inițial. A fost raportată o ușoară dar nesemnificativă îmbunătățire în supraviețuirea globală în brațul R-FC comparativ cu brațul FC.

**Tabel 13** Tratamentul LLC cu recăderi/refractoră - Privire generală asupra rezultatelor eficacității pentru rituximab plus FC vs. monoterapia FC (timp median de observație 25,3 luni)

Parametri de Eficacitate	Timp median estimat până la eveniment conform Kaplan-Meier (luni)			Reducerea riscului
	FC (N = 276)	R-FC (N = 276)	Valoarea p (testul log-rank)	
Supraviețuirea fără progresie (SFP)	20,6	30,6	0,0002	35%
Supraviețuirea globală	51,9	NR	0,2874	17%
Supraviețuirea fără evenimente	19,3	28,7	0,0002	36%
Rata de răspuns (RC, nRP, sau RP)	58,0%	69,9%	0,0034	n.a.

Parametri de Eficacitate	Timp median estimat până la eveniment conform Kaplan-Meier (luni)			Reducerea riscului
	FC (N = 276)	R-FC (N = 276)	Valoarea p (testul log-rank)	
Ratele RC	13,0%	24,3%	0,0007	n.a.
Durata răspunsului*	27,6	39,6	0,0252	31%
Supraviețuirea fără semne de boală (DFS)**	42,2	39,6	0,8842	-6%
Timpul până la un nou tratament pentru LLC	34,2	NR	0,0024	35%

*Rata de răspuns și ratele RC au fost analizate folosind Testul Chi-pătrat.*

\*: aplicabil numai la pacienții care au prezentat un RC, nRP, RP; NR: neatins

n.a. nu este disponibil

\*\* : aplicabil numai la pacienții care au prezentat un RC;

Rezultatele din alte studii de suport care folosesc rituximab în asociere cu alte scheme de chimioterapie (inclusiv CHOP, FCM, PC, PCM, bendamustină și cladribină) pentru tratamentul pacienților cu LLC netratată anterior și/sau cu recăderi/refractară au demonstrat, de asemenea, rate de răspuns global cu beneficiu în termenii ratelor SFP, deși cu o toxicitate ușor mai crescută (în special mielotoxicitate). Aceste studii susțin utilizarea de rituximab fără nicio chimioterapie.

Date de la aproximativ 180 pacienți tratați anterior cu rituximab au demonstrat beneficiu clinic (inclusiv RC) și susțin repetarea tratamentului cu rituximab.

### Copii și adolescenți

S-a efectuat un studiu randomizat, multi-centric, deschis de chimioterapia destinată limfomului Malin B (LMB) (corticosteroizi, vincristină, ciclofosfamidă, metotrexat în doze mari, citarabină, doxorubicină, etoposid și terapie intratecală cu trei medicamente [metotrexat/citarabină/corticosteroid]) singură sau în asociere cu rituximab la pacienții copii și adolescenți cu DLBCL/BL/BAL/BLL, cu marker CD20 pozitiv, în stadiu avansat, netratat anterior. Stadiul avansat este definit ca Stadiul III cu nivel ridicat de LDH („B ridicate”), (LDH > dublul limitei superioare a valorilor normale ale unui pacient adult [ $> N \times 2$ ]) sau orice stadiu IV sau BAL. Pacienții au fost randomizați pentru a li se administra fie chimioterapie LMB, fie șase perfuzii intravenoase cu rituximab la o doză de 375 mg/m<sup>2</sup> suprafață corporală în asociere cu chimioterapia LMB (două în timpul fiecăreia din cele două cicluri de tratament de inducție și una în timpul fiecăreia din cele două cicluri de tratament de consolidare) conform schemei destinate LMB. În analiza de eficacitate s-a inclus un număr total de 328 pacienți randomizați, dintre care un pacient cu vârsta sub 3 ani a primit rituximab în asociere cu chimioterapia LMB.

Cele două brațe de tratament, LMB (chimioterapia LMB) și R-LMB (chimioterapia LMB cu rituximab) au fost bine echilibrate în ceea ce privește caracteristicile de referință. Pacienții au avut o vârstă medie cuprinsă între 7 și 8 ani în brațul LMB și respectiv brațul R-LMB. Aproximativ jumătate dintre pacienți erau în Grupul B (50,6% în brațul LMB și 49,4% în brațul R-LMB), 39,6% în Grupul C1 în ambele brațe și 9,8% și 11,0% erau în Grupul C3 în brațele LMB și respectiv R-LMB. Pe baza stadializării Murphy, majoritatea pacienților sufereau fie de BL în stadiul III (45,7% în brațul LMB și 43,3% în brațul R-LMB), fie de BAL, SNC negativ (21,3% în brațul LMB și 24,4% în brațul R-LMB). Mai puțin de jumătate dintre pacienți (45,1% în ambele brațe) prezentau o afectare a măduvei osoase, iar majoritatea pacienților (72,6% în brațul LMB și 73,2% în brațul R-LMB) nu au prezentat o afectare a SNC. Obiectivul principal al eficacității a fost EFS, unde un eveniment a fost definit ca apariția unei boli progresive, recidivă, a doua malignitate, deces din orice cauză sau lipsa răspunsului, după cum se evidențiază prin detectarea celulelor viabile în reziduuri după cel de-al doilea ciclu de tratament CYVE, indiferent care apare primul. Obiectivele secundare ale eficacității au fost SG și RC (remisiunea completă).

La analiza intermediară pre-specificată, cu aproximativ un an de monitorizare mediană, s-a observat o îmbunătățire relevantă din punct de vedere clinic a obiectivului principal al SFE, cu estimări ale ratei la un an de 94,2% (Î 95%, 88,5% - 97,2%) în brațul R-LMB comparativ cu 81,5% (Î 95%, 73,0% - 87,8%) în brațul LMB și Cox RR ajustat 0,33 (Î 95%, 0,14 - 0,79). La recomandarea IDMC

(comitetul independent de monitorizare a datelor) pe baza acestui rezultat, randomizarea a fost oprită, iar pacienților din brațul LMB li s-a permis să treacă pe rituximab. Analizele de eficacitate primară au fost efectuate la 328 de pacienți randomizați cu o monitorizare mediană de 3,1 ani. Rezultatele sunt descrise în Tabelul 14.

**Tabel 14 Prezentarea generală a rezultatelor de eficacitate primară (populația ITT)**

<b>Analiza</b>	<b>LMB (N = 164)</b>	<b>R-LMB (N=164)</b>
<b>SFE</b>	28 evenimente	10 evenimente
	Valoarea p a testului log-rank unilateral 0,0006	
	Cox RR ajustat 0,32 (ÎÎ 90%: 0,17, 0,58)	
<b>Ratele SFE pe o perioadă de 3 ani</b>	82,3% (ÎÎ 95%: 75,7%, 87,5%)	93,9% (ÎÎ 95%: 89,1%, 96,7%)
<b>Supraviețuire globală</b>	20 decese	8 decese
	Valoarea p a testului log-rank unilateral 0,0061	
	Cox HR ajustat 0,36 (ÎÎ 95%: 0,16; 0,81)	
<b>Ratele de supraviețuire globală pe o perioadă de 3 ani</b>	87,3% (ÎÎ 95%: 81,2%, 91,6%)	95,1% (ÎÎ 95%: 90,5%, 97,5%)
<b>Rata RC</b>	93,6% (ÎÎ 95%: 88,2%; 97,0%)	94,0% (ÎÎ 95%: 88,8%, 97,2%)

Analiza de eficacitate primară a indicat un beneficiu SFE al rituximabului în plus față de chimioterapia LMB peste chimioterapia LMB administrată individual, cu o SFE RR 0,32 (ÎÎ 90% 0,17 - 0,58) dintr-o analiză de regresie Cox care se adaptează la grupul național, histologie și grup terapeutic. Deși nu au fost observate diferențe majore între cele două grupuri de tratament privind numărul de pacienți care au prezentat RC, beneficiul adăugării rituximabului la chimioterapia LMB a fost, de asemenea, indicat în obiectivul secundar al SG, cu SG RR de 0,36 (ÎÎ 95%, 0,16 - 0,81).

Agenția Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu rituximab la toate subgrupele de copii și adolescenți în limfomul folicular și LLC și la populația de copii și adolescenți de la naștere și până la < 6 luni în limfomul difuz cu celulă mare B, cu marker CD20 pozitiv (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

#### Experiența clinică în poliartrita reumatoidă

Eficacitatea și siguranța tratamentului cu rituximab în remiterea semnelor și simptomelor poliartritei reumatoide la pacienții cu un răspuns inadecvat la inhibitori TNF au fost demonstrate într-un studiu clinic pivot, multicentric, randomizat, controlat, dublu-orb (Studiul clinic 1).

Studiul clinic 1 a evaluat 517 pacienți care au prezentat un răspuns inadecvat sau intoleranță la una sau mai multe terapii cu inhibitori TNF. Pacienții eligibili au fost diagnosticați cu poliartrită reumatoidă activă, conform criteriilor Colegiului American de Reumatologie (ACR). Rituximabul a fost administrat în două perfuzii intravenoase la interval de 15 zile. Pacienții au primit 2 x 1000 mg perfuzii intravenoase de rituximab sau placebo în asociere cu MTX. Toți pacienții au primit concomitent 60 mg prednison oral, în zilele 2-7 și 30 mg în zilele 8-14, după prima perfuzie. Obiectivul primar a fost proporția de pacienți care realizează un răspuns ACR20 în săptămâna 24. Pentru obiectivele pe termen lung, pacienții au fost monitorizați și după săptămâna 24, inclusiv evaluarea radiografică la 56 săptămâni și la 104 săptămâni. Ca urmare a extensiei protocolului ca studiu deschis, 81% dintre pacienți, din grupul placebo stabilit inițial, au primit rituximab în intervalul dintre săptămâna 24 și 56.

Studiile clinice cu rituximab la pacienții cu poliartrită în stadiu incipient (pacienți care nu au fost tratați anterior cu metotrexat și pacienți care au avut un răspuns inadecvat la metotrexat, dar care nu au fost încă tratați cu inhibitori TNF-alfa) și-au atins obiectivul primar. Rituximabul nu este indicat acestor pacienți, deoarece datele de siguranță ale tratamentului pe termen lung cu rituximab sunt insuficiente, mai ales în ceea ce privește riscul dezvoltării malignităților și LMP.

#### Rezultatele activității bolii

Rituximabul în asociere cu metotrexat a crescut semnificativ proporția pacienților care au prezentat o îmbunătățire cu cel puțin 20% a scorului ACR comparativ cu pacienții tratați cu metotrexat în monoterapie (Tabel 15). În toate studiile de dezvoltare, beneficiul tratamentului pentru pacienți a fost similar, independent de vârstă, sex, suprafață corporală, rasă, numărul tratamentelor anterioare și statusul bolii.

O îmbunătățire semnificativă clinic și statistic a fost, de asemenea, observată în toate componentele individuale ale răspunsului ACR (numărul articulațiilor inflamate și sensibile, evaluarea globală a pacientului și medicului, index scor de dizabilitate (HAQ), evaluarea durerii și Proteina C Reactivă (mg/dl).

**Tabel 15 Rezultatele răspunsului clinic privind obiectivul primar în Studiul clinic 1 (Populație ITT)**

	Rezultat <sup>†</sup>	Placebo+MTX	Rituximab+MTX (2 x 1000 mg)
Studiul clinic 1		N = 201	N = 298
	ACR20	36 (18%)	153 (51%)***
	ACR50	11 (5%)	80 (27%)***
	ACR70	3 (1%)	37 (12%)***
	Răspuns EULAR (Bun/Moderat)	44 (22%)	193 (65%)***
	Media modificării DAS	-0,34	-1,83***

<sup>†</sup>Rezultat la 24 săptămâni

Diferență semnificativă față de placebo + MTX la momentul principal de evaluare: \*\*\*p ≤ 0,0001

Pacienții tratați cu rituximab în asociere cu metotrexat au prezentat o reducere semnificativ mai mare a scorului activității bolii (DAS28) comparativ cu pacienții tratați cu metotrexat în monoterapie (Tabel 15). Similar, un număr semnificativ mai mare de pacienți tratați cu rituximab și metotrexat au prezentat un răspuns *European League Against Rheumatism* (EULAR) bun până la moderat, comparativ cu pacienții tratați cu metotrexat în monoterapie (Tabel 15).

#### Răspuns radiografic

Afectarea structurală a articulației a fost evaluată radiografic și exprimată prin modificare în Scorul Sharp Total modificat (mTSS) și a componentelor sale, scorul eroziunii articulare și scorul îngustării spațiului articular.

În Studiul clinic 1, la pacienții tratați cu rituximab în asociere cu metotrexat care au prezentat un răspuns inadecvat sau intoleranță la una sau mai multe terapii cu inhibitori TNF, s-a demonstrat la examenul radiografic, după 56 săptămâni, o progresie semnificativ mai redusă comparativ cu pacienții care au primit inițial metotrexat în monoterapie. La 81% dintre pacienții care au primit inițial metotrexat în monoterapie, s-a administrat rituximab fie ca terapie de salvare în intervalul dintre săptămânile 16-24, fie ca urmare a extensiei studiului înainte de săptămâna 56. De asemenea, o proporție mai mare de pacienți cărora li s-a administrat inițial rituximab/MTX nu a prezentat progresie erozivă în intervalul de 56 săptămâni (Tabel 16).

**Tabel 16 Rezultate radiografice la 1 an (populația mITT)**

	Placebo+MTX	Rituximab+MTX 2 x 1000 mg
<b>Studiul clinic 1</b>	(n = 184)	(n = 273)
Modificarea medie de la momentul inițial:		
Scor Sharp total modificat	2,30	1,01*
Scorul eroziunii articulare	1,32	0,60*
Scorul îngustării spațiului articular	0,98	0,41**
Proporția de pacienți fără modificări radiografice	46%	53%, NS
Proporția de pacienți fără modificare erozivă	52%	60%, NS

150 pacienți randomizați inițial cu placebo + MTX în Studiul clinic 1 au primit cel puțin o serie de tratament de RTX + MTX pe o perioadă de un an \*p < 0,05, \*\*p < 0,001. Abreviere: NS, ne semnificativ

De asemenea, a fost observată pe termen lung inhibarea ratei afectării articulare progresive. Analiza radiografică la 2 ani în Studiul clinic 1 a demonstrat reducerea semnificativă a progresiei afectării structurii articulare la pacienții care au primit rituximab în asociere cu metotrexat, comparativ cu cei cu metotrexat în monoterapie, precum și o proporție semnificativ mai mare de pacienți fără progresia afectării articulare pe o perioadă de 2 ani.

#### *Rezultate privind funcția fizică și calitatea vieții*

La pacienții tratați cu rituximab s-a observat o reducere semnificativă a indexului de dizabilitate (HAQ-DI) și a scorului fatigabilității (FACIT-Fatigabilitate), comparativ cu pacienții tratați cu metotrexat în monoterapie. Proporția pacienților tratați cu rituximab arată o diferență importantă clinic minimă (MCID) a HAQ-DI (definit ca reducere a scorului total individual > 0,22) și a fost de asemenea mai mare decât în rândul pacienților tratați cu metotrexat în monoterapie (Tabel 17).

Îmbunătățirea semnificativă a stării de sănătate raportată la calitatea vieții a fost de asemenea observată cu îmbunătățirea semnificativă a scorului de sănătate fizică (PHS) și a scorului de sănătate mentală (MHS) a SF-36. Ulterior, o proporție semnificativ mai mare de pacienți a atins MCID pentru aceste scoruri (Tabel 17).

**Tabel 17 Rezultatele privind funcția fizică și calitatea vieții la săptămâna 24 în Studiul clinic 1**

Rezultat†	Placebo+MTX X	Rituximab+MTX (2 x 1000 mg)
	n = 201	n = 298
Modificarea medie a HAQ-DI	0,1	-0,4***
% HAQ-DI MCID	20%	51%
Modificarea medie a FACIT-T	-0,5	-9,1***
	n = 197	n = 294
Modificarea medie a SF-36 PHS	0,9	5,8***
% SF-36 PHS MCID	13%	48%***
Modificarea medie a SF-36 MHS	1,3	4,7**
% SF-36 MHS MCID	20%	38%*

†Rezultat la săptămâna 24



Diferența semnificativă față de placebo la momentul principal de evaluare:

\*p < 0,05, \*\*p < 0,001 \*\*\*p ≤ 0,0001 MCID HAQ-DI ≥ 0,22, MCID SF-36 PHS > 5,42, MCID SF-36 MHS > 6,33

### Eficacitatea la pacienții seropozitivi la autoanticorpi (RF și/sau anti-CCP)

Pacienții seropozitivi la Factorul Reumatoid (RF) și/sau anticorpii îndreptați împotriva peptidelor citrinate ciclic (anti-CCP) care au fost tratați cu rituximab în asociere cu metotrexat au arătat un răspuns crescut comparativ cu pacienții negativi la ambele.


Rezultatele eficacității la pacienții tratați cu rituximab au fost analizate pe baza statusului autoanticorpilor înainte de începerea tratamentului. La săptămâna 24, pacienții care au fost seropozitivi la RF și/sau anti-CCP la momentul inițial au avut o probabilitate semnificativ crescută de realizare a răspunsurilor ACR20 și 50 comparativ cu pacienții seronegativi (p = 0,0312 și p = 0,0096) (Tabel 18). Aceste constatări au fost repetate la săptămâna 48, când autoanticorpii seropozitivi au crescut de asemenea semnificativ probabilitatea realizării ACR70. La săptămâna 48 pacienții seropozitivi au putut atinge răspunsuri ACR de 2-3 ori mai mult comparativ cu pacienții seronegativi. Pacienții seropozitivi au prezentat o scădere semnificativ mai mare în DAS28-ESR comparativ cu pacienții seronegativi (Figura 1).

**Tabel 18 Rezumatul eficacității statusului autoanticorpilor la momentul inițial**

	Săptămâna 24		Săptămâna 48	
	Seropozitivi (n = 514)	Seronegativi (n = 106)	Seropozitivi (n = 506)	Seronegativi (n = 101)
ACR20 (%)	62,3*	50,9	71,1*	51,5
ACR50 (%)	32,7*	19,8	44,9**	22,8
ACR70 (%)	12,1	5,7	20,9*	6,9
Răspuns EULAR (%)	74,8*	62,9	84,3*	72,3
Media modificării DAS28-ESR	-1,97**	-1,50	-2,48***	-1,72

Nivelurile semnificative au fost definite ca \*p < 0,05, \*\*p < 0,001, \*\*\*p < 0,0001.


**Figura 1: Modificare față de momentul inițial a DAS28-ESR prin statusul autoanticorpilor la momentul inițial**



### *Eficacitatea pe termen lung în curele multiple de tratament*

Tratamentul cu rituximab în asociere cu metotrexat pe parcursul curelor multiple de tratament a condus la îmbunătățiri susținute ale semnelor și simptomelor clinice ale PR, așa cum este evidențiat prin răspunsurile ACR, DAS28-ESR și EULAR care au fost evidente în toate populațiile de pacienți studiate (Figura 2). A fost observată îmbunătățirea funcției fizice, așa cum este indicat în scorul HAQ-DI și proporția de pacienți care au realizat MCID pentru HAQ-DI.

**Figura 2: Răspunsurile ACR pentru 4 serii de tratament (24 săptămâni după fiecare serie (între pacienți, între vizite)) la pacienți cu un răspuns inadecvat la inhibitori TNF (n = 146)**



### *Evaluări clinice de laborator*

Un total de 392/3095 (12,7%) pacienți cu poliartrită reumatoidă au fost ADA pozitivi, în studiile clinice, după terapia cu rituximab. La majoritatea pacienților, apariția ADA nu a fost asociată cu deteriorare clinică sau cu un risc crescut de reacții la perfuziile ulterioare. Prezența ADA poate fi asociată cu agravarea reacțiilor alergice sau legate de perfuzie după a doua perfuzie a seriilor ulterioare de tratament.

### *Copii și adolescenți*

Agenția Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu rituximab la toate subgrupele de copii și adolescenți în artrita autoimună (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

### *Experiența clinică în granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA)*

#### *Inducția remisiunii la adulți*

În Studiul 1 privind GPA/MPA, un număr total de 197 pacienți cu vârsta de 15 ani sau mai mare, cu GPA activă, severă (75%) și MPA (24%) au fost înrolați și tratați într-un studiu clinic de non-inferioritate, multicentric, controlat cu placebo, dublu-orb, randomizat, cu comparator activ.

Pacienții au fost randomizați în raport de 1:1 pentru a li se administra fie ciclofosamidă pe cale orală zilnic (2 mg/kg/zi) timp de 3-6 luni, fie rituximab (375 mg/m<sup>2</sup>) o dată pe săptămână timp de 4 săptămâni. Toți pacienții din brațul cu ciclofosamidă au utilizat tratament de întreținere cu azatioprină în perioada de monitorizare. Pacienților din ambele brațe li s-au administrat 1000 mg de metilprednisonol (sau alt corticosteroid în doză echivalentă) pe zi, intravenos (IV) în puls terapie, timp de 1 până la 3 zile, urmat de prednison pe cale orală (1 mg/kg/zi, fără a depăși 80 mg/zi).

Scăderea treptată a dozei de prednison s-a realizat astfel încât tratamentul să se desfășoare pe durata a 6 luni de la începerea studiului clinic.

Criteriul final primar a fost obținerea remisiunii complete la 6 luni, definită după scorul Birmingham al gradului de activitate al vasculitelor pentru granulomatoza Wegener (BVAS/WG) ca 0, și întreruperea tratamentului cu glucocorticoizi. Limita de non-inferioritate predefinită pentru diferența între tratamente a fost de 20%. Studiul a demonstrat non-inferioritatea tratamentului cu rituximab față de ciclofosfamidă pentru remisiunea completă (RC) la 6 luni (Tabel 19).

Eficacitatea a fost observată atât pentru pacienții nou diagnosticați cât și pentru pacienții cu recădere (Tabel 20).

**Tabel 19 Procentul de pacienți adulți care au obținut remisiune completă la 6 luni (populația cu intenție de tratament\*)**

	<b>Rituximab (n = 99)</b>	<b>Ciclofosfamidă (n = 98)</b>	<b>Diferența între tratamente (rituximab-ciclofosfamidă)</b>
Rata	63,6%	53,1%	10,6% 95,1% <sup>b</sup> Î -3,2%, 24,3%) <sup>a</sup>
<p>– Î = interval de încredere.                      – * Situația cea mai nefavorabilă  <sup>a</sup> Non-inferioritatea a fost demonstrată deoarece cea mai scăzută valoare (-3,2%) a fost mai mare decât limita de non-inferioritate predeterminată (-20%).  <sup>b</sup> Indicele de încredere 95,1% reflectă o creștere de 0,001 alpha la calculul pentru o analiză interimară a eficacității.</p>			

**Tabel 20 Remisiunea completă la 6 luni definită prin statusul bolii**

	<b>Rituximab</b>	<b>Ciclofosfamidă</b>	<b>Diferența (Î 95%)</b>
<b>Numărul total de pacienți</b>	n = 99	n = 98	
<b>Nou diagnosticați</b>	n = 48	n = 48	
<b>Cu recădere</b>	n = 51	n = 50	
<b>Remisiune completă</b>			
<b>Numărul total de pacienți</b>	63,6%	53,1%	10,6% (-3,2; 24,3)
<b>Nou diagnosticați</b>	60,4%	64,6%	-4,2% (-23,6; 15,3)
<b>Cu recădere</b>	66,7%	42,0%	24,7% (5,8; 43,6)

Situația cea mai nefavorabilă se aplică pentru pacienții cu date lipsă

#### *Remisiune completă la 12 luni și 18 luni*

În grupul tratat cu rituximab, 48% dintre pacienți au obținut RC la 12 luni și 39% dintre pacienți au obținut RC la 18 luni. În cazul pacienților tratați cu ciclofosfamidă (urmată de azatioprină pentru întreținerea remisiunii complete), 39% dintre pacienți au obținut remisiune completă la 12 luni, iar 33% dintre pacienți au obținut RC la 18 luni. De la luna a 12-a la luna a 18-a, au fost observate în grupul tratat cu rituximab 8 cazuri de recăderi comparativ cu patru în grupul tratat cu ciclofosfamidă.

#### *Evaluări de laborator*

Un total de 23/99 (23%) de pacienți tratați cu rituximab din cadrul studiului clinic privind inducția remisiunii au fost ADA pozitivi la 18 luni. Niciunul dintre cei 99 pacienți tratați cu rituximab nu au fost ADA pozitivi la screening. Nu a existat nicio tendință vizibilă sau un efect negativ aparent al prezenței ADA asupra profilului de siguranță și eficacitate în cadrul studiului de inducție a remisiunii.

### Tratamentul de întreținere la adulți

Într-un studiu prospectiv, multicentric, controlat, deschis, au fost randomizați în total 117 de pacienți (88 cu GPA, 24 cu MPA și 5 cu vasculită asociată cu ANCA și implicare exclusiv renală) cu remisiune a bolii pentru a primi azatioprină (59 pacienți) sau rituximab (58 pacienți). Pacienții incluși au avut vârste cuprinse între 21 și 75 de ani și boală nou diagnosticată sau recurentă aflată în remisiune completă după tratamentul combinat cu glucocorticoizi și ciclofosfamidă administrată în pulsterapie. Majoritatea pacienților au fost ANCA pozitivi la stabilirea diagnosticului sau în decursul evoluției bolii; au prezentat vasculită necrotizantă a vaselor mici, confirmată histologic, cu fenotip clinic de GPA sau MPA sau vasculită asociată cu ANCA și implicare exclusiv renală sau ambele tipuri de vasculită.

Terapia de inducție a remisiunii a constat din prednison intravenos, conform unei scheme de administrare la decizia medicului, precedat la unii pacienți de pulsterapie cu metilprednisolon, în asociere cu ciclofosfamidă în pulsuri până la obținerea remisiunii după 4-6 luni de tratament. La momentul respectiv și în interval de maximum 1 lună de la ultima doză de ciclofosfamidă, pacienții au fost randomizați pentru a primi fie rituximab (două perfuzii intravenoase de 500 mg la interval de două săptămâni una de cealaltă [în ziua 1 și ziua 15], urmate de o doză de 500 mg intravenos administrată la intervale de 6 luni timp de 18 luni), fie azatioprină (administrată pe cale orală în doză de 2 mg/kg/zi timp de 12 luni, apoi în doză de 1,5 mg/kg/zi timp de 6 luni și ulterior în doză de 1 mg/kg/zi timp de 4 luni [tratamentul a fost întrerupt după această perioadă de 22 luni]). Tratamentul cu prednison a fost administrat în doze reduse progresiv și apoi menținut în doză redusă (de aproximativ 5 mg pe zi) timp de cel puțin 18 luni după randomizare. Alegerea schemei de reducere a dozelor de prednison și decizia de oprire a tratamentului cu prednison după 18 luni au revenit medicului investigator.

Toți pacienții au fost urmăriți până în luna 28 (10 sau, respectiv, 6 luni după administrarea ultimei perfuzii de rituximab sau a ultimei doze de azatioprină). Profilaxia pentru pneumonia cu *Pneumocystis jirovecii* a fost obligatorie la toți pacienții cu număr al limfocitelor T CD4+ sub pragul de 250 celule pe milimetru cub.


Parametrul principal de evaluare a rezultatelor a fost rata episoadelor de recurență majoră la luna 28.

### *Rezultate*

La luna 28, au fost înregistrate cazuri de recurență majoră (definită prin reapariția semnelor clinice și/sau valorilor testelor de laborator indicând vasculită activă ([BVAS]> 0) care poate cauza leziuni la nivelul organelor sau insuficiență de organ sau poate pune viața în pericol) la 3 pacienți (5%) din grupul tratat cu rituximab și la 17 pacienți (29%) din grupul tratat cu azatioprină (p=0,0007). Recurențe minore (care nu pun viața în pericol sau nu implică leziuni majore la nivelul organelor) au fost înregistrate la șapte pacienți din grupul tratat cu rituximab (12%) și la opt pacienți din grupul tratat cu azatioprină (14%).

Curbele pentru rata de incidență cumulată au indicat faptul că intervalul de timp până la apariția primei recurențe majore a fost mai lung la pacienții tratați cu rituximab, începând din luna a 2-a și menținându-se până în luna 28 (Figura 3).

**Figura 3: Incidența cumulată în timp a apariției primei recurențe majore**



Procentul de pacienți cu prima recurență majoră															
Azatioprină	0	0	3	3	5	5	8	8	9	9	9	10	13	15	17
Rituximab	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Număr de pacienți aflați la risc															
Azatioprină	59	56	52	50	47	47	44	44	42	41	40	39	36	34	0
Rituximab	58	56	56	56	55	54	54	54	54	54	54	54	52	50	0

Notă: Pacienții au fost cenzurați la 28 de luni dacă nu au avut niciun eveniment

#### Evaluări de laborator

În total, 6 din 34 pacienți (18%) tratați cu rituximab în cadrul studiului clinic cu terapie de întreținere au dezvoltat anticorpi anti-medicament (ADA). Nu a existat nicio tendință sau un efect negativ aparent al prezenței ADA asupra profilului de siguranță și eficacitate în cadrul studiului clinic cu terapie de întreținere.

#### Copii și adolescenți

##### Granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA)

Studiul WA25615 (PePRS) a fost un studiu multicentric, deschis, cu un singur braț, fără braț de control, realizat la 25 de pacienți copii și adolescenți ( $\geq 2$  ani până la  $< 18$  ani) cu GPA sau MPA activă, severă. Vârsta mediană a pacienților din studiu a fost de: 14 ani (limite: 6-17 ani) iar majoritatea pacienților (20/25 [80%]) au fost de sex feminin. În total, 19 pacienți (76%) aveau GPA iar 6 pacienți (24%) aveau MPA la includerea în studiu. Optsprezece pacienți (72%) aveau boală nou diagnosticată la includerea în studiu (13 pacienți cu GPA și 5 pacienți cu MPA), iar 7 pacienți aveau boală recidivantă (6 pacienți cu GPA și 1 pacient cu MPA).

Design-ul studiului a constat dintr-o perioadă inițială de 6 luni de inducție a remisiunii, cu o perioadă de monitorizare de minimum 18 luni, până la maximum 54 de luni (4,5 ani), în total. Pacienții trebuiau să primească minimum 3 doze de metilprednisolon administrat intravenos (30 mg/kg/zi, fără a depăși 1 g/zi) înainte de prima perfuzie intravenoasă de rituximab. Dacă din punct de vedere clinic era indicat, s-au putut administra doze zilnice suplimentare (maximum trei) de metilprednisolon intravenos. Regimul terapeutic de inducție a remisiunii a constat din patru perfuzii intravenoase săptămânale de rituximab în doză de 375 mg/ m<sup>2</sup> SC, în zilele 1, 8, 15 și 22 ale studiului în combinație cu prednisolon

sau prednisone, administrate oral în doză de 1 mg/kg/zi (max 60 mg/zi), doză scăzută treptat la minimum 0,2 mg/kg/zi (max 10 mg/zi) până în Luna 6. După faza de inducție a remisiunii, conform deciziei investigatorului, pacienții au putut primi alte perfuzii de rituximab în sau după Luna 6, pentru a menține remisiunea PVAS și a controla activitatea bolii (inclusiv boala progresivă sau activare) sau de a obține prima remisiune.

Toți cei 25 de pacienți au primit toate cele patru perfuzii intravenoase săptămânale în faza de 6 luni de inducție a remisiunii. În total, 24 din 25 pacienți au finalizat minimum 18 luni de monitorizare.

Obiectivele acestui studiu au fost evaluarea siguranței, a parametrilor PK și eficacității rituximabului la pacienții copii și adolescenți cu GPA și MPA ( $\geq 2$  până la  $< 18$  ani). Obiectivele de eficacitate ale studiului au fost exploratorii, fiind evaluate în principal cu ajutorul scorului PVAS (Pediatric Vasculitis Activity Score) (Tabelul 21).

#### *Doza cumulativă de glucocorticoizi (administrați intravenos și oral) până în luna 6:*

Douăzeci și patru din 25 de pacienți (96%) din Studiul WA25615 au obținut o reducere a glucocorticoizilor administrați pe cale orală la 0,2 mg/kg/zi (sau mai puțin, ori egală cu 10 mg/zi, indiferent care a fost mai mică) la sau până în Luna 6 în timpul reducerii steroizilor administrați pe cale orală definiți în protocol.

A fost observată o scădere a mediane ratei totale de utilizare a glucocorticoizilor orali din săptămâna 1 (mediana = 45 mg doză echivalentă de prednison [IQR: 35 – 60]) până la Luna 6 (mediana = 7,5 mg [IQR: 4-10]), care s-a menținut ulterior la Luna 12 (mediana = 5 mg [IQR: 2-10]) și la Luna 18 (mediana = 5 mg [IQR: 1-5]).

#### *Tratamentul în faza de monitorizare*

În timpul perioadei totale a studiului, pacienților li s-au administrat între 4 și 28 perfuzii de rituximab (până la 4,5 ani [53,8 luni]). Pacienților li s-a administrat până la 375 mg/m<sup>2</sup> x 4 rituximab, aproximativ la fiecare 6 luni conform deciziei investigatorului. În total, un tratament suplimentar cu rituximab s-a administrat unui număr de 17 din 25 pacienți (68%) în sau după Luna 6 până la data închiderii comune, iar unui număr de 14 din acești 17 pacienți li s-au administrat un tratament suplimentar cu rituximab între Luna 6 și Luna 18.

**Tabel 21 Studiul WA25615 (PePRS) – Remisiunea PVAS până în Lunile 1, 2, 4, 6, 12 și 18**

Vizita de studiu	Numărul de respondenți cu remisiunea PVAS* (rata de răspuns [%]) n=25	ÎI 95% <sup>a</sup>
Luna 1	0	0,0%, 13,7%
Luna 2	1 (4,0%)	0,1%, 20,4%
Luna 4	5 (20,0%)	6,8%, 40,7%
Luna 6	13 (52,0%)	31,3%, 72,2%
Luna 12	18 (72,0%)	50,6%, 87,9%
Luna 18	18 (72,0%)	50,6%, 87,9%

\*Remisiunea PVAS este definită printr-un PVAS de 0 și doza de glucocorticoid scăzută treptat la 0,2 mg/kg/zi (sau 10 mg/zi, oricare e mai mică), la momentul evaluării.  
<sup>a</sup>rezultatele de eficacitate sunt exploratorii și nu s-au realizat analize statistice formale pentru aceste obiective  
Tratamentul cu rituximab (375 mg/m<sup>2</sup> x 4 perfuzii) până în Luna 6 a fost identic pentru toți pacienții.  
Tratamentul de monitorizare după Luna 6 a fost la latitudinea investigatorului.

#### *Evaluările de laborator*

În total, 4/25 pacienți (16%) au prezentat ADA în decursul perioadei totale de studiu. Date limitate

arată că nu a existat nicio tendință observată a reacțiilor adverse raportate la pacienții cu ADA pozitivi.

Nu a existat nicio tendință vizibilă sau un impact negativ al prezenței ADA asupra siguranței sau eficacității în studiile clinice cu pacienți copii și adolescenți cu GPA și MPA.

Agencia Europeană pentru Medicamente a suspendat obligativitatea de a transmite rezultatele studiilor cu rituximab la pacienții copii cu vârsta < 2 ani în GPA sau MPA severă, activă (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

### Experiența clinică în pemfigusul vulgar (PV)

#### Studiul 1 PV (studiul ML22196)

Eficacitatea și siguranța rituximab în asociere cu terapia pe termen scurt cu glucocorticoizi (prednison) în doză redusă a fost evaluată la pacienți nou diagnosticați cu pemfigus moderat până la sever (74 cu PV și 16 cu pemfigus foliaceu [PF] în cadrul acestui studiu clinic randomizat, deschis, controlat, multicentric. Pacienții aveau vârste cuprinse între 19 și 79 de ani și nu primiseră anterior niciun tratament pentru pemfigus. La nivelul populației cu PV, 5 pacienți (13%) din grupul tratat cu rituximab și 3 pacienți (8%) din grupul tratat cu prednison în doze standard au prezentat boală moderată și 33 pacienți (87%) din grupul cu rituximab și 33 pacienți (92%) din grupul cu prednison în doze standard au prezentat boală severă în conformitate cu criteriile de evaluare a severității bolii definite de Harman.

Pacienții au fost stratificați în funcție de severitatea bolii la înrolare (moderată sau severă) și randomizați în raport de 1:1 pentru a primi fie rituximab și prednison în doză redusă, fie prednison în doză standard. La pacienții randomizați în grupul de tratament cu Rituximab s-a administrat o perfuzie intravenoasă inițială de 1000 mg de rituximab în ziua de studiu 1 în asociere cu prednison pe cale orală, în doză de 0,5 mg/kg/zi redusă progresiv pe parcursul a 3 luni dacă aceștia prezentau boală moderată sau în doză de 1 mg/kg/zi redusă progresiv pe parcursul a 6 luni dacă prezentau boală severă; o a doua perfuzie intravenoasă de 1000 mg a fost administrată în ziua de studiu 15. Dozele de întreținere de 500 mg rituximab au fost administrate în lunile 12 și 18. Pacienții randomizați la grupul cu prednison în doză standard au primit o doză inițială de prednison pe cale orală de 1 mg/kg/zi, redusă progresiv pe parcursul a 12 luni dacă prezentau boală moderată sau de 1,5 mg/kg/zi redusă progresiv pe parcursul a 18 luni dacă prezentau boală severă. Pacienții din grupul cu rituximab care manifestau recurența bolii puteau primi o perfuzie suplimentară de 1000 mg de rituximab în asociere cu reluarea dozelor sau creșterea dozelor de prednison. Perfuziile de întreținere sau în caz de recurență a bolii au fost administrate la interval de minimum 16 săptămâni după perfuzia anterioară.

Obiectivul primar al studiului a fost remisiunea completă (epitelializare completă și absența leziunilor noi și/sau deja stabilite) la luna 24 în absența tratamentului cu prednison timp de două luni sau mai mult (fără tratament cu corticosteroizi [RC] timp de  $\geq 2$  luni).

#### *Rezultatele Studiului 1 PV*


Studiul a generat rezultate semnificative din punct de vedere statistic și superioare pentru rituximab și prednison în doză redusă față de prednison în doză standard în atingerea obiectivului de neutilizare a RC  $\geq 2$  luni la luna 24 la pacienții cu PV (vezi Tabel 22).

**Tabel 22** Proporția pacienților cu PV care au obținut remisiunea completă fără a utiliza tratament cu corticosteroizi timp de două luni sau mai mult la luna 24 (populația cu intenție de tratament - PV)

	Rituximab + Prednison N=38	Prednison N=36	Valoare p <sup>a</sup>	Î 95% <sup>b</sup>
Numărul pacienților cu răspuns (rata de răspuns [%])	34 (89,5%)	10 (27,8%)	<0,0001	61,7% (38,4, 76,5)
<sup>a</sup> valoarea p a fost generată prin testul exact Fisher cu o corecție mid-p				
<sup>b</sup> intervalul de încredere 95% este intervalul Newcombe corectat				

Numărul pacienților care au primit rituximab plus o doză redusă de prednison în cazul neutilizării tratamentului cu prednison sau o doză minimă (doza de prednison de 10 mg sau mai puțin pe zi) comparativ cu doza standard de prednison la pacienți o perioadă de tratament peste 24 de luni, a arătat un efect al rituximab care permite evitarea corticoterapiei. (Figura 4).

**Figura 4:** Numărul de pacienți care nu au folosit terapie cu corticosteroizi sau o doză minimă de corticosteroizi ( $\leq 10$  mg/zi) în timp



#### Evaluarea post-hoc a rezultatelor retrospective ale analizelor de laborator

La 18 luni, un total de 19/34 de pacienți (56%) cu PV care au fost tratați cu rituximab au avut rezultate pozitive la testul pentru depistarea anticorpilor ADA. Relevanța clinică a formării ADA la pacienții cu PV tratați cu rituximab nu este clară.

#### Studiul 2 PV (studiul WA29330)

În cadrul unui studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, dublu-dummy, controlat cu comparator activ, au fost evaluate eficacitatea și siguranța rituximab comparativ cu ale micofenolatului mofetil (MMF) la pacienții cu PV moderat până la sever care primesc la intrarea în studiu 60-120 mg/zi prednison administrat oral sau echivalent (1,0-1,5 mg/kg/zi) și scăzut treptat pentru a ajunge la o doză de 60 sau 80 mg/zi până în ziua 1. Pacienții au avut un diagnostic confirmat cu PV în ultimele 24 de luni și dovezi de boală moderată până la severă (definită printr-un indice de activitate a bolii pemfigus, (*Pemphigus Disease Area Index*), PDAI, cu un scor de activitate  $\geq 15$ )).

Un număr de 135 de pacienți au fost randomizați la tratament cu rituximab în doză de 1000 mg, administrat în ziua 1, ziua 15, săptămâna 24 și săptămâna 26 sau la tratament pe cale orală cu MMF



2 g/zi, timp de 52 săptămâni, în combinație cu doze orale de 60 mg sau 80 mg de prednison, planificate a fi scăzute progresiv la 0 mg/zi până în săptămâna 24.

Obiectivul de eficacitate principal pentru acest studiu a fost evaluarea la săptămâna 52 a eficacității rituximab comparativ cu MMF în obținerea remisiunii complete susținute, definite prin vindecarea leziunilor și absența leziunilor noi (mai precis, scor de activitate PDAI de 0) în contextul reducerii dozelor de prednison sau echivalent la 0 mg/zi și menținerea acestui răspuns timp de minimum 16 săptămâni consecutive, pe parcursul perioadei de tratament de 52 de săptămâni.

#### *Rezultatele Studiului 2 PV*

Studiul a demonstrat superioritatea tratamentului cu rituximab față de MMF în asociere cu corticoterapia orală în doze scăzute progresiv, în atingerea RC de neutilizare a corticosteroizilor timp de  $\geq 16$  săptămâni, la săptămâna 52, în rândul pacienților cu PV (Tabelul 23). Majoritatea pacienților din populația mITT erau recent diagnosticați (74%) și 26% dintre pacienți aveau boală stabilă (durată a bolii  $\geq 6$  luni și tratament anterior pentru PV).

**Tabel 23** Proporția pacienților cu PV care au obținut remisiunea completă susținută constând în neutilizarea corticosteroizilor timp de 16 săptămâni sau mai mult la săptămâna 52 (populația cu intenție de tratament modificată)

	Rituximab (N=62)	MMF (N=63)	Diferență (Î 95%)	Valoare p
Număr de respondenți (rată de răspuns [%])	25 (40,3%)	6 (9,5%)	30,80% (14,70%, 45,15%)	<0,0001
Pacienți recent diagnosticați	19 (39,6%)	4 (9,1%)		
Pacienți cu boală stabilă	6 (42,9%)	2 (10,5%)		
MMF = micofenolat mofetil; Î = interval de încredere; Pacienți recent diagnosticați = durată a bolii < 6 luni sau niciun tratament anterior pentru PV; Pacienți cu boală stabilă = durată a bolii $\geq 6$ luni și tratament anterior pentru PV; Pentru calcularea valorii p s-a utilizat testul Cochran-Mantel-Haenszel.				

Analiza tuturor parametrilor secundari (inclusiv doza orală cumulată de corticosteroizi, numărul total de exacerbări ale bolii și modificarea calității vieții în relație cu starea de sănătate, măsurată prin Indicele Dermatologic de Calitate a Vieții) a confirmat rezultatele statistic semnificative pentru rituximab comparativ cu MMF. Testarea obiectivelor secundare a fost controlată pentru multiplicitate.

#### *Expunerea la glucocorticoizi*

Doza orală cumulată de corticosteroizi a fost semnificativ mai mică la pacienții tratați cu rituximab. Doza cumulată mediană (min, max) de prednison la săptămâna 52 a fost de 2775 mg (450, 22180) în grupul de tratament cu rituximab, comparativ cu 4005 mg (900, 19920) în grupul tratat cu MMF (p=0,0005).

#### *Exacerbările bolii*

Numărul total al exacerbărilor bolii a fost semnificativ mai mic la pacienții tratați cu rituximab, comparativ cu MMF (6 față de 44, p<0,0001) și proporția pacienților cu cel puțin un episod de exacerbare a fost mai mică (8,1% comparativ cu 41,3%).

#### *Evaluări de laborator*

Până în săptămâna 52, un număr total de 20 din 63 (31,7%) pacienți cu PV tratați cu rituximab au prezentat rezultate pozitive la testul pentru ADA (19 cu ADA induși de tratament, 1 cu titru ADA

amplificat de tratament). Nu a fost observat niciun impact negativ al prezenței ADA asupra siguranței sau eficacității în Studiul 2 privind PV.

## 5.2 Proprietăți farmacocinetice

### Limfom non-Hodgkin (LNH), la pacienții adulți

Pe baza analizei farmacocineticii unei populații de 298 pacienți cu LNH care au primit o singură perfuzie sau mai multe perfuzii de rituximab, în monoterapie sau în combinație cu terapie CHOP (dozele de rituximab administrate variază de la 100 la 500 mg/m<sup>2</sup>), la populația caracteristică se estimează un clearance nespecific (Cl<sub>1</sub>) și clearance specific (Cl<sub>2</sub>), cel mai probabil în colaborare cu celulele B sau încărcătura tumorală și compartimentul central al volumului de distribuție (V<sub>1</sub>), care au fost de 0,14 l/zi, 0,59 l/zi, respectiv 2,7 l. Timpul median de înjumătățire prin eliminare estimat pentru rituximab a fost de 22 zile (interval de la 6,1 la 52 zile). Numărul inițial al celulelor CD19-pozitive și mărimea leziunilor tumorale măsurabile contribuie la o parte a variabilității Cl<sub>2</sub> al rituximabului în datele de la 161 pacienți care au primit 375 mg/m<sup>2</sup> sub formă de perfuzie intravenoasă pentru 4 doze săptămânale. Pacienții cu număr mai mare de celule CD19-pozitive sau leziuni tumorale au avut un Cl<sub>2</sub> mai mare. Totuși, o mare componentă a variabilității individuale rămâne pentru Cl<sub>2</sub> după corecția pentru numărul celulelor CD19-pozitive sau mărimea leziunii tumorale. V<sub>1</sub> variază prin aria suprafeței corporale (BSA) și terapia CHOP. La această variabilitate a V<sub>1</sub> (27,1% și 19,0%) a contribuit media BSA (1,53 până la 2,32 m<sup>2</sup>), respectiv terapia CHOP concurentă, care au fost relativ scăzute. Vârsta, sexul și statusul de performanță OMS nu au avut efect asupra farmacocineticii rituximabului. Această analiză sugerează că ajustarea dozei de rituximab cu oricare dintre co-variabilele testate se așteaptă să nu determine reduceri semnificative în variabilitatea farmacocineticii sale.

Rituximabul, administrat ca o perfuzie intravenoasă la o doză de 375 mg/m<sup>2</sup> la intervale săptămânale pentru 4 doze la 203 pacienți cu LNH netratați anterior cu rituximab, a adus un beneficiu al C<sub>max</sub> medii după a patra perfuzie de 486 μg/ml (interval între 77,5 și 996,6 μg/ml). Rituximab a fost detectabil în serul pacienților timp de 3 – 6 luni după terminarea ultimului tratament.

După administrarea de rituximab în doză de 375 mg/m<sup>2</sup> ca perfuzie intravenoasă la intervale săptămânale pentru 8 doze, la 37 pacienți cu LNH, valoarea medie a C<sub>max</sub> a crescut cu fiecare perfuzie succesivă, situându-se de la o medie de 243 μg/ml (interval 16-582 μg/ml) după prima perfuzie, până la 550 μg/ml (interval 171-1177 μg/ml) după a opta perfuzie.

Profilul farmacocinetic al rituximabului când este administrat în 6 perfuzii de câte 375 mg/m<sup>2</sup> în combinație cu 6 cicluri de chimioterapie CHOP a fost similar cu cel observat în cazul administrării rituximabului în monoterapie.

### DLBCL/BL/BAL/BLL la pacienții copii și adolescenți

În studiul clinic care studiază DLBCL/BL/BAL/BLL pediatric, PK a fost studiat pe un subgrup de 35 de pacienți cu vârsta de peste 3 ani. PK a fost comparabil între cele grupe de vârstă (≥ 3 ani până la < 12 ani comparativ cu ≥ 12 ani < 18 ani). După două perfuzii intravenoase cu rituximab de 375 mg/m<sup>2</sup> în fiecare din cele două cicluri de tratament de inducție (Ciclul 1 și 2) urmate de o perfuzie intravenoasă cu rituximab de 375 mg/m<sup>2</sup> în fiecare din ciclurile de tratament de consolidare (Ciclul 3 și 4), concentrația maximă a fost cea mai ridicată după cea de-a patra perfuzie (Ciclul 2) cu o medie geometrică de 347 μg/ml, urmată de concentrațiile maxime cu medie geometrică mică (Ciclul 4: 247 μg/ml). Cu acest regim de dozare, s-au menținut concentrațiile minime (geometric înseamnă: 41,8 μg/ml (pre-doză Ciclul 2; după 1 ciclu), 67,7 μg/ml (pre-doză Ciclul 3, după 2 cicluri) și 58,5 μg/ml (pre-doză Ciclul 4, după 3 cicluri). Timpul de înjumătățire prin eliminare la pacienții copii și adolescenți cu vârsta de peste 3 ani a fost de 26 de zile.

Caracteristicile PK ale rituximabului la pacienții copii și adolescenți cu DLBCL/BL/BAL/BLL au fost similare cu cele observate la pacienții adulți cu LNH.

Cu toate că nu sunt disponibile date PK la grupul de pacienți cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 3 ani, predicția PK a populației susține expunerea sistemică comparabilă (ASC,  $C_{\min}$ ) la acest grup de vârstă cu grupul de pacienți cu vârsta  $\geq 3$  ani (Tabelul 24). Cu toate că o dimensiune mai mică a tumorii la momentul inițial are legătură cu o expunere ridicată datorată unui clearance dependent de timp mai mic, expunerile sistemice impactate de diferite dimensiuni ale tumorii rămân în intervalul de expunere care a fost eficient și a avut un profil de siguranță acceptabil.

**Tabel 24 Parametrii estimați PK după administrarea schemei terapeutice de Rituximab la pacienții copii și adolescenți cu DLBCL/BL/BAL/BLL**

Grup de vârstă	$\geq 6$ luni până la $< 3$ ani	$\geq 3$ până la $< 12$ ani	$\geq 12$ până la $< 18$ ani
$C_{\min}$ ( $\mu\text{g/mL}$ )	47,5 (0,01-179)	51,4 (0,00-182)	44,1 (0,00-149)
ASC <sub>1-4</sub> cicluri ( $\mu\text{g}^*\text{zi/ml}$ )	13501 (278-31070)	11609 (135-31157)	11467 (110-27066)

Rezultatele sunt prezentate ca medii (min – max);  $C_{\min}$  este pre-doză Ciclul 4.

### LLC

Rituximabul a fost administrat sub formă de perfuzie intravenoasă la o doză a primului ciclu de 375 mg/m<sup>2</sup> crescută la 500 mg/m<sup>2</sup> la fiecare ciclu pentru 5 doze, în asociere cu fludarabina și ciclofosfamida la pacienții cu LLC.  $C_{\max}$  medie (N = 15) a fost de 408  $\mu\text{g/ml}$  (interval 97-764  $\mu\text{g/ml}$ ) după a cincea perfuzie de 500 mg/m<sup>2</sup> iar media timpului de înjumătățire terminal a fost de 32 zile (interval 14-62 zile).

### Poliartrita reumatoidă

După două perfuzii intravenoase cu rituximab 1000 mg, la diferență de două săptămâni, timpul de înjumătățire mediu terminal a fost de 20,8 zile (interval de la 8,58 la 35,9 zile), clearance-ul sistemic mediu a fost de 0,23 l/zi (interval de la 0,091 la 0,67 l/zi) și volumul de distribuție mediu la starea de echilibru a fost de 4,6 l (interval de la 1,7 la 7,51 l). În urma analizei farmacocinetice a populației pentru aceiași parametri, s-au obținut aceleași valori medii ale clearance-ului sistemic și timpului de înjumătățire, 0,26 l/zi și respectiv, 20,4 zile. Analiza farmacocinetică a populației a arătat că BSA și sexul sunt cele mai importante co-variabile, ce explică variabilitatea individuală a parametrilor farmacocinetici. După ajustarea BSA, subiecții de sex masculin au avut un volum mai mare de distribuție și un clearance mai rapid comparativ cu subiecții de sex feminin. Diferențele farmacocinetice datorate sexului nu sunt considerate clinic relevante și nu este necesară ajustarea dozei. Nu sunt disponibile date farmacocinetice privind pacienții cu insuficiență hepatică sau renală.

Farmacocinetica rituximab a fost evaluată după administrarea intravenoasă a două doze de 500 mg și 1000 mg în zilele 1 și 15 din patru studii clinice. În toate aceste studii, farmacocinetica rituximab a fost proporțională cu doza în intervalul de doze limită studiat.  $C_{\max}$  medie pentru rituximab seric după prima perfuzie a fost cuprinsă între 157 până la 171  $\mu\text{g/ml}$  pentru doza de 2 x 500 mg și între 298 până la 341  $\mu\text{g/ml}$  pentru doza de 2 x 1000 mg. După a doua perfuzie,  $C_{\max}$  medie variază între 183 până la 198  $\mu\text{g/ml}$  pentru doza de 2 x 500 mg și între 355 până la 404  $\mu\text{g/ml}$  pentru doza de 2 x 1000 mg. Timpul mediu de înjumătățire prin eliminare este cuprins între 15 și 16 zile pentru grupul cu doza de 2 x 500 mg și între 17 și 21 zile pentru grupul cu doza de 2 x 1000 mg.  $C_{\max}$  medie a fost pentru ambele doze cu 16 până la 19% mai mare după a doua perfuzie, comparativ cu prima perfuzie.

Farmacocinetica rituximab a fost evaluată după administrarea intravenoasă a două doze de 500 mg și 1000 mg după reluarea tratamentului în a doua serie.  $C_{max}$  medie pentru rituximab seric după prima perfuzie este cuprinsă între 170 până la 175  $\mu\text{g/ml}$  pentru o doză de 2 x 500 mg și între 317 până la 370  $\mu\text{g/ml}$  pentru doza de 2 x 1000 mg. După a doua perfuzie,  $C_{max}$  a fost de 207  $\mu\text{g/ml}$  pentru doza de 2 x 500 mg și cuprinsă între 377 până la 386  $\mu\text{g/ml}$  pentru doza de 2 x 1000 mg. Timpul mediu de înjumătățire prin eliminare după a doua perfuzie, la a doua serie de tratament, a fost de 19 zile pentru doza de 2 x 500 mg și cuprinsă între 21 și 22 zile pentru doza de 2 x 1000 mg. Parametrii farmacocinetici pentru rituximab au fost comparabili pe parcursul celor două serii de tratament.

Pentru populația cu răspuns inadecvat la anti-TNF, parametrii farmacocinetici (PK), după schema terapeutică cu aceeași doză (2 x 1000 mg, IV, la interval de două săptămâni), au fost similari, cu o concentrație plasmatică medie maximă de 369  $\mu\text{g/ml}$  și un timp de înjumătățire terminal mediu de 19,2 zile.

### Granulomatoză cu poliangeită (GPA) și poliangeită microscopică (MPA)

#### *Populația adultă*

Pe baza analizelor datelor de farmacocinetică a populației provenind de la 97 pacienți cu GPA și MPA cărora li s-a administrat 375  $\text{mg/m}^2$  rituximab o dată pe săptămână timp de patru administrări, timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare estimat a fost de 23 zile (interval, de la 9 la 49 zile). Clearance-ul mediu al rituximab și volumul de distribuție au fost de 0,313 l/zi (interval, de la 0,116 la 0,726 l/zi) și respectiv 4,50 l (interval de la 2,25 la 7,39). Concentrația maximă în primele 180 de zile ( $C_{max}$ ), concentrația minimă în Ziua a 180-a (C180) și aria cumulativă de sub curbă după cele 180 zile (ASC180) au fost de ([intervalul] mediu) 372,6 (252,3-533,5)  $\mu\text{g/ml}$ , 2,1 (0-29,3)  $\mu\text{g/ml}$  și, respectiv 10302 (3653-21874)  $\mu\text{g/ml}\cdot\text{zile}$ . Parametrii PK ai rituximab la pacienții adulți cu GPA și MPA par similari cu cei observați la pacienți cu poliartrită reumatoidă.

#### *Copii și adolescenți*

Pe baza analizelor de farmacocinetică a populației provenind de la 25 de copii (6-17 ani) cu GPA și MPA cărora li s-a administrat 375  $\text{mg/m}^2$  de rituximab o dată pe săptămână timp de patru administrări, timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare estimat a fost de 22 de zile (interval, de la 11 la 42 zile). Clearance-ul mediu al rituximab și volumul de distribuție au fost de 0,221 l/zi (interval, de la 0,0996 la 0,381 l/zi) și, respectiv 2,27 l (interval, de la 1,43 la 3,17 l). Concentrația maximă în primele 180 de zile ( $C_{max}$ ), concentrația minimă în Ziua a 180-a (C180) și aria cumulativă de sub curbă după cele 180 zile (ASC180) au fost de ([intervalul] mediu) 382,8 (270,6-513,6)  $\mu\text{g/ml}$ , 0,9 (0-17,7)  $\mu\text{g/ml}$  și, respectiv 9787 (4838-20446)  $\mu\text{g/ml}\cdot\text{zi}$ . Parametrii PK ai rituximab au fost similari cu cei de la adulții cu GPA sau MPA, după ajustarea în funcție de efectul SC asupra clearance-ului și a volumului de distribuție.

### Pemfigus vulgar

Parametrii farmacocinetici la pacienții cu PV adulți cărora li s-a administrat rituximab în doză de 1000 mg în zilele 1, 15, 168 și 182 sunt rezumați în Tabelul 25.

**Tabel 25 Parametrii farmacocinetici la pacienții cu PV adulți din Studiul 2 PV**

Parametru	Ciclul tratamentului în perfuzie	
	Ciclul 1 de tratament în doză de 1000 mg Ziua 1 și ziua 15 N=67	Ciclul 2 de tratament în doză de 1000 mg Ziua 168 și ziua 182 N=67
Timp de înjumătățire plasmatică terminală Valoare mediană (interval)	21,0 (9,3-36,2)	26,5 (16,4-42,8)
Clearance plasmatic (l/zi) Valoare mediană (interval)	391 (159-1510)	247 (128-454)
Volum de distribuție în compartimentul central (l) Valoare mediană (interval)	3,52 (2,48-5,22)	3,52 (2,48-5,22)

După primele două administrări de rituximab (în ziua 1 și 15, corespunzând ciclului 1), parametrii farmacocinetici la pacienții cu PV au fost similari cu cei ai pacienților cu GPA/MPA și ai pacienților cu PR. După ultimele două administrări (ziua 168 și ziua 182, corespunzând ciclului 2), clearance-ul plasmatic al rituximabului a scăzut, în timp ce volumul de distribuție în compartimentul central a rămas nemodificat.

### 5.3 Date preclinice de siguranță

Rituximab a demonstrat o specificitate accentuată pentru antigenul CD20 de pe celulele B. Studiile de toxicitate efectuate pe maimuțele cynomolgus nu au arătat alt efect decât depleția farmacologică așteptată a celulelor B în circulația periferică și în țesuturile limfatice.

Studiile de toxicitate, efectuate pe maimuțele cynomolgus, cu doze până la 100 mg/kg rituximab (tratament în zilele de gestație 20-50) au arătat că nu există toxicitate asupra fătului. Totuși, depleția farmacologică a celulelor B dependentă de doză a fost observată în organele limfoide ale fătului, care a persistat în perioada post-natală și a fost asociată cu o scădere a nivelului IgG la nou-născuții afectați. Numărul celulelor B revine la normal la aceste animale, în decurs de 6 luni de la naștere și nu compromise reacția de imunizare.

Nu s-au efectuat teste standard pentru investigarea mutagenzei, deoarece asemenea teste nu sunt relevante pentru această moleculă. Nu s-au efectuat studii pe termen lung la animale pentru a stabili potențialul carcinogen al rituximab.

Nu au fost efectuate studii specifice pentru a determina efectele rituximab asupra fertilității. În studiile de toxicitate generală la maimuțele cynomolgus nu au fost observate efecte negative asupra organelor de reproducere la masculi sau la femele.

## 6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipienților

Citrat de sodiu (E331)  
Polisorbat 80 (E433)  
Clorură de sodiu  
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) (E524)  
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) (E507)  
Apă pentru preparate injectabile

## 6.2 Incompatibilități

Nu s-au constatat incompatibilități între Rixathon și clorura de polivinil sau pungile de polietilenă sau seturile de perfuzie.

## 6.3 Perioada de valabilitate

### Flacon nedeschis

3 ani la 2 °C – 8 °C.

Rixathon poate fi păstrat la temperaturi de până la maximum 30°C pentru o singură perioadă de până la 7 zile, dar fără a depăși data de expirare originală. Noua dată de expirare trebuie scrisă pe cutie. După scoaterea din depozitarea frigorifică, Rixathon nu trebuie reintrodus în frigider.

### Medicamentul diluat

- După diluare în condiții aseptice în soluție de clorură de sodiu:  
Stabilitatea chimică și fizică a Rixathon diluat în soluție injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) a fost demonstrată timp de:
  - 30 zile la temperaturi de 2 °C-8 °C și ulterior timp de 24 ore la temperatura camerei ( $\leq 25$  °C)  
sau
  - 7 zile la temperaturi de  $\leq 30$  °C, protejat de lumină.
- După diluare în condiții aseptice în soluție de glucoză:  
Stabilitatea chimică și fizică a Rixathon diluat în soluție de glucoză 5% a fost demonstrată timp de 24 ore la temperaturi de 2 °C-8 °C și ulterior timp de 12 ore la temperatura camerei ( $\leq 25$  °C).

Din punct de vedere microbiologic, soluția perfuzabilă preparată trebuie administrată imediat. Dacă nu a fost utilizată imediat, condițiile și timpul de depozitare înaintea utilizării constituie responsabilitatea utilizatorului și nu trebuie să depășească, în mod normal, 24 ore la 2 °C – 8 °C, cu excepția cazurilor în care diluția se face în condiții aseptice validate și controlate.

## 6.4 Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

A se ține flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condițiile de păstrare ale flaconului nedeschis nepus în frigider, vezi pct. 6.3.

Pentru condițiile de păstrare ale medicamentului după diluare, vezi pct. 6.3.

## 6.5 Natura și conținutul ambalajului

Flacon de 10 ml: flacoane din sticlă transparentă tip I, cu dop din cauciuc butilic, care conțin 100 mg rituximab în 10 ml. Cutie cu 2 sau 3 flacoane.

Flacon de 50 ml: flacoane din sticlă transparentă tip I, cu dop din cauciuc butilic, care conțin 500 mg rituximab în 50 ml. Cutie cu 1 sau 2 flacoane.

## 6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Rixathon este disponibil în flacoane pentru o doză unică, apirogene, fără conservanți, sterile. Pentru prepararea Rixathon trebuie să se utilizeze un ac și o seringă, ambele sterile.

Se extrage cantitatea necesară de Rixathon în condiții aseptice și se diluează până la o concentrație calculată de rituximab de 1 până la 4 mg/ml, într-o pungă de perfuzie sterilă, apirogenă, cu soluție injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml, (0,9%) sau D-Glucoză 5% în apă. Pentru a amesteca soluția, se întoarce punga ușor, pentru a evita formarea de spumă. Se va asigura sterilitatea soluțiilor preparate. Deoarece medicamentul nu conține niciun fel de conservant antimicrobian sau agenți bacteriostatici, va trebui respectată tehnica aseptică. Înaintea administrării, medicamentele administrate parenteral trebuie examinate vizual, pentru a constata prezența unor eventuale modificări de culoare sau particule.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sandoz GmbH  
Biochemiestr. 10  
6250 Kundl  
Austria

## **8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Rixathon 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă  
EU/1/17/1185/001  
EU/1/17/1185/002

Rixathon 500 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă  
EU/1/17/1185/003  
EU/1/17/1185/004

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data primei autorizări: 15 iunie 2017  
Data ultimei reînnoiri a autorizației: 24 februarie 2022

## **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente <http://www.ema.europa.eu>.

## **ANEXA II**

- A. FABRICANTUL(FABRICANȚII) SUBSTANȚEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ȘI FABRICANTUL (FABRICANȚII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI**
- B. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA**
- C. ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**
- D. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA SIGURĂ ȘI EFICACE A MEDICAMENTULUI**



**A. FABRICANTUL(FABRICANȚII) SUBSTANȚEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ȘI FABRICANTUL (FABRICANȚII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI**

Numele și adresa fabricantului(fabricanților) substanței(lor) biologic active

Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH  
Biochemiestr. 10  
6336 Langkampfen  
AUSTRIA

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
Birkendorfer Strasse 65  
88397 Biberach an der Riss  
GERMANIA

Numele și adresa fabricantului(fabricanților) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Sandoz GmbH Schaftenau  
Biochemiestr. 10  
6336 Langkampfen  
AUSTRIA

Lek Pharmaceuticals d.d. Ljubljana  
Verovškova 57  
1526 Ljubljana  
Slovenia

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menționeze numele și adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei respective

**B. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA**

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală restrictivă (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

**C. ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

• **Rapoartele periodice actualizate privind siguranța (RPAS)**

Cerințele pentru depunerea RPAS privind siguranța pentru acest medicament sunt prezentate în lista de date de referință și frecvențe de transmitere la nivelul Uniunii (lista EURD), menționată la articolul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE și orice actualizări ulterioare ale acesteia publicată pe portalul web european privind medicamentele.

**D. CONDIȚII SAU RESTRICȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ȘI EFICACE A MEDICAMENTULUI**

• **Planul de management al riscului (PMR)**

Deținătorul autorizației de punere pe piață (DAPP) se angajează să efectueze activitățile și intervențiile de farmacovigilență necesare detaliate în PMR aprobat și prezentat în modulul 1.8.2 al autorizației de punere pe piață și orice actualizări ulterioare aprobate ale PMR.

O versiune actualizată a PMR trebuie depusă:

- la cererea Agenției Europene pentru Medicamente;
- la modificarea sistemului de management al riscului, în special ca urmare a primirii de informații noi care pot duce la o schimbare semnificativă a raportului beneficiu/risc sau ca urmare a atingerii unui obiectiv important (de farmacovigilență sau de reducere la minimum a riscului).

- **Măsuri suplimentare de reducere la minimum a riscului**

Pentru indicațiile limfom non Hodgkin (LNH) și leucemie limfocitară cronică (LLC):

Toți medicii care urmează să prescrie Rixathon pentru LNH/LLC vor primi următoarele informații pentru a reduce riscul legat de erorile privind calea de administrare:

- Informații despre medicament
- Card de atenționare a pacientului pentru profesioniștii din domeniul sănătății, care specifică utilizarea corectă a Rixathon

Cardul de atenționare a pacientului pentru profesioniștii din domeniul sănătății, care specifică utilizarea corectă a Rixathon conține următoarele elemente cheie:

- Precizarea că Rixathon este destinat exclusiv administrării intravenoase și recomandări pentru felul în care trebuie asigurată această cale de administrare

Pentru indicații non-oncologice:

Toți medicii care urmează să prescrie Rixathon pentru indicații non-oncologice vor primi următoarele informații:

- Informații despre medicament
- Prospect educativ pentru profesioniștii din domeniul sănătății
- Prospect educativ pentru pacient

Un card de atenționare a pacientului va fi inclus în cutie.

Prospectul educativ pentru profesioniștii din domeniul sănătății despre Rixathon pentru indicații non-oncologice conține următoarele elemente cheie:

- Necesitatea unei supravegheri atente în timpul administrării, într-un spațiu în care sunt disponibile imediat facilități complete de resuscitare
- Necesitatea unui control, înainte de începerea tratamentului cu Rixathon, pentru infecții, pentru imunosupresie, pentru medicație anterioară/curentă care afectează sistemul imunitar și pentru vaccinare recentă sau planificată și un istoric de reacții legate de perfuzie
- Necesitatea de a monitoriza pacienții pentru infecții, în special LMP, în timpul și după tratamentul cu Rixathon
- Informații detaliate privind riscul de apariție a LMP, necesitatea pentru diagnosticarea la timp a LMP și măsurile adecvate pentru a diagnostica LMP
- Necesitatea de a informa pacienții cu privire la riscul de infecții și LMP, inclusiv despre simptomele de care să fie conștienți și necesitatea de a contacta imediat medicul în cazul în care manifestă vreunul
- Necesitatea de a oferi pacienților Cardul de atenționare a pacientului la fiecare administrare a perfuziei

Prospectul educativ pentru pacient despre Rixathon conține următoarele elemente cheie:

- Informații detaliate privind riscul de infecții și LMP
- Informații cu privire la semnele și simptomele de infecții, în special LMP, și necesitatea de a contacta imediat medicul lor în cazul în care manifestă vreun simptom
- Importanța transmiterii acestor informații partenerului lui sau persoanei care îl îngrijește
- Informații cu privire la Cardul de atenționare a pacientului

Cardul de atenționare a pacientului pentru Rixathon conține următoarele elemente cheie:

- Necesitatea de a deține cardul în orice moment și de a-l arăta tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății care îi tratează
- Atenționare cu privire la riscul de infecții și LMP, inclusiv simptomele

- Necesitatea ca pacienții să contacteze profesioniștii din domeniul sănătății în cazul în care apar simptome

Prospectele educative pentru profesioniștii din domeniul sănătății și prospectul educativ pentru pacient vor fi aprobate de Autoritățile Naționale Competente înainte de a fi distribuite. Deoarece Cardul de atenționare a pacientului face parte din informațiile despre medicament din ambalajul secundar, conținutul va fi aprobat central pentru toate limbile UE/SEE, fără a mai necesita aprobarea de către autoritățile naționale.

**ANEXA III**  
**ETICHETAREA ȘI PROSPECTUL**

## **A. ETICHETAREA**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Rixathon 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă  
rituximab (rituximabum)

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

1 flacon conține 10 mg/ml rituximab.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Citrat de sodiu, polisorbat 80, clorură de sodiu, hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile. A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Concentrat pentru soluție perfuzabilă  
100 mg / 10 ml

2 flacoane a 10 ml

3 flacoane a 10 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Pentru administrare intravenoasă, după diluare.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la frigider.

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Poate fi păstrat la temperatura camerei până la 30 °C pentru o singură perioadă de până la 7 zile, dar fără a depăși data de expirare originală.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sandoz GmbH  
Biochemiestr. 10  
6250 Kundl  
Austria

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

EU/1/17/1185/001  
EU/1/17/1185/002

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE****15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Justificare acceptată pentru neincluderea informației în Braille.

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

PC  
SN  
NN

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**ETICHETĂ FLACON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Rixathon 100 mg concentrat steril  
rituximab (rituximabum)  
Pentru administrare intravenoasă, după diluare.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

100 mg/10 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

Informații ce vor apărea pe un autocolant detașabil

Rixathon 100 mg  
rituximab (rituximabum)  
EXP  
Lot



**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Rixathon 500 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă  
rituximab (rituximabum)

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

1 flacon conține 10 mg/ml rituximab.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Citrat de sodiu, polisorbat 80, clorură de sodiu, hidroxid de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate injectabile. A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Concentrat pentru soluție perfuzabilă  
500 mg/50 ml

1 flacon a 50 ml  
2 flacoane a 50 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Pentru administrare intravenoasă, după diluare.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la frigider.

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Poate fi păstrat la temperatura camerei până la 30 °C pentru o singură perioadă de până la 7 zile, dar fără a depăși data de expirare originală.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sandoz GmbH  
Biochemiestr. 10  
6250 Kundl  
Austria

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

EU/1/17/1185/003  
EU/1/17/1185/004

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE****15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Justificare acceptată pentru neincluderea informației în Braille.

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

PC  
SN  
NN

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**ETICHETĂ FLACON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Rixathon 500 mg concentrat steril  
rituximab (rituximabum)  
Pentru administrare intravenoasă, după diluare.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

500 mg/50 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

Informații ce vor apărea pe un autocolant detașabil

Rixathon 500 mg  
rituximab (rituximabum)  
EXP  
Lot

## TEXTUL CARDULUI DE ATENȚIONARE A PACIENTULUI PENTRU INDICAȚII NON-ONCOLOGICE

<p><b><u>Cardul de Atenționare Rixathon pentru pacienții cu afecțiuni non-oncologice</u></b></p> <p><b>Pentru ce mi s-a oferit acest card?</b></p> <p>Acest medicament vă poate face mai predispus la infecții. Acest card vă informează despre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Rixathon</li><li>• Care sunt semnele clinice ale unei infecții</li><li>• Ce trebuie să faceți în cazul în care credeți că ați putea avea o infecție.</li></ul> <p>Acesta include, de asemenea, numele dvs. iar pe spate numele și numărul de telefon al medicului.</p> <p><b>Ce trebuie să fac cu acest card?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Păstrați tot timpul acest card cu dumneavoastră – de exemplu, în geantă sau portofel</li><li>• Arătați acest card oricărui medic, asistentă medicală sau dentist care vă consultă – nu numai medicului specialist care v-a prescris Rixathon.</li></ul> <p>Păstrați acest card cu dumneavoastră timp de 2 ani după ce vi s-a administrat ultima doză de Rixathon. Aceasta deoarece reacțiile adverse pot să apară la câteva luni după ce ați terminat tratamentul.</p> <p><b>Când nu trebuie să fiu tratat cu Rixathon?</b></p> <p>Nu trebuie să fiți tratat cu Rixathon dacă aveți o infecție activă sau o problemă serioasă a sistemului imunitar.</p> <p>Spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei medicale dacă luați în prezent sau ați luat recent medicamente care vă pot afecta sistemul imunitar, acestea includ chimioterapiile.</p> <p><b>Care sunt semnele de apariție ale unei infecții?</b></p> <p>Fiți atenți la următoarele semne posibile ale infecției:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Febră sau tuse tot timpul</li></ul>	<p><b>Ce altceva trebuie să știu?</b></p> <p>Rar, Rixathon poate cauza o infecție gravă la nivelul creierului, denumită “Leucoencefalopatie Multifocală Progresivă” sau LMP. Aceasta poate fi letală.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Semnele LMP includ:<ul style="list-style-type: none"><li>- Confuzie, pierdere de memorie, probleme de gândire</li><li>- Pierderea echilibrului sau dificultăți la mers sau vorbire</li><li>- Scăderea puterii sau slăbiciune a unei anumite părți a corpului</li><li>- Vedere încețoșată sau pierderea vederii.</li></ul></li></ul> <p>Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau asistentei dacă aveți oricare dintre aceste simptome. De asemenea, trebuie să le spuneți despre tratamentul cu Rixathon.</p> <p><b>Unde pot găsi mai multe informații?</b></p> <p>Vezi Prospectul Rixathon pentru mai multe informații.</p> <p><b>Data începerii tratamentului și detaliile de contact</b></p> <p>Data celei mai recente perfuzii: _____ Data primei perfuzii: _____ Nume pacient: _____ Nume medic: _____ Detalii de contact medic: _____</p> <p>Vă rugăm să vă asigurați că aveți cu dumneavoastră o listă cu toate medicamentele pe care le luați, la orice vizită la un profesionist în domeniul sănătății.</p> <p>Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră sau asistenta dacă aveți orice întrebări referitoare la informația din acest card.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pierdere în greutate
- Durere fără a să vă fi rănit
- Senzație generală de rău sau apatie

**Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau asistentei dacă aveți oricare dintre aceste simptome.**

**De asemenea, trebuie să le spuneți despre tratamentul cu Rixathon.**

## **B. PROSPECTUL**

## Prospect: Informații pentru pacient

### **Rixathon 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă** **Rixathon 500 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă** rituximab (rituximabum)

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

### **Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Rixathon și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Rixathon
3. Cum vi se administrează Rixathon
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Rixathon
6. Conținutul ambalajului și alte informații

### **1. Ce este Rixathon și pentru ce se utilizează**

#### **Ce este Rixathon**

Rixathon conține substanța activă „rituximab”. Aceasta este un tip de proteină numită „anticorp monoclonal” care se atașează la suprafața unui anumit tip de celule albe ale sângelui denumite „limfocitele B”. Atunci când rituximab se atașează la suprafața acestor celule, celulele mor.

#### **Pentru ce se utilizează Rixathon**

Rixathon poate fi utilizat pentru tratamentul mai multor afecțiuni diferite la pacienții adulți și copii. Medicul dumneavoastră poate prescrie Rixathon pentru:

##### **a) Limfom non-Hodgkin**

Acesta este o boală a țesutului limfatic (parte a sistemului imunitar) care afectează un tip de celule albe ale sângelui denumite limfocitele B.

La pacienții adulți, Rixathon poate fi administrat singur sau împreună cu alte medicamente numite „chimioterapice”.

La pacienții adulți la care tratamentul funcționează, Rixathon poate fi utilizat ca tratament de întreținere pentru o perioadă de 2 ani după terminarea tratamentului inițial.

La pacienții copii și adolescenți, rituximab se administrează în asociere cu „chimioterapia”.

##### **b) Leucemie limfocitară cronică (LLC)**

LLC este cea mai frecventă formă de leucemie la adult. LLC afectează anumite limfocite, celulele B, care iau naștere din măduva osoasă și se dezvoltă în nodulii limfatici. Pacienții cu LLC au prea multe limfocite anormale, care se acumulează în principal în măduva osoasă și sânge. Proliferarea acestor limfocite B anormale este cauza simptomelor pe care le puteți avea.

Rixathon în asociere cu chimioterapie distruge aceste celule care sunt îndepărtate gradat din corp prin procesele biologice.

### c) **Poliartrită reumatoidă**

Rixathon este utilizat pentru tratamentul poliartritei reumatoide. Poliartrita reumatoidă este o boală a articulațiilor. Limfocitele B sunt implicate în apariția anumitor simptome pe care le aveți. Rixathon se utilizează pentru tratamentul poliartritei reumatoide la pacienții care au încercat deja alte medicamente care fie au încetat să mai fie eficiente, fie nu au fost suficient de eficiente sau au produs reacții adverse. În mod obișnuit, Rixathon se administrează împreună cu un alt medicament numit metotrexat.

Rixathon încetinește afectarea articulațiilor dumneavoastră produsă de poliartrita reumatoidă și vă îmbunătățește capacitatea de a desfășura activitățile zilnice obișnuite.

Cele mai bune răspunsuri la tratamentul cu Rixathon sunt observate la cei care sunt testați pozitiv la factorul reumatoid (RF) și/sau anticorpi îndreptați împotriva peptidelor citrullinate ciclic (anti-CCP). Ambele teste sunt de obicei pozitive în poliartrita reumatoidă și ajută la confirmarea diagnosticului.

### d) **Granulomatoză cu poliangeită (GPA) sau poliangeită microscopică (MPA)**

Rixathon, administrat în asociere cu glucocorticoizi, este utilizat pentru tratamentul pacienților adulți și copii cu vârsta de 2 ani sau mai mare având GPA (denumită granulomatoza Wegener) sau în MPA.

GPA și MPA sunt două forme de inflamație a vaselor de sânge care afectează în principal plămâni și rinichii, dar pot afecta de asemenea și alte organe.

Limfocitele B sunt implicate în cauza acestor afecțiuni.

### e) **Pemfigus vulgar (PV)**

Rixathon este indicat pentru tratamentul pacienților cu pemfigus vulgar moderat până la sever. PV este o afecțiune autoimună caracterizată prin apariția de vezicule dureroase pe piele și mucoasele cavității bucale, nazale, ale gâtului și organelor genitale.

## 2. **Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Rixathon**

### **Nu utilizați Rixathon**

- dacă sunteți alergic la rituximab, la alte proteine care sunt asemănătoare cu rituximab sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).
- dacă aveți în prezent o infecție activă severă.
- dacă aveți sistemul imunitar slăbit.
- dacă aveți insuficiență cardiacă severă sau boală cardiacă necontrolată severă și aveți poliartrită reumatoidă, granulomatoză cu poliangeită, poliangeită microscopică sau pemfigus vulgar.

Nu utilizați Rixathon dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a utiliza Rixathon.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Rixathon, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă:

- dumneavoastră ați avut vreodată sau este posibil să aveți acum hepatită. Aceasta deoarece, în unele cazuri Rixathon poate determina hepatita B să redevină activă care, în cazuri foarte rare, ar putea fi letală. Pacienții care au avut vreodată hepatită B vor fi examinați cu atenție de către medicul lor pentru a identifica semnele acestei infecții.
- dacă ați avut vreodată probleme la inimă (de exemplu angină, palpitații sau insuficiență cardiacă) sau probleme respiratorii.

Dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a utiliza Rixathon. Ar putea fi necesar ca medicul dumneavoastră să ia măsuri speciale de îngrijire pentru dumneavoastră în timpul tratamentului cu Rixathon.



De asemenea, discutați cu medicul dumneavoastră dacă dumneavoastră credeți că veți avea nevoie de vaccinare în viitorul apropiat, inclusiv vaccinurile necesare pentru călătoria în alte țări. Unele vaccinuri nu trebuie administrate în același timp cu Rixathon sau în lunile de după tratamentul cu Rixathon. Medicul dumneavoastră va verifica dacă trebuie să faceți vreun vaccin înainte de administrarea Rixathon.

**De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți poliartrită reumatoidă, granulomatoză cu poliangeită (GPA), poliangeită microscopică (MPA) sau pemfigus vulgar (PV).**

- dacă dumneavoastră credeți că ați putea avea o infecție, chiar una ușoară ca o răceală. Celulele afectate de Rixathon ajută în lupta împotriva infecției și trebuie să așteptați până la vindecarea infecției, înainte de administrarea Rixathon. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă în trecut ați avut multe infecții sau aveți infecții severe.

### **Copii și adolescenți**

#### *Limfom non-Hodgkin*

Rituximab poate fi utilizat pentru tratamentul copiilor și adolescenților, având vârsta de 6 luni sau mai mare, cu limfom non-Hodgkin, limfom difuz cu celulă mare B, cu marker CD20 pozitiv, specific (DLBCL), limfom Burkitt (BL)/leucemia Burkitt (leucemia acută cu celule B mature) (BAL) sau limfom asemănător limfomului Burkitt (BLL).

#### *Granulomatoză cu poliangeită (GPA) sau poliangeită microscopică (MPA)*

Rituximab poate fi utilizat pentru tratamentul copiilor și adolescenților în vârstă de 2 ani și peste, având GPA (anterior denumită granulomatoză Wegener) sau MPA. Nu există multe informații despre utilizarea rituximabului la copii și adolescenți cu alte afecțiuni.

Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a utiliza acest medicament dacă dumneavoastră aveți, sau copilul dumneavoastră are, vârsta sub 18 ani.

### **Rixathon împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Acestea includ medicamentele obținute fără prescripție medicală și medicamentele din plante. Aceasta deoarece Rixathon poate afecta modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, alte medicamente pot afecta modul în care acționează Rixathon.

În special, spuneți medicului dumneavoastră:

- dacă luați medicamente pentru tensiune arterială crescută. Vi se poate cere să nu luați aceste medicamente cu 12 ore înainte de a vi se administra Rixathon. Aceasta deoarece la unii pacienți poate apărea o scădere a tensiunii arteriale în timp ce li se administrează Rixathon.
- dacă ați luat vreodată medicamente care afectează sistemul imunitar – cum sunt medicamentele chimioterapice sau medicamentele imunosupresoare.

Dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a vi se administra Rixathon.

### **Sarcina și alăptarea**

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, dacă credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Aceasta deoarece Rixathon poate traversa placentă și poate afecta copilul dumneavoastră.

Dacă dumneavoastră puteți rămâne gravidă, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră trebuie să utilizați măsuri contraceptive eficiente în timpul tratamentului cu Rixathon. Dumneavoastră trebuie, de asemenea, să continuați cu acestea timp de 12 luni după ultima administrare de Rixathon. Rixathon trece în laptele matern în cantități foarte mici. Deoarece efectele pe termen lung asupra sugarilor alăptați nu sunt cunoscute, din motive de precauție, alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului cu Rixathon și o perioadă de 6 luni după tratament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu se știe dacă rituximab afectează capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Rixathon conține sodiu**

Acest medicament conține 52,6 mg sodiu (componenta principală stabilă/sare de masă) în fiecare flacon de 10 ml și 263,2 mg sodiu în fiecare flacon de 50 ml. Aceasta este echivalentă cu 2,6 % (pentru flaconul de 10 ml) și 13,2 % (pentru flaconul de 50 ml) din maximul recomandat

## **3. Cum vi se administrează Rixathon**

### **Cum vi se administrează**

Rixathon vă va fi administrat de către un medic sau o asistentă medicală cu experiență în utilizarea acestui tratament. Ei vă vor supraveghea atent în timp ce vi se administrează acest medicament.

Aceasta pentru cazul în care apar reacții adverse.

Vi se va administra întotdeauna Rixathon ca perfuzie (se administrează direct în venă).

### **Medicamente care se administrează de fiecare dată înainte de Rixathon**

Înainte de a vi se administra Rixathon, vi se vor administra alte medicamente (pre-medicație) pentru a preveni sau a reduce reacțiile adverse posibile.

### **Cât de mult și cât de des vi se va administra tratamentul**

#### **a) Dacă sunteți tratat pentru limfom non-Hodgkin**

- *Dacă vi se administrează numai Rixathon*  
Rixathon vi se va administra o dată pe săptămână timp de 4 săptămâni. Sunt posibile repetări ale curelor de tratament cu Rixathon.
- *Dacă vi se administrează Rixathon cu chimioterapie*  
Rixathon vi se va administra în aceeași zi cu chimioterapia. Aceasta se administrează de obicei la fiecare 3 săptămâni până la de 8 ori.
- Dacă răspundeți bine la tratament, se poate să vi se administreze Rixathon ca tratament de întreținere la fiecare 2 sau 3 luni pentru o perioadă de doi ani. Medicul dumneavoastră poate modifica acest lucru, în funcție de modul în care răspundeți la acest medicament.
- Dacă aveți mai puțin de 18 ani, vi se va administra Rixathon în asociere cu chimioterapia. Vi se va administra Rixathon până la de 6 ori, o perioadă cuprinsă între 3,5 – 5,5 luni.

#### **b) Dacă sunteți tratat pentru leucemie limfocitară cronică (LLC)**

Când sunteți tratat cu Rixathon în asociere cu chimioterapie, perfuziile de Rixathon vi se vor administra în ziua 0 a ciclului 1 și apoi în ziua 1 a fiecărui ciclu, pentru 6 cicluri în total. Fiecare ciclu are o durată de 28 zile. Chimioterapia trebuie administrată după perfuzia de Rixathon. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să vi se administreze în același timp tratament de suport.

#### **c) Dacă sunteți tratat pentru poliartrită reumatoidă**

Fiecare cură de tratament este constituită din două perfuzii distincte, administrate la interval de 2 săptămâni. Sunt posibile repetări ale curelor de tratament cu Rixathon. În funcție de semnele și simptomele bolii, medicul dumneavoastră va decide când mai trebuie să primiți Rixathon. Poate fi vorba de luni de zile.

#### **d) Dacă sunteți tratat pentru granulomatoză cu poliangită (GPA) sau poliangită microscopică (MPA)**

Tratamentul cu Rixathon este constituit din patru perfuzii distincte administrate la intervale de câte o săptămână. Corticoizii vor fi administrați de obicei prin injectare înainte de a începe tratamentul cu Rixathon. Corticoizii administrați pe cale orală pot fi recomandați de către medicul dumneavoastră în orice moment, pentru a trata afecțiunea dumneavoastră.

Dacă aveți vârsta de 18 ani sau mai mare și răspundeți bine la tratament, vi se poate administra Rixathon ca tratament de întreținere. Acesta va fi administrat sub forma a 2 perfuzii separate la

interval de 2 săptămâni una de cealaltă, ulterior fiind administrată câte 1 perfuzie la intervale de 6 luni timp de cel puțin 2 ani. Medicul dumneavoastră poate decide să vă trateze cu Rixathon pe o perioadă mai îndelungată (timp de până la 5 ani), în funcție de modul în care răspundeți la medicament.

#### e) **Dacă sunteți tratat pentru pemfigus vulgar (PV)**

Fiecare cură de tratament constă în două perfuzii separate administrate la interval de 2 săptămâni. Dacă răspundeți bine la tratament, vi se poate administra Rixathon ca tratament de întreținere. Aceasta va fi administrată la interval de 1 an și 18 luni după tratamentul inițial și apoi la fiecare 6 luni, așa cum este necesar sau medicul dumneavoastră poate schimba intervalul de administrare în funcție de modul în care răspundeți la medicament.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

## 4. **Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Marea majoritate a reacțiilor adverse sunt ușoare până la moderate, dar unele pot fi grave și necesită tratament. Rar, câteva dintre aceste reacții s-au finalizat cu deces.

### **Reacții legate de perfuzie**

În timpul perfuziei sau în decurs de 24 ore după, pot apărea febră, frisoane și tremurături. Mai puțin frecvent, unii pacienți pot prezenta durere la locul perfuziei, vezicule, mâncărimi ale pielii, stare de rău (greață), oboseală, durere de cap, dificultăți de respirație, tensiune arterială mare, respirație șuierătoare, disconfort la nivelul gâtului, umflarea limbii și a gâtului, rinoree sau mâncărimi ale nasului, vărsături, înroșirea feței sau palpitații, infarct miocardic sau număr scăzut de trombocite. Dacă aveți o boală cardiacă sau angină pectorală, aceste reacții se pot agrava. **Vă rugăm să spuneți imediat persoanei care vă administrează perfuzia** dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră prezentați oricare dintre aceste simptome, deoarece poate fi necesară reducerea vitezei de perfuzare sau oprirea perfuziei. Puteți avea nevoie de tratament suplimentar, cum ar fi antihistaminice sau paracetamol. Când simptomele dispar sau se ameliorează, se poate continua administrarea perfuziei. Este mai puțin probabil ca aceste reacții să apară după a doua perfuzie. Medicul dumneavoastră poate decide întreruperea tratamentului cu Rixathon dacă aceste reacții sunt grave.

### **Infecții**

**Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră prezentați semne ale unei infecții care includ:**

- febră, tuse, dureri în gât, durere arzătoare la urinare, sau vă simțiți slăbit sau aveți o stare generală de rău
- pierdere de memorie, probleme de gândire, dificultăți la mers sau pierdere de vedere – acestea pot fi cauzate de o infecție gravă, foarte rară, la nivelul creierului, care a fost letală (Leucoencefalopatie Multifocală Progresivă sau LMP).
- febră, durere de cap și rigiditate a gâtului, necoordonare (ataxie), modificări de personalitate, halucinații, conștiință alterată, convulsii sau comă – acestea se pot datora unei infecții grave a creierului (meningoencefalita enterovirală), care poate fi letală.

În timpul tratamentului cu Rixathon puteți face infecții mult mai ușor. Acestea sunt adesea răceli, dar au existat cazuri de pneumonie, infecții urinare și infecții virale grave. Acestea sunt enumerate mai jos sub „Alte reacții adverse”.

Dacă sunteți tratat pentru poliartrită reumatoidă, granulomatoză cu poliangeită, poliangeită microscopică sau pemfigus vulgar, veți găsi de asemenea aceste informații în Cardul de Atenționare a pacientului pe care l-ați primit de la medicul dumneavoastră. Este important ca dumneavoastră să

păstrați acest card de atenționare și să îl arătați partenerului sau persoanei care are grijă de dumneavoastră.

### **Afecțiuni ale pielii**

Foarte rar pot să apară afecțiuni severe pe piele cu formare de vezicule, care pot pune viața în pericol. Roșeața, adeseori asociată cu vezicule, poate apărea pe piele sau pe mucoase, cum sunt interiorul gurii, zonele genitale sau pleoape și poate fi prezentă febra. **Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre aceste simptome.**

### **Alte reacții adverse includ:**

#### **a) Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră sunteți tratat pentru limfom non-Hodgkin (LNH) sau leucemie limfocitară cronică (LLC)**

Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 pacienți):

- infecții bacteriene sau virale, bronșite
- scăderea numărului de celule albe din sânge cu sau fără febră sau scăderea numărului de celule din sânge numite „trombocite”
- senzație de rău (greață)
- porțiuni ale scalpului cu alopecie, frisoane, durere de cap
- imunitate mai scăzută – din cauza valorilor scăzute ale anticorpilor din sânge numiți „imunoglobulinele” (IgG), care ajută la protejarea împotriva infecției.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 pacienți):

- infecții ale sângelui (sepsis), pneumonie, Herpes zoster, răceală, infecții ale canalului bronhial, infecții fungice, infecții de origine necunoscută, inflamare a sinusurilor, hepatita B
- număr scăzut al celulelor roșii din sânge (anemie), număr scăzut al tuturor celulelor din sânge
- reacții alergice (hipersensibilitate)
- nivel crescut de zahăr în sânge, pierdere în greutate, umflare a feței și corpului, valori crescute ale enzimei „LDH” din sânge, valori scăzute ale calciului din sânge
- senzații anormale la nivelul pielii – cum sunt amorțeală, furnicături, înțepături, arsuri, o senzație de frison la nivelul pielii, scădere a simțului tactil
- sentiment de neliniște, dificultăți la adormire
- înroșire accentuată a feței și a altor zone ale pielii ca urmare a dilatării vaselor de sânge
- senzație de amețelă sau anxietate
- creștere a producției de lacrimi, afecțiuni la nivelul canalului lacrimal, inflamare a ochiului (conjunctivită)
- sunete în urechi, durere la nivelul urechii
- afecțiuni ale inimii – cum sunt infarct miocardic, ritm neregulat sau rapid al inimii
- tensiune arterială crescută sau scăzută (o scădere a tensiunii arteriale în special în poziția de stat în picioare)
- contractura musculaturii la nivelul căilor respiratorii care provoacă respirație șuierătoare (bronhospasm), inflamație, iritație la nivelul plămânilor, gâtului sau sinusurilor, dificultăți la respirație, nas care curge
- stare de rău (vărsături), diaree, durere de stomac, iritație sau ulcerație la nivelul gâtului și gurii, dificultăți la înghițire, constipație, indigestie
- tulburări de alimentație, alimentație insuficientă care duce la pierdere în greutate
- urticarie, transpirație crescută, transpirații nocturne
- probleme musculare – cum sunt musculatură încordată, dureri articulare sau musculare, dureri de spate și cervicale
- durere la nivelul tumorii
- disconfort general sau stare de neliniște sau de oboseală, tremurături, sindrom gripal
- disfuncție multiplă de organ.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de pacienți):

- probleme de coagulare a sângelui, scădere a producției de celule roșii din sânge și creștere a distrugerii celulelor roșii din sânge (anemie hemolitică aplastică), umflare sau mărire a nodulilor limfatici
- scădere a dispoziției și pierdere a interesului sau plăcerii în activități obișnuite, nervozitate
- modificări ale gustului – cum sunt schimbări în modul în care se simte gustul
- probleme ale inimii – cum sunt ritm al inimii scăzut sau dureri în piept (angină)
- astm, cantitate prea mică de oxigen care ajunge la organele corpului
- umflare la nivelul stomacului.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de pacienți):

- creștere temporară a cantității anumitor tipuri de anticorpi în sânge (numiți imunoglobuline – IgM), tulburări chimice în sânge cauzate de descompunerea celulelor canceroase moarte
- afectare a nervilor de la nivelul brațelor și picioarelor, paralizie a feței
- insuficiență cardiacă
- inflamare a vaselor de sânge, inclusiv cele care determină simptome la nivelul pielii
- insuficiență respiratorie
- deteriorare a peretelui intestinal (perforare)
- afecțiuni severe pe piele cu formare de vezicule care pot pune viața în pericol. Roșeața, adeseori asociată cu vezicule, poate apărea pe piele sau pe mucoase, cum sunt interiorul gurii, zonele genitale sau pleoape și poate fi prezentă febra
- insuficiență renală
- pierdere severă a vederii (semn de leziuni ale nervilor la nivelul creierului).

Cu frecvență necunoscută (nu se cunoaște cât de des se întâmplă să apară aceste reacții adverse):

- o scădere întârziată a numărului celulelor albe din sânge
- număr redus de trombocite doar după perfuzie – acesta poate fi reversibil dar, în cazuri rare, poate fi letal
- pierdere a auzului, pierdere a altor simțuri
- infecție/inflamație a creierului și meningelui (meningoencefalita enterovirală)

### **Copii și adolescenți cu limfom non-Hodgkin (LNH):**

În general, reacțiile adverse la copiii și adolescenții cu limfom non-Hodgkin sunt similare cu cele de la adulții cu LNH sau LLC. Cele mai frecvente reacții adverse observate au fost febra asociată cu un nivel scăzut al celulelor albe din sânge (neutrofile), inflamație sau ulcerații în mucoasa bucală și reacții alergice (hipersensibilitate).

### **b) Dacă sunteți tratat pentru poliartrită reumatoidă**

Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 pacienți):

- Infecții precum pneumonie (bacteriene)
- Durere la urinare (infecție a tractului urinar)
- Reacții alergice care apar cel mai probabil în timpul unei perfuzii, dar pot apărea până la 24 ore după perfuzie
- Modificări ale tensiunii arteriale, greață, erupție cutanată tranzitorie, febră, mâncărime, rinoree sau nas înfundat și strănut, tremurături, bătăi rapide ale inimii și oboseală
- Durere de cap
- Modificări ale rezultatelor testelor de laborator efectuate de către medicul dumneavoastră. Acestea includ o scădere a cantității unor proteine specifice din sânge (imunoglobuline) care ajută la protejarea împotriva infecțiilor.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 pacienți):

- Infecții precum inflamarea canalului bronhial (bronșită)
- Senzație de plenitudine sau o durere care pulsează în spatele nasului, obrazilor și ochilor (sinuzită), durere abdominală, vomă și diaree, probleme de respirație
- Infecție fungică la nivelul piciorului (piciorul atletului)

- Valori crescute ale colesterolului în sânge
- Senzații anormale la nivelul pielii, precum amorțeală, furnicături, înțepături sau arsuri, sciatică, migrenă, amețelă
- Căderea părului
- Anxietate, depresie
- Indigestie, diaree, reflux acid, iritație și/sau ulcerație ale gâtului și gurii
- Durere de burtă, spate, mușchi și/sau articulații.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de pacienți):

- Retenție de lichide în exces la nivelul feței și corpului
- Inflamație, iritație și/sau senzație de constricție a plămânilor și gâtului, tuse
- Reacții la nivelul pielii incluzând urticarie, mâncărime și erupție cutanată tranzitorie
- Reacții alergice incluzând respirație șuierătoare sau scurtarea respirației, umflarea feței și limbii, colaps.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de pacienți):

- Un complex de simptome care apar în decurs de câteva săptămâni după o perfuzie cu rituximab, incluzând reacții similare alergiei precum erupție cutanată tranzitorie, mâncărime, durere articulară, umflarea glandelor limfatice și febră
- Afecțiuni severe pe piele cu formare de vezicule, care pot pune viața în pericol. Roșeața, adeseori asociată cu vezicule, poate apărea pe piele sau pe mucoase, cum sunt interiorul gurii, zonele genitale sau pleoape și poate fi prezentă febra.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- Infecție virală gravă
- Infecție/inflamație a creierului și meningelui (meningoencefalita enterovirală)

Alte reacții adverse raportate rar cauzate de rituximab includ un număr scăzut al celulelor albe din sânge (neutrofile) care ajută în lupta împotriva infecțiilor. Unele infecții pot fi severe (vă rugăm să vedeți informațiile despre **Infecții** de la acest punct).

**c) Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră sunteți tratat pentru granulomatoză cu poliangită (GPA) sau poliangită microscopică (MPA)**

Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 pacienți):

- infecții, cum sunt infecții pulmonare, infecții ale tractului urinar (dureri la urinare), răceli și infecții herpetice
- reacții alergice, care apar cel mai probabil în timpul administrării unei perfuzii, dar pot apărea până la 24 de ore de la administrarea perfuziei
- diaree
- tuse sau dificultăți de respirație
- sângerări din nas
- tensiune arterială mare
- dureri articulare sau de spate
- spasme musculare sau tremurături
- senzație de amețelă
- tremor (tremurături, deseori ale mâinilor)
- tulburări ale somnului (insomnie)
- umflare a mâinilor sau gleznelor.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 pacienți):

- indigestie
- constipație
- erupții trecătoare pe piele, inclusiv acnee sau pete
- înroșire a feței sau roșeață a pielii

- febră
- nas înfundat sau care curge
- mușchi încordați sau dureroși
- dureri musculare sau la nivelul mâinilor sau picioarelor
- număr scăzut de celule roșii în sânge (anemie)
- număr scăzut de trombocite în sânge
- o creștere a cantității de potasiu din sânge
- schimbări în ritmul de bătaie al inimii, sau inima bate mai repede decât în mod normal.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de pacienți):

- afecțiuni severe pe piele cu formare de vezicule, care pot pune viața în pericol. Roșeața, adeseori asociată cu vezicule, poate apărea pe piele sau pe mucoase, cum sunt interiorul gurii, zonele genitale sau pleoape și poate fi prezentă febra.
- reapariția unei infecții anterioare cu hepatita B.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- infecție virală gravă
- infecție/inflamație a creierului și meningelui (meningoencefalita enterovirală)

### **Copiii și adolescenții cu granulomatoză cu poliangeită (GPA) sau poliangeită microscopică (MPA)**

În general, efectele secundare la copiii și adolescenții cu GPA sau MPA au fost similare cu cele observate la adulții cu GPA sau MPA. Cele mai frecvente efecte secundare observate au fost infecțiile, reacțiile alergice și starea de rău (greață).

#### **d) Dacă sunteți tratat(ă) pentru pemfigus vulgar**

Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):

- reacții alergice care pot apărea, cel mai adesea, pe durata perfuziei, dar și în decurs de până la 24 de ore după perfuzie
- durere de cap
- infecții cum sunt infecțiile toracice
- depresie persistentă
- căderea părului.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- infecții cum sunt răceala, infecții cu virus herpetic, infecții oculare, afte bucale și infecții ale tractului urinar (dureri la urinare)
- tulburări de dispoziție precum iritabilitate și depresie
- afecțiuni ale pielii precum prurit, urticarie și noduli benigni
- senzație de oboseală sau amețeală
- febră
- dureri articulare sau de spate
- durere abdominală
- durere musculară
- ritm mai rapid al bătăilor inimii decât în mod normal.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- infecție virală gravă
- infecție/inflamație a creierului și meningelui (meningoencefalita enterovirală)

Rixathon poate, de asemenea provoca modificări în rezultatele testelor de laborator efectuate de către medicul dumneavoastră.

Dacă vi se administrează Rixathon cu alte medicamente, o parte din reacțiile adverse care apar se pot datora celorlalte medicamente.

## Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este menționat în [Anexa V](#). Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## 5. Cum se păstrează Rixathon

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe eticheta flaconului după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

A se ține flaconul în cutia de carton pentru a fi protejat de lumină.

Acest medicament poate fi păstrat, de asemenea, în cutia originală, în afara frigiderului la temperaturi de până la maximum 30 °C pentru o singură perioadă de până la 7 zile, dar fără a depăși data de expirare originală. În această situație, medicamentul nu trebuie introdus din nou în depozitare frigorifică. Scrieți noua dată de expirare pe cutie, incluzând ziua/luna/anul. Aruncați acest medicament dacă nu este folosit până la noua dată de expirare sau până la data de expirare înscrisă pe cutie, oricare dintre acestea este prima.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

### Ce conține Rixathon

- Substanța activă din Rixathon este rituximab.  
Flaconul de 10 ml conține rituximab 100 mg (10 mg/ml).  
Flaconul de 50 ml conține rituximab 500 mg (10 mg/ml).
- Celelalte componente sunt citrat de sodiu, polisorbit 80, clorură de sodiu, hidroxid de sodiu, acid clorhidric și apă pentru preparate injectabile (vezi pct. 2).

### Cum arată Rixathon și conținutul ambalajului

Rixathon este o soluție limpede, incoloră până la ușor gălbuie, disponibilă sub formă de concentrat pentru soluție perfuzabilă (concentrat steril).

Flacon de 10 ml - cutie cu 2 sau 3 flacoane.

Flacon de 50 ml - cutie cu 1 sau 2 flacoane.

### Deținătorul autorizației de punere pe piață

Sandoz GmbH  
Biochemiestr. 10  
6250 Kundl  
Austria



## **Fabricantul**

Sandoz GmbH Schaftenu  
Biochemiestr. 10  
6336 Langkampfen  
Austria

Lek Pharmaceuticals d.d. Ljubljana  
Verovškova 57  
1526 Ljubljana  
Slovenia

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

### **België/Belgique/Belgien**

Sandoz nv/sa  
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

### **България**

Сандоз България КЧТ  
Тел.: +359 2 970 47 47

### **Česká republika**

Sandoz s.r.o.  
Tel: +420 225 775 111

### **Danmark/Norge/Ísland/Sverige**

Sandoz A/S  
Tlf/Sími/Tel: +45 63 95 10 00

### **Deutschland**

Hexal AG  
Tel: +49 8024 908 0

### **Eesti**

Sandoz d.d. Eesti filiaal  
Tel: +372 665 2400

### **Ελλάδα**

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
Τηλ: +30 216 600 5000

### **España**

Sandoz Farmacéutica, S.A.  
Tel: +34 900 456 856

### **France**

Sandoz SAS  
Tél: +33 1 49 64 48 00

### **Hrvatska**

Sandoz d.o.o.  
Tel: +385 1 23 53 111

### **Lietuva**

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas  
Tel: +370 5 2636 037

### **Luxembourg/Luxemburg**

Sandoz nv/sa  
Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

### **Magyarország**

Sandoz Hungária Kft.  
Tel.: +36 1 430 2890

### **Malta**

Sandoz Pharmaceuticals d.d.  
Tel: +35699644126

### **Nederland**

Sandoz B.V.  
Tel: +31 36 52 41 600

### **Österreich**

Sandoz GmbH  
Tel: +43 5338 2000

### **Polska**

Sandoz Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 209 70 00

### **Portugal**

Sandoz Farmacêutica Lda.  
Tel: +351 21 000 86 00

### **România**

Sandoz Pharmaceuticals SRL  
Tel: +40 21 407 51 60

### **Slovenija**

Sandoz farmacevtska družba d.d.  
Tel: +386 1 580 29 02

**Ireland**

Rowex Ltd.  
Tel: + 353 27 50077

**Italia**

Sandoz S.p.A.  
Tel: +39 02 96541

**Κύπρος**

Sandoz Pharmaceuticals d.d.  
Τηλ: +357 22 69 0690

**Latvija**

Sandoz d.d. Latvia filiāle  
Tel: +371 67 892 006

**Slovenská republika**

Sandoz d.d. - organizačná zložka  
Tel: +421 2 48 200 600

**Suomi/Finland**

Sandoz A/S  
Puh/Tel: +358 10 6133 400

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Sandoz GmbH  
Tel: +43 5338 2000

**Acest prospect a fost revizuit în****Alte surse de informații**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente <http://www.ema.europa.eu>.

Acest prospect este disponibil în toate limbile UE/SEE pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente.